Higienos institutas

ISSN 2538-6832 online

VISUOMENĖS SVEIKATA

Public Health



Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos

HIGIENOS INSTITUTAS

Higienos institutas

Lithuanian Republic
Ministry of Health

INSTITUTE OF HYGIENE

VISUOMENĖS SVEIKATA

Public Health

PADĖKITE MUMS TOBULĖTI

2026/2(113)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

P A D Ė K A

žurnalo „Visuomenės sveikata“ redakcijai

už tris dešimtmečius nuoseklaus darbo stiprinant visuomenės sveikatos mokslo sklaidą, profesionalų dialogą ir įrodymais grįstą požiūrį į sveikatos politiką Lietuvoje. Tegul žurnalas ir toliau išlieka svarbia erdve žinioms, idėjoms ir pažangiems sprendimams, padedantiems kurti sveikesnę visuomenę.

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė

2026 m.
Vilnius

ISSN 2538-6832 online

Redakcinė kolegija:

pirmininkas
dr. Šarūnas Alasauskas, Higienos institutas, Lietuva;

atsakingoji redaktorė
dr. Virginija Kanapeckienė, Higienos institutas, Lietuva;

nariai:
dr. Aušra Beržanskytė, Vilniaus universitetas, Lietuva;
prof. dr. Laima Bulotaitė, Vilniaus universitetas, Lietuva;
dr. Jonas Bunikis, European Research Council, Belgium;
prof. Göran Bondjers, University of Gothenburg, Sweden;
prof. dr. Danguolė Jankauskienė, Mykolo Romerio universitetas;
dr. Domantas Jasilionis, Max Planck Institute for Demographic Research, Germany;
prof. dr. Arnoldas Jurgutis, Pasaulio sveikatos organizacija;
prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių mokslų centras, Vilniaus universitetas, Lietuva;
dr. Mindaugas Gudelis, Teknon Medical Center, Spain;
dr. Vida Juškelienė, Higienos institutas, Lietuva;
prof. Ramunė Kalėdienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva;
prof. Gintarė Kalinienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva;
dr. Aušrelė Kesminienė-Suonio, International Agency for Research on Cancer (IARC/WHO), France;
prof. Eda Merisalu, Estonian university of Life science, Estonia;
prof. dr. Sigita Lesinskienė, Vilniaus universitetas, Lietuva;
dr. Olga Meščeriakova, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva;
doc. dr. Laura Nedzinskienė, Vilniaus universitetas, Lietuva;
prof. dr. Alvydas Navickas, Vilniaus universitetas, Lietuva;
dr. Rūta Petrauskaitė-Everatt, Nacionalinis vėžio institutas, Lietuva;
doc. dr. Rimantė Ronto, Macquarie University, Australia;
dr. Erikas Simonavičius, European Union Drugs Agency (EUDA), Portugal;
dr. Jelena Stanislavovienė, Vilniaus universitetas, Lietuva;
prof. Rimantas Stukas, Vilniaus universitetas, Lietuva;
prof. Rūta Ustinavičienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva;
dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas, Lietuva;
prof. Harri Vainio, Kuwait University, Kuwait;
prof. Anita Villeruša, Riga Stradins University, Latvia;
dr. Rasa Žutautienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva.

Už anglų kalbos kokybę redakcija neatsako.

Kalbos redaktorė Rima Mažeikienė
Dizainerė Kristina Valungevičė

© Leidžia Higienos institutas
Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius

TURINYS

REDAKCIJOS SKILTIS

Virginija Kanapeckienė
Trys dešimtmečiai pristatant visuomenės sveikatos tyrimus – žurnalas „Visuomenės sveikata“ mini jubiliejų 7

LITERATŪROS APŽVALGOS

Kristupas Kurminas, Eva Kriaučiūnaitė, Laura Nedzinskienė
Organų ir audinių donorystės perspektyvos bei tendencijos..... 11

Ugnė Jakšytė, Almeda Kučinskienė, Indrė Čergelytė-Podgrušienė
Pacientų sveikos gyvensenos ugdymą lemiantys veiksniai slaugytojų klinikinėje praktikoje..... 26

Evelina Grinevič, Aldona Mikaliūkštienė
Slaugytojų profesinis perdegimas ir jo prevencijos priemonės..... 35

Justas Paršeliūnas, Laura Nedzinskienė, Ugnė Utkutė, Renata Giliun
Saldumo pojūtį suteikiančios medžiagos: vartojimo tendencijos ir poveikis žmogaus sveikatai. Literatūros apžvalga .. 46

Titas Zabulionis, Sigita Lesinskienė
Juoko ir humoro terapijos reikšmė sveikatinime ir klinikinėje praktikoje 56

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI

Evelina Petraitytė, Daiva Skučienė, Eugenijus Dunajevas
Gyventojų dalyvavimas prevencinėse sveikatos tyrimų programose pagal socioekonomines charakteristikas 65

Algė Monika Karolytė, Ginreta Megelinskienė, Aušra Beržanskytė, Loreta Ašoklienė
Vaikus auginančių tėvų požiūris į vaikų skiepijimą: kokybinis tyrimas..... 76

Gintarė Donata Kubiliūtė, Greta Aidukaitė
Pacientų žinios apie periodonto ligas 86

Gabrielė Jackevič, Modesta Morkevičiūtė
Polinkio į priklausomybę nuo darbo sąsaja su romantinių santykių vertinimu: empirinė analizė 97

Aistė Kučinskienė, Gerda Kuzmarskienė, Gabrielė Domkutė, Lina Krapavickienė
Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio specialistų požiūris į teikiamos pagalbos veikimą.....106

Milda Černytė, Vesta Burbaitė, Robertas Strumila, Alvydas Navickas
Probleminis pornografijos vartojimas tarp jaunų moterų: ryšys su psichoemocine sveikata ir seksualine funkcija.....122

Vesta Burbaitė, Milda Černytė, Robertas Strumila, Alvydas Navickas
Psichoemociniai sunkumai ir seksualinė disfunkcija: probleminio pornografijos vartojimo įtaka jauniems vyrams....123

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRAKTIKAI

Rūta Ruolytė-Verschoore
Šeimos gydytojų patirtys ir pasirengimas savižudybių prevencijai Lietuvoje 132

Informacija straipsnių autoriams 134

CONTENTS

EDITORIAL

Virginija Kanapeckienė
Three decades of presenting public health research – the journal „Public health“ celebrates its anniversary 10

REVIEWS

Kristupas Kurminas, Eva Kriaučiūnaitė, Laura Nedzinskienė
Perspectives and trends in organ and tissue donation. 25

Ugnė Jakšytė, Almeda Kučinskienė, Indrė Čergelytė-Podgrušienė
Factors determining the promotion of healthy lifestyle for patients in the clinical practice of nurses 34

Evelina Grinevič, Aldona Mikaliūkštienė
Nurses' burnout and its preventive measures 45

Justas Paršeliūnas, Laura Nedzinskienė, Ugnė Utkutė, Renata Giliun
Sweeteners: consumption trends and impact on human health. Literature review 55

Titas Zabulionis, Sigita Lesinskienė
The role of aughter and humor therapy in health promotion and clinical practice 64

ORIGINAL ARTICLES

Evelina Petraitytė, Daiva Skučienė, Eugenijus Dunajevas
Preventive health examinations according to the socioeconomic characteristics of the population. 75

Algė Monika Karolytė, Ginreta Megelinskienė, Aušra Beržanskytė, Loreta Ašoklienė
Attitudes of parents raising children toward child vaccination: a qualitative study 85

Gintarė Donata Kubiliūtė, Greta Aidukaitė
Patients' knowledge about periodontal diseases 96

Gabrielė Jackevič, Modesta Morkevičiūtė
The link between work addiction and the assessment of romantic relationships: an empirical analysis 105

Aistė Kučinskienė, Gerda Kuzmarskienė, Gabrielė Domkutė, Lina Krapavickienė
Specialists' attitudes towards the functioning of suicide prevention model services in Kaunas city 113

Milda Černytė, Vesta Burbaitė, Robertas Strumila, Alvydas Navickas
Problematic pornography use among young women: associations with mental health symptoms and sexual functioning. 114

Vesta Burbaitė, Milda Černytė, Robertas Strumila, Alvydas Navickas
Psychoemotional difficulties and sexual dysfunction: the impact of problematic pornography use on young men 131

FOR PUBLIC HEALH PRACTICE

Rūta Ruolytė-Verschoore
General practitioners experiences and preparedness for suicide prevention in Lithuania 132

Information to authors. 135

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-13

Žinios yra galia

Francis Becon

TRYS DEŠIMTMEČIAI PRISTATANT VISUOMENĖS SVEIKATOS TYRIMUS – ŽURNALAS „VISUOMENĖS SVEIKATA“ MINI JUBILIEJŲ

NUO MOKSLO IKI PRAKTIKOS

Šių metų birželio mėnesį žurnalas „Visuomenės sveikata“ – periodinis mokslinis leidinys – mini savo jubiliejų. Lygiai prieš tris dešimtmečius, 1996 metų birželio mėnesį, buvo išleistas pirmasis žurnalo numeris. Tai buvo pirmasis žurnalas Lietuvoje, skirtas išskirtinai tik visuomenės sveikatos tematikai, ir toks jis išliko iki šių dienų.

Žurnalo steigėjas ir leidėjas – Higienos institutas, iki 2011 m. turėjęs mokslo įstaigos statusą. Leidinys skirtas mokslininkams, sveikatos apsaugos organizatoriams ir administratoriams, sveikatos politikams, visuomenės sveikatos specialistams, gydytojams, studentams ir kitiems skaitytojams, besidomintiems visų šalies gyventojų ar atskirų jų grupių sveikatos ir ją veikiančių veiksnių aktualijomis. 1997 m. Lietuvos mokslo tarybos nutarimu žurnalas įtrauktas į Lietuvos mokslo recenzuojamų žurnalų sąrašą, o nuo 2005 metų žurnalas indeksuojamas *IndexCopernicus* duomenų bazėje.

Žurnale publikuojami visuomenės sveikatos ir jai artimų sričių moksliniai straipsniai, kurie skirstomi į originalius tyrimus pristatančius straipsnius ir literatūros apžvalgas, analizuojančias bei kritiškai apibendrinančias jau atliktus tyrimus. Straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis, o jų kokybę užtikrina recenzentų komanda – visuomenės sveikatos, profesinės sveikatos, psichikos sveikatos, sociologijos ir kitų sričių ekspertai.

Siekiant didinti žurnalo populiarumą ne tik tarp akademinės bendruomenės, bet ir tarp visuomenės sveikatos praktikų, dirbančių visuomenės sveikatos biuruose ir kitose visuomenės sveikatos įstaigose, 2007 m. žurnale atsirado praktinės skiltys – „Redakcijos skiltis“, „Visuomenės sveikatos praktikai“ ir „Metodinė medžiaga“, kuriose pateikiama informacija apie svarbiausius sveikatos politikos įvykius pasaulyje, Europoje ar mūsų šalyje, sveikatos strategijas ir programas, sveikatos srities teisės aktų pokyčius, visuomenės sveikatos analitines įžvalgas, gerosios praktikos pavyzdžius, naujas metodines bei praktines rekomendacijas, įgyvendintus tarptautinius ir kitus projektus, visuomenės sveikatos inovacijas bei įrankius ir pan. Taigi žurnalas yra platforma visuomenės sveikatos specialistams praktikams dalytis gerąja patirtimi bei naujovėmis, o tai praplečia žurnalo tikslinės auditorijos ratą ir leidžia žurnalui išlikti ne tik akademiniu, bet ir praktiniu leidiniu.

Nuolat stiprinama žurnalo redakcinė kolegija, įtraukiant naujus, perspektyvius mokslininkus. Šiandien joje dirba įvairių institucijų atstovai – nuo Higienos instituto iki tarptautinių mokslo centrų ir universitetų. Žurnalas taip pat leidžia specialius numerius ar priedus, skirtus konkrečioms temoms ar konferencijų medžiagai pristatyti.

NUO IDĖJOS IKI TRADICIJOS

Tuomečio Higienos instituto direktoriaus dr. Vytauto Jurkuvėno iniciatyva 1996 m. pasirodė pirmasis žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris. Nemažą indėlį į leidinio gimimą įnešė dr. Lilija Genytė – aktyvi mokslininkė, tuomečio Higienos instituto Informacijos ir ryšių skyriaus vedėja, įvairių išradimų autorė. Pirmaisiais žurnalo gyvavimo metais buvo išleidžiami tik du numeriai per metus, o nuo 1999-ųjų žurnalas reguliariai leidžiamas kartą per ketvirtį.

Per 30 gyvavimo metų žurnalo leidėjas nesikeitė – jį iki šių dienų leidžia Higienos institutas. Tačiau keitėsi žmonės – žurnalui vadovavo ryškios visuomenės sveikatos srities asmenybės. Pirmuoju žurnalo redakcinės kolegijos pirmininku buvo jo įkūrėjas – Higienos instituto direktorius dr. Vytautas Jurkuvėnas (1996–1998 m.), daug prisidėjęs vystant šiuolaikinės visuomenės sveikatos koncepciją ir mokslą Lietuvoje bei viešinant visuomenės sveikatos tyrimų rezultatus.

1999–2001 m. žurnalo redakcinės kolegijos pirmininko pareigas ėjo tuometis Higienos instituto direktorius dr. Robertas Petkevičius, jis tuo pat metu buvo ir Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovas, dėjęs

daug pastangų didinti žurnalo tarptautiškumą.

2001 m. Higienos instituto direktoriumi ir žurnalo redakcinės kolegijos pirmininku tapo prof. Julius Kalibatas – vienas iš šeimos medicinos institucijos diegėjų Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo, kuris praplėtė žurnalo tematiką pirminės sveikatos priežiūros indėliu į visuomenės sveikatos mokslo vystymą.

2006 m. Higienos institutui pradėjus vadovauti dr. Remigijui Jankauskui, žurnalas pakeitė savo formatą ir dizainą, atsirado naujos nemokslinės rubrikos, skirtos visuomenės sveikatos praktikams. 2007 m. vadovauti žurnalo redakcinei kolegijai buvo paskirtas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius epidemiologas Kęstutis Žagminas, šiose pareigose dirbęs dvejus metus ir kaip reiklus mokslininkas didelį dėmesį skyręs žurnalo straipsnių kokybei užtikrinti.

Žurnalo įkūrėjui dr. Vytautui Jurkuvėnui grįžus dirbti į Higienos institutą, 2009 m. jis vėl tapo redakcinės kolegijos pirmininku ir šias pareigas ėjo penkerius metus.

Ilgiausiai – beveik dešimtmetį (2014–2023 m.) – žurnalo redakcinei kolegijai vadovavo prof. Romualdas Gurevičius, savo profesinę karjerą paskyręs lėtinių ligų epidemiologijai ir socialinei medicinai, rūpinęsis ne tik žurnalo temų įvairove ir straipsnių kokybe, bet ir pats parašęs daug mokslinių ir redakcijos skilties straipsnių šiam žurnalui.

Naujas žurnalo raidos etapas prasidėjo 2024 m., redakcinės kolegijos pirmininku tapus Higienos instituto direktoriui dr. Šarūnui Alasauskui. Jo iniciatyva buvo atnaujintas žurnalo leidybos reglamentas, peržiūrėta ir papildyta redakcinė kolegija. Žurnalas tapo visiškai elektroninis, buvo sukurta atskira jo interneto svetainė, straipsniams pradėti teikti skaitmeniniai identifikatoriai – DOI (angl. *digital object identifier*), o leidybos procesas buvo perkeltas į Higienos institutą.

Žurnalo skaitmenizavimas reikšmingai pagerino jo prieinamumą ir sklaidą. Elektroninis formatas sudarė sąlygas operatyviau publikuoti straipsnius, užtikrino nuolatinę prieigą skaitytojams, nepriklausomai nuo jų geografinės vietos, taip pat palengvino informacijos paiešką ir citavimą. Skaitmeninių identifikatorių DOI taikymas padidino publikacijų matomumą tarptautinėse duomenų bazėse ir prisidėjo prie mokslinės produkcijos atsekamumo bei citavimo tikslumo.

Taip pat buvo atnaujintas žurnalo grafinis dizainas. Praktinėse skiltyse daugiau dėmesio skiriama visuomenės sveikatos inovacijų, įrankių ir praktinių sprendimų pristatymui, siekiant stiprinti mokslo ir praktikos sąveiką.

Kas išliko nepakitę žurnalo leidybos procese – tai žurnalo atsakingoji redaktorė dr. Virginija Kanapeckienė, nuo 2003 m. koordinuojanti žurnalo turinio sudarymą bei užtikrinanti straipsnių kokybę per recenzavimo procesą. Jai teko dirbti beveik su visais žurnalo redakcinės kolegijos pirmininkais, dalyvauti žurnalo transformacijoje bei matyti straipsnių temų ir kokybės kaitą.

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

Per tris dešimtmečius mokslo leidinys „Visuomenės sveikata“ tapo platforma, tam tikra prasme atspindinčia visuomenės sveikatos mokslo raidą Lietuvoje – nuo pirmųjų nepriklausomybės metų iššūkių iki šiandienos grėsmių ir inovatyvių sprendimų. Tai sukauptos patirties ir nuolatinio atsinaujinimo istorija. Svarbiausia šios istorijos dalis – žmonės, tikintys, kad visuomenės sveikata yra ne tik mokslas, bet ir atsakomybė už kiekvieno iš mūsų gyvenimo kokybę. Viena iš prioritetinių žurnalo vystymo ateityje krypčių – tarptautiškumo plėtra.

DĖKOJAME


2026 m. gegužės 21 d. vykusioje Higienos instituto metinėje konferencijoje „Kaip stiprinti visuomenės sveikatos specialistų prestižą?“ Higienos instituto direktorius ir žurnalo „Visuomenės sveikata“ redakcinės kolegijos pirmininkas dr. Šarūnas Alasauskas savo pranešime pristatė žurnalo istorinį kelią per tris dešimtmečius ir pagerbė buvusius žurnalo vyriausiuosius redaktorius už jų indėlį į žurnalo vystymą ir tradicijos tęsimą.

Minėdami žurnalo jubiliejų dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie žurnalo kūrimo ir augimo: buvusiems redakcinės kolegijos pirmininkams, ilgamečiams nariams ir atsidavusiems recenzentams už jų nuoseklų, atsakingą darbą:


dr. Vytautui Jurkuvėnui,
dr. Robertui Petkevičiui,
prof. Juliui Kalibatui,
prof. Kęstučiui Žagminui,
prof. Romualdui Gurevičiui,
dr. Remigijui Jankauskui (Higienos institutas),
dr. Aušrai Beržanskytei (Vilniaus universitetas),
prof. dr. Laimai Bulotaitei (Vilniaus universitetas),
prof. dr. Danguolei Jankauskienei (Mykolo Romerio universitetas),


prof. dr. Boguslavui Gruževskiui (Lietuvos socialinių mokslų centras, Vilniaus universitetas),
dr. Vidai Juškelienei (Higienos institutas),
prof. Ramunei Kalėdienei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),
prof. Gintarei Kalinienei (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),
prof. dr. Sigitai Lesinskienei (Vilniaus universitetas),
doc. dr. Olgai Meščeriakovai (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),
doc. dr. Laurai Nedzinskienei (Vilniaus universitetas),
prof. dr. Alvydui Navickui (Vilniaus universitetas),
dr. Rūtai Petrauskaitei-Everatt (Nacionalinis vėžio institutas),
dr. Jelenai Stanislavovienei (Vilniaus universitetas),
prof. Rimantui Stukui (Vilniaus universitetas),
dr. Rolandai Valintėlienei (Higienos institutas),
dr. Romai Bartkevičiūtei (Higienos institutas),
dr. Sauliui Vainauskui (Vilniaus universitetas),
dr. Aldonai Mikaliūkštienei (Vilniaus universitetas),
dr. Agnei Jakavonytei-Akstinienei (Vilniaus universitetas),
dr. Indrei Čergelytei-Podgrušienei (Vilniaus universitetas, Mykolo Romerio universitetas).


Dr. Virginija Kanapeckienė,
žurnalo „Visuomenės sveikata“ atsakingoji redaktorė
El. p. visuomenes.sveikata@hi.lt













THREE DECADES OF PRESENTING PUBLIC HEALTH RESEARCH – THE JOURNAL „VISUOMENĖS SVEIKATA“ (PUBLIC HEALTH) CELEBRATES ITS ANNIVERSARY

Virginija Kanapeckienė, *Institute of Hygiene, e-mail: virginija.kanapeckiene@hi.lt*

The article marks the 30th anniversary of the Lithuanian scientific journal *“Visuomenės sveikata”* (Public Health), highlighting its evolution from the first issue published in 1996 into a well-established platform for public health research and practice. It underscores the journal’s unique role as the first and enduring publication in Lithuania dedicated exclusively to public health, serving a broad audience of researchers, policymakers, practitioners, and students.

The article reviews the journal’s scope and development, emphasizing its commitment to publishing high-quality, peer-reviewed research articles and literature reviews in both Lithuanian and English. It also highlights the gradual expansion of the journal’s content to include practice-oriented sections, thereby strengthening the connection between academic research and practical application in the field of public health. Special attention is given to the role of the editorial board, reviewers, and authors in maintaining scientific quality and relevance.

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-4

ORGANŲ IR AUDINIŲ DONORYSTĖS PERSPEKTYVOS BEI TENDENCIJOS

Kristupas Kurminas[1], Eva Kriaučiūnaitė[1], Laura Nedzinskienė[2]
[1]Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
[2]Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos instituto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra

SANTRAUKA

Tikslas – išsamiai išanalizuoti organų ir audinių donorystės proceso eigą, donorystės rūšis, psichologinius aspektus, su ja susijusius iššūkius bei aptarti šiuolaikines donorystės skatinimo strategijas ir tendencijas. Tyrimu siekiama įvertinti donorystės procesą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, analizuojant medicininius, etinius bei visuomeninius aspektus, turinčius įtakos donorystės plėtrai ir visuomenės pasitikėjimui šia sistema.

Medžiaga ir metodai. Tyrime taikyta literatūros analizės metodika. Analizuoti 78 šaltiniai, iš kurių atrinkti aktualiausi teoriniai ir empiriniai tyrimai, publikuoti 2000–2025 m. laikotarpiu. Naudotos duomenų bazės *PubMed*, *ScienceDirect* ir *Google Scholar*. Literatūros šaltiniai buvo atrinkti pagal kalbą (anglų, vokiečių, ispanų, lietuvių), mokslinį patikimumą, temos specifiką ir objektyvumą. Surinkta informacija susisteminta pagal pagrindines temas ir apibendrinta aprašomosios analizės būdu.

Rezultatai bei išvados. Atlikta analizė atskleidė, kad organų ir audinių donorystė išlieka viena svarbiausių šiuolaikinės medicinos sričių, tiesiogiai prisidedanti prie pacientų išgyvenamumo ir gyvenimo kokybės gerinimo. Šalys, taikančios numanomo sutikimo (angl. *opt-out*) sistemą, tokios kaip Ispanija ar Belgija, pasiekia gerokai aukštesnių donorystės rodiklių nei aktyvaus sutikimo (angl. *opt-in*) modelį įgyvendinančios valstybės. Lietuvoje taikoma informuoto sutikimo sistema prisidėjo prie donorystės augimo, tačiau vis dar lieka iššūkių – ribotas visuomenės švietimas, donorystės koordinatorių trūkumas ir nepakankama sveikatos priežiūros įstaigų komunikacija.

Reikšminiai žodžiai: organų donorystė, audinių donorystė, kraujo donorystė, kamieninių ląstelių transplantacija, visuomenės sveikata, transplantacijų koordinavimas.

ĮVADAS

Organų ir audinių donorystė – viena reikšmingiausių šiuolaikinės medicinos sričių, leidžiančių išgelbėti gyvybes bei pagerinti pacientų gyvenimo kokybę. Pirmoji sėkminga organų transplantacija buvo atlikta 1954 m. Bostone, kai gydytojai David Hume ir Joseph Kelly atliko inksto persodinimą. Pirmoji inksto transplantacija mūsų šalyje atlikta 1970 metų vasario 18 d. Vilniaus universiteto Bendrosios chirurgijos klinikoje (tuometėje Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje). Operaciją atliko profesorius A. Marcinkevičius su komanda [1]. Šie istoriniai įvykiai tapo tolesnio transplantacijos mokslo vystymosi pagrindu, atvėrė kelią naujoms gydymo strategijoms ir pažangiems imuninę sistemą veikiančių vaistų tyrimams. Donorystė – tai savanoriškas ir neatlygintinas organų ar audinių aukojimas siekiant išgelbėti kito žmogaus gyvybę ar pagerinti jo sveikatą. Šis procesas apima tiek medicininius, tiek etinius ir socialinius aspektus, todėl reikalauja atsakingo visuomenės požiūrio, pasitikėjimo sveikatos sistema ir skaidrios donorystės tvarkos. Medicinos pažanga leidžia donorais tapti vis daugiau žmonių, net ir turinčių tam tikrų sveikatos sutrikimų, o donorystės vertinimas vis dažniau grindžiamas individualiu medicininiu įvertinimu. Donorystės aktualumą lemia augantis

Adresas susirašinėti: Laura Nedzinskienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra
M. K. Čiurlionio g. 21/27, 03101 Vilnius
El. p. laura.nedzinskiene@mf.vu.lt

transplantacijos laukiančių pacientų skaičius. Daugeliui jų organų ar audinių transplantacija tampa vienintele galimybe išgyventi ar atkurti visavertę gyvenimo kokybę. Be to, donorystė apima ne tik organų, bet ir kraujo bei kamieninių ląstelių aukojimą, kurie yra būtini gydant onkologines, genetines ir imunines ligas [2].

Tyrimo tema pasirinkta dėl nuolat augančio poreikio stiprinti donorystės sistemą, didinti visuomenės informuotumą ir pasitikėjimą medicinos institucijomis. Šiame darbe analizuojama donorystės samprata, teisiniai ir etiniai aspektai, donorystės rūšys, psichologiniai bei kultūriniai veiksniai, darantys įtaką žmonių apsisprendimui. Aptariami donorystės procesai Lietuvoje ir kitose šalyse, donorystės skatinimo strategijos bei tarptautinės tendencijos, siekiant užtikrinti etišką, skaidrų ir efektyvų donorystės procesą.

METODIKA

Rengiant literatūros apžvalgą, publikacijų anglų, lietuvių, ispanų, vokiečių kalbomis paieška buvo vykdoma 2025 m., jos tikslas – išsamiai išanalizuoti organų ir audinių donorystės proceso eigą, donorystės rūšis, jos psichologinius aspektus, susijusius iššūkius bei aptarti šiuolaikines donorystės skatinimo strategijas ir tendencijas, remiantis publikuotais moksliniais straipsniais ir pasaulio valstybių nuostatais. Išanalizuotos 2000–2025 metais paskelbtos valstybių politikos donorystės tema ir paskelbti straipsniai, rasti duomenų bazėse *PubMed*, *ScienceDirect*, *Google Scholar* ir kt. Duomenų paieškai naudoti reikšminiai žodžiai ir jų junginiai: „organų donorystė“, „kraujo donorystė“, „kamieninių ląstelių donorystė“. Literatūros šaltiniams taikyti šie kriterijai: kalba (anglų, lietuvių, ispanų, vokiečių), mokslinis patikimumas, temos specifika, objektyvumas ir šališkumo nebuvimas. Gauta informacija buvo susisteminta ir pateikta apibendrinti.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

Donorystė Lietuvoje ir kitose šalyse

Lietuvoje šiuo metu taikomas aktyvaus sutikimo (angl. *opt-in*) modelis – asmuo laikomas potencialiu organų donoru tik tada, kai pats aiškiai išreiškė tokį norą, pavyzdžiui, užsiregistruodamas Nacionalinio transplantacijos biuro (NTB) registre ar įsigydamas donoro kortelę. Šis modelis plačiai taikomas tokiose šalyse kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Japonija bei kai kurios Pietų ir Rytų Azijos valstybės. Tokia sistema užtikrina aiškų teisinį pagrindą donorystei, tačiau jos efektyvumas priklauso nuo visuomenės informuotumo, švietimo iniciatyvų ir pilietinio aktyvumo [2].

Donoro kortelė Lietuvoje dažnai suvokiama tik kaip formalus dokumentas, tačiau jos reikšmė yra kur kas didesnė. Ji liudija asmens valią po mirties paaukoti savo organus ir audinius transplantacijai. Kortelę galima įgyti prisijungus prie Nacionalinio transplantacijos biuro interneto svetainės, taip pat sveikatos priežiūros įstaigose, NTB organizuojamuose projektuose ar švietimo ir farmacijos institucijose, kuriose dirba biomedicinos bei visuomenės sveikatos specialistai. Šio proceso metu nereikia jokio sveikatos patikrinimo – organų ir audinių tinkamumą gydytojai nustato tik po žmogaus mirties. Svarbu pabrėžti, jog donoro kortelė nėra absoliuti garantija, kad organai tikrai bus panaudoti. Donorystė įmanoma tik tada, kai konstatuojama smegenų mirtis arba, nuo 2015 metų, pagal neplakančios širdies donorystės modelį – cirkuliacinė mirtis. Tokios diagnozės gali būti nustatomos tik ligoninėse, turinčiose intensyviosios terapijos skyrius. Net ir šiais atvejais, nors kortelė aiškiai patvirtina donoro valią, sprendimą dažnai apsunkina artimųjų reakcija – jų nepritarimas gali sustabdyti donorystės procesą [3].

Daugelyje Europos šalių (pvz., Ispanijoje, Prancūzijoje, Belgijoje), taip pat kai kuriose Lotynų Amerikos ir Afrikos valstybėse taikomas numanomo sutikimo (angl. *opt-out*) modelis. Pagal jį visi pilnamečiai asmenys laikomi potencialiais donorais, nebent raštiškai yra išreiškę atsisakymą. Šis modelis, kaip rodo Ispanijos ar Belgijos pavyzdžiai, padeda stabiliai didinti donorų skaičių. Pavyzdžiui, Ispanijoje 2019 m. vienam milijonui gyventojų teko net 48,9 donoro, o Lietuvoje – tik 18,6 donoro [4]. Lietuvoje iššūkiu išlieka ribotos donorystės švietimo iniciatyvų mastas, nepakankamai išvystytas regioninių koordinatorių tinklas bei komunikacijos spragos tarp sveikatos priežiūros įstaigų. Siekiant padidinti donorystės apimtis ir efektyviai panaudoti aktyvaus sutikimo sistemą, būtina stiprinti visuomenės informavimą, užtikrinti sklandų registrų valdymą ir pagerinti artimųjų konsultavimą donorystės klausimais [3].

Tapti kraujo donoru yra nesudėtinga, o pati donorystė yra labai saugi, nereikalaujanti didelių fizinių ar laiko sąnaudų, todėl daugeliui yra lengvai prieinama. Nacionalinio kraujo centro (NKC) svetainėje veikia skiltis „Kur tapti donoru“, kurioje pateikiama informacija apie nuolat veikiančius donorystės punktus didžiuosiuose šalies

miestuose bei apie išvykstamąsias donorystės akcijas įvairiose ugdymo įstaigose ar mažesniuose miesteliuose. Kraujo donoru gali tapti asmuo, atitinkantis nustatytus reikalavimus: neturintis ūmių ar pažengusių lėtinių ligų, sveriantis ne mažiau kaip 50 kg, turintis normalią hemoglobino koncentraciją bei nedalyvavęs rizikingo elgesio situacijose, susijusiose su padidinta infekcijų perdavimo tikimybe. Pati donorystė trunka 10 minučių, paimama iki 450 ml kraujo [5].

Skirtingai nei Lietuvoje, kur kraujo donorystė grindžiama savanoriškumo ir neatlygintinumo principais, Indijoje kai kuriose gydymo įstaigose vis dar taikoma vadinamoji donorystės mainų sistema (angl. *replacement donation*), pagal kurią pacientas arba jo artimieji privalo surasti donorą, kad būtų užtikrintas reikiamas kraujo kiekio gavimas. Šeimos arba mainų donorai vis dar sudaro daugiau nei 45 proc. viso Indijoje surenkamo kraujo kiekio. Mainų donorystė yra susijusi su socialiniu spaudimu ar finansiniu atlygiu, kelia riziką kraujo saugumui, yra kritikuojama tarptautinės bendruomenės ir nesuderinama su Pasaulio sveikatos organizacijos gairėmis [4]. Atsižvelgdama į šią kritiką, Indija pastaraisiais metais siekia reformuoti sistemą: diegia skaitmeninius sprendimus, tokius kaip „e-RaktKosh“, siekdama centralizuoti kraujo donorystės duomenis ir pagerinti koordinavimą tarp donorų, ligoninių ir kraujo centrų; Maharashtra valstijoje įvesta taisyklė draudžia ligoninėms reikalauti kraujo iš pacientų artimųjų mainais už gydymą, o už šio reikalavimo pažeidimą ligoninės gali prarasti licenciją arba gauti baudą [6].

Kamieninių ląstelių donorystė – tai procedūra, kurią atlieka sveikatos priežiūros specialistai, siekdami gauti kraują formuojančių ląstelių (kamieninių kraujodaros ląstelių). Ši transplantacija yra reikalinga žmonėms, sergantiems limfoma, leukemija, mieloma. JAV Sveikatos išteklių ir paslaugų administracijos duomenimis, 2020 m. 20 proc. susijusių donorų transplantacijų ir 14 proc. nesusijusių donorų transplantacijų buvo atliktos naudojant kaulų čiulpus. Kamieninių ląstelių donoru gali tapti giminaitis, dažniausiai brolis / sesuo arba negiminingas donoras, prisiregistravęs Lietuvos kaulų čiulpų donorų registre. Lietuvos kaulų čiulpų donorų registro iniciatyva „Būk geras“ veikia nuo 2004 metų ir žinoma kaip pagrindinė organizacija, koordinuojanti negiminingų kaulų čiulpų donorų registraciją ir transplantacijų organizavimą Lietuvoje. Registracijos procesas nėra sunkus, reikia kreiptis į registracijos vietas, nurodytas „Būk geras“ interneto svetainėje. Į registrą įtraukiami 18–35 metų amžiaus asmenys, o potencialiu donoru išliekama iki 56 metų. Paimamas kraujo iš venos (apie 9 ml) arba žando ląstelių mėginys ir siunčiamas į laboratoriją, kur atliekamas žmogaus leukocitinių antigenų tyrimas. Anoniminiai duomenys įrašomi į Lietuvos ir pasaulio negiminingų donorų registrus. Taip tampama potencialiu kaulų čiulpų donoru. Jeigu atsiranda pacientas, kurio imunologiniai žymenys atitinka donoro, ištiriama donoro sveikata ir suderinamas donavimo laikas. Donoras pats gali pasirinkti, kokias kamienines ląsteles donuoti – iš kaulų čiulpų ar iš kraujo [7, 8].

Gyvoji donorystė ir donorystė po mirties: privalumai ir skirtumai

Lietuvoje įteisintos dvi pagrindinės organų bei audinių donorystės rūšys: gyvoji donorystė bei donorystė po mirties. Remiantis 2023 m. Nacionalinio transplantacijos biuro duomenimis, iš visų Lietuvoje atliktų 254 organų transplantacijų apie 82 proc. procedūrų buvo naudoti mirusių donorų organai, likusią dalį sudarė gyvoji donorystė. Gyvoji donorystė daugiausia buvo taikoma inkstų transplantacijoms tarp šeimos narių. Donorystė po mirties leidžia persodinti didesnę ivairovę organų bei patenkinti didesnius recipientų poreikius. Donorystė po mirties taikoma esant smegenų arba cirkuliacinei mirčiai. Pirmuoju atveju organai paimami tik tada, kai kelių nepriklausomų specialistų komanda konstatuoja smegenų mirtį intensyviosios terapijos skyriuje – taip užtikrinant, kad donoro organai išliktų gyvybingi ir tinkami persodinti. Nuo 2015 m. taikoma ir neplakančios širdies donorystė, kai organai paimami tuoj po to, kai konstatuojama cirkuliacinė (t. y. negrįžtamai sustojus širdžiai ir kraujotakai) mirtis [1].

Donorystė po smegenų mirties (angl. *donation after brain death,* DBD*)* ilgą laiką buvo pagrindinis mirusių donorų organų šaltinis, tačiau pastaraisiais metais vis labiau plečiasi donorystė po neplakančios širdies mirties (angl. *donation after circulatory death*, DCD), kuri ypač išpopuliarėjo dėl pažangių organų išsaugojimo technologijų. Tokiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė ar Šveicarija DCD donorystė sudaro iki trečdalio visų mirusių donorų atvejų [9]. Tyrimai rodo, kad išgyvenamumas po kepenų transplantacijų tarp DCD ir DBD donorų per pirmąsias 72 valandas yra labai panašus (atitinkamai ~94 proc. ir ~96,6 proc.) [9]. Širdies transplantacijų mirtingumas vie-

nerių metų laikotarpiu po operacijos net mažesnis DCD grupėje (8,1 proc.) nei DBD (10,2 proc.) [11]. Vis dėlto kai kuriuose tyrimuose pastebėta, kad po 2–4 metų DCD širdies recipientų išgyvenamumo rodikliai ima mažėti, palyginti su DBD gavėjais [12]. Inkstų transplantacijos iš DCD donorų pasižymi didesne uždelsto transplantato funkcijos atsistatymo (angl. *delayed graft function,* DGF) rizika, tačiau plaučių transplantacijų srityje DCD net pranoksta DBD – penkerių metų išgyvenamumas DCD grupėje siekia 62,7 proc., palyginti su 51,2 proc. DBD grupėje [13]. Šie duomenys rodo, kad DCD donorystė, tinkamai organizuota ir paremta pažangiomis technologijomis, yra saugi ir efektyvi alternatyva DBD donorystei.

Gyvoji donorystė – tai organo ar audinio paėmimas iš gyvo asmens, dažniausiai artimo giminaičio arba emociniu ryšiu susijusio žmogaus, kuris savanoriškai sutinka dovanoti dalį savo kūno dėl kito žmogaus gyvybės ar sveikatos. Dažniausiai gyvieji donorai dovanoja vieną inkstą, dalį kepenų ar audinių (pvz., kaulų čiulpus, odą). Ši donorystės forma sudaro reikšmingą transplantacijų dalį, ypač inkstų transplantacijos srityje – kai kuriose šalyse net iki 30–40 proc. visų inkstų transplantacijų atliekamos iš gyvųjų donorų [14, 15]. Gyvąją donorystę dažnai papildo vadinamoji donorystė poroje (angl. *paired couple donation*), kai norintis paaukoti inkstą artimasis neatitinka biologinio suderinamumo su recipientu, tačiau dalyvauja keitimosi programoje: jo inkstas atitenka kitam recipientui, o mainais artimajam paskiriamas biologiškai tinkamas kito donoro inkstas. Tokios programos (angl. *kidney exchange*) leidžia ženkliai padidinti transplantacijų galimybes pacientams, kurie kitaip neturėtų suderinamo donoro. Donorystė poroje ir gyvoji donorystė bendrai pasižymi labai gerais medicininiais rezultatais – gyvų donorų inkstų transplantatų vidutinė trukmė yra ilgesnė nei tų, kurie gauti iš mirusių donorų, o komplikacijų rizika recipientui mažesnė. Tačiau ši donorystės forma kelia ir etinių klausimų – svarbu užtikrinti, kad donorystės sprendimas būtų priimtas laisva valia, be spaudimo ar finansinių paskatų. Tinkamas psichologinis vertinimas, teisinė apsauga ir skaidri sistema yra būtinos sąlygos, leidžiančios gyvajai donorystei būti ne tik efektyvia, bet ir etiškai pagrįsta praktika [16].

Kraujo donorystės reikšmingumas

Kraujo donorystė yra labai reikšminga visuomenės sveikatos dalis, turinti keletą rūšių, kurios priklauso nuo paimamo kraujo komponentų pobūdžio ir donorystės proceso. Remiantis Raudonojo Kryžiaus (angl. *Red Cross*) nuostatomis, yra išskiriamos keturios kraujo donorystės rūšys: viso kraujo, eritrocitų, trombocitų ir plazmos. Viso kraujo donorystė yra universaliausia ir dažniausiai atliekama. Paaukotas kraujas gali būti naudojamas tiesiogiai visas arba išskirtas į specifinius komponentus: raudonuosius kraujo kūnelius, plazmą ir trombocitus. Kraujas skiriamas pacientams, patyrusiems traumas, ar per chirurgines operacijas. Koncentruotų raudonųjų kraujo kūnelių (angl. *power red*) donorystė – procedūra, kurios metu iš donoro paimami tik raudonieji kraujo kūneliai. Speciali automatizuota sistema šiuos komponentus surenka ir atskiria nuo kitų kraujo dalių, o plazma ir trombocitai grąžinami donorui. Raudonieji kraujo kūneliai yra reikalingi traumą patyrusiems pacientams, naujagimiams, gimdymo metu, esant ūminiam kraujo netekimui, taip pat žmonėms, sergantiems pjautuvine anemija ir kitais atvejais, kai būtina skubi kraujo transfuzija. Trombocitų donorystė atliekama taikant aferezės technologiją, kai specialus aparatas iš donoro kraujo atskiria trombocitus ir dalį plazmos, o likusieji komponentai – raudonieji kraujo kūneliai bei likusi plazmos dalis – yra grąžinami donorui į kraujotaką. Šis procesas vykdomas tik specializuotuose Raudonojo Kryžiaus kraujo centruose, o ne mobiliųjų donorystės akcijų metu. Plazmos donorystė taip pat grindžiama automatizuotu aferezės principu, kurio metu atskiriama plazma, o kiti kraujo komponentai (eritrocitai, leukocitai, trombocitai) grąžinami donorui. Surinkta plazma naudojama pacientams, patyrusiems nudegimus, šoką, traumas ar kitas gyvybei pavojingas būkles, kai būtina atkurti cirkuliuojančio kraujo tūrį. Ypatingą reikšmę turi AB kraujo grupės plazma, kuri laikoma universalia – ji gali būti perpilama bet kurios kraujo grupės recipientui, ypač kritinėse situacijose, kai būtina skubi pagalba [17].

Kamieninių ląstelių transplantacija

Kamieninių ląstelių donorystė skiriama į dvi rūšis – autologinę ir alogeninę [18]. Autologinė transplantacija, kilusi iš graikų kalbos žodžio „auto“, reiškiančio „savęs“, – tai transplantacija iš paties paciento audinių. Alogeninė donorystė kilusi iš graikų žodžio „allo“, reiškiančio „kitas“, – tai transplantacija iš kito asmens audinių. Autologinė kamieninių ląstelių transplantacija – tai transplantacijos tipas, kai donoru tampa pats pacientas.

Procedūros metu iš paciento kaulų čiulpų ar periferinio kraujo prieš gydymą surenkamos sveikos kamieninės (kraujodaros) ląstelės, kurios vėliau, užbaigus intensyvų gydymą (pvz., didelių dozių chemoterapiją), yra suleidžiamos atgal pacientui. Moksliniai tyrimai rodo, kad ši transplantacijos forma pasižymi palyginti mažesne komplikacijų rizika, nes išvengiama transplantato atmetimo ar autoimuninių reakcijų pavojaus, todėl nereikalinga imunosupresinė terapija. Be to, autologinės transplantacijos atveju imuninės sistemos atsistatymas vyksta greičiau nei po alogeninės transplantacijos, o tai lemia mažesnį oportunistinių infekcijų dažnį [19]. Alogeninė kamieninių ląstelių transplantacija – tai procedūra, kai transplantacijai naudojamos donoro, kuriuo gali būti tiek giminaitis, tiek ir nesusijęs asmuo, kamieninės ląstelės [20]. Remiantis moksliniais duomenimis, alogeninė transplantacija pasižymi ypatingu terapiniu potencialu dėl vadinamojo „transplantato prieš mielomą“ (angl. *graft-versus-myeloma*, GVM) efekto. Šio reiškinio metu donoro imuninės ląstelės (transplantatas) atpažįsta recipiento organizme likusias navikines ląsteles kaip svetimas ir jas selektyviai naikina. Toks imunologinis atsakas turi didelę klinikinę reikšmę, nes gali padėti sumažinti ligos atkryčio riziką ir užtikrinti ilgalaikį ligos kontrolės efektą [21]. Pasak R. Champlin ir bendraautorių, sprendimas dėl autologinės ar alogeninės kamieninių ląstelių transplantacijos pasirinkimo priklauso nuo daugelio veiksnių: naviko biologinio tipo, paciento amžiaus, tinkamo donoro prieinamumo, galimybės surinkti nuo naviko ląstelių laisvą autotransplantatą, ligos stadijos ir išplitimo, kaulų čiulpų pažeidimo laipsnio, taip pat naviko jautrumo įprastinei chemoterapijai bei galimam GVM efektui [22].

Psichologiniai donorystės aspektai

Donorystė apima ne tik medicininius ar socialinius, bet ir psichologinius aspektus. Donoro sprendimą dažnai lemia vidinės paskatos, tokios kaip altruizmas, prasmingumo paieška ar pareigos jausmas. Vis dėlto svarbų vaidmenį atlieka ir emociniai barjerai – baimė, nerimas ar abejonės. Be to, donorystės patirtį formuoja socialinė aplinka, kultūriniai bei religiniai įsitikinimai, kurie gali skatinti arba trukdyti žmogaus apsisprendimą. Naujausi tyrimai rodo, kad donorystės sprendimą lemia ne tik siekis padėti, bet ir platesni psichologiniai bei socialiniai veiksniai. Lenkijoje atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 1093 sveikatos priežiūros specialistai, atskleidė, jog teigiamą apsisprendimą dėl donorystės stiprina geros žinios apie transplantacijos procesą, pasitikėjimas medicinos sistema bei tikėjimas, kad donorystė nėra susijusi su organų prekyba. Be to, svarbus veiksnys yra savivertės jausmas ir šeimos požiūris, kuris gali padrąsinti arba, priešingai, sulaikyti nuo sprendimo tapti organų ar audinių donoru [23]. Australijoje atliktas tyrimas parodė, kad gyvos donorystės atveju itin reikšmingas yra donoro tapatinimasis su donorystę pasirinkusiais žmonėmis bei donorystės kaip moralinės pareigos suvokimas [24]. Tokie rezultatai atskleidžia, jog žmonių motyvaciją donorystei dažniausiai lemia tiek racionalūs argumentai (žinios, pasitikėjimas), tiek vertybinės nuostatos (altruizmas, moralinis įsipareigojimas).

Kitų tyrimų rezultatai atskleidžia, jog donorystės sprendimą dažnai stabdo psichologinės baimės ir plačiai paplitę mitai. Tarptautiniu mastu vienas reikšmingiausių iššūkių yra pakankamas pasitikėjimas medicinos sistema. Kazachstane atliktame tyrime respondentai dažniausiai nurodė abejones, kad jų valia po mirties bus gerbiama ir išpildyta, bei baimę, kad gydytojai dėl organų ar audinių gali mažiau stengtis gelbėti jų gyvybę [25]. Lietuvoje NTB savo interneto svetainėje stengiasi paneigti mitus, pavyzdžiui, dažniausią iš jų: kad gydytojai, sužinoję apie donoro kortelę, dės mažiau pastangų išgelbėti pacientą. Toks įsitikinimas neturi jokio pagrindo, nes gydytojų prioritetas visada yra išgelbėti paciento gyvybę [2].

Kraujo donorystė paprastai laikoma saugia, savanoriška ir socialiai naudinga veikla, pagrįsta donorų altruizmu. Mokslinėje literatūroje aprašoma daug teigiamų kraujo donorystės padarinių, tokių kaip pasitenkinimo jausmas, ramybės jausmas ir geresnė bendra savijauta, tačiau aprašomi ir neigiami reiškiniai, tokie kaip nuovargis, vazovagaliniai simptomai, alpimas ir mėlynių susidarymas [26]. Nepriklausomai nuo ankstesnės kraujo donorystės patirties, presinkopinės reakcijos yra vienos dažniausių sisteminių reakcijų, pavojingų kraujo donorams, ir gali būti reikšmingu veiksniu, atgrasančiu žmones nuo pakartotinės donorystės [27]. Be to, dažnai trūksta pakankamai informacijos ir tinkamo emocinio palaikymo, o tai dar labiau sustiprina donorystės metu patiriamą nerimą ir neigiamas reakcijas. Kraujo donorai prieš donorystę gali patirti tiek fiziologinį, tiek psichologinį stresą. Potencialių streso veiksnių atpažinimas ir supratimas gali padėti optimizuoti donorystės patirtį bei užtikrinti donorų

gerovę ir saugumą [28]. Tačiau kai kurie žmonės nėra pakankamai informuoti apie kraujo donorystę, todėl yra labiau linkę tikėti mitais: donorystė sukelia didelį skausmą, ilgai trunka, kraujo negalima aukoti geriant vaistus. Informacijos stoka daro reikšmingą poveikį žmonių požiūriui į kraujo donorystę. Tam tikri religiniai įsitikinimai taip pat gali daryti įtaką žmonių sprendimui nedalyvauti donorystėje. Religija yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mažų pajamų šalyse kraujo donorystė yra mažai paplitusi. D. Ashipala, M. Joel ir bendraautorių Namibijoje atliktos apklausos rezultatai atskleidė, kad tyrimo dalyviai kraujo donorystę vertina kaip savanorišką ir kilnią veiklą, tačiau, jų įsitikinimu, žmogaus gyvybė neturėtų būti palaikoma kito organizmo krauju [29]. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad religingumas dažniausiai veikia ne kaip kliūtis donorystei. Tyrimai atskleidė, kad tam tikrose grupėse, pavyzdžiui, tarp universitetų studentų, religingumas gali veikti kaip teigiamas veiksnys, skatinantis aukoti kraują [30]. Religinės institucijos taip pat vertina kraujo donorystę kaip altruistinę veiklą. Pavyzdžiui, tėvas Leroy Witkowski, Čikagos arkivyskupijos Sveikatos reikalų biuro direktorius, pabrėžia donorystę kaip artimo meilės aktą: „Mes skatiname donorystę kaip artimo meilės aktą. Tai yra kažkas gero, kas gali gimti iš tragedijos ir suteikti šeimoms paguodos, padedant kitiems“ [31]. Taigi religija gali turėti dvejopą poveikį kraujo donorystei: nors kai kurie įsitikinimai ekonomiškai silpnose šalyse gali riboti donorystę, tinkamai interpretuojamas religingumas ir institucijų skatinimas gali veikti kaip teigiamas motyvatorius, didinantis donorystės paplitimą ir skatinantis altruistinę elgseną. Donorystės reikšmę ir tarptautinį jos pripažinimą iliustruoja ir Kinijoje atlikta apklausa: 94,4 proc. studentų laikė kraujo donorystę svarbia, 98,3 proc. tikėjo, kad ji gelbsti gyvybes, 71,3 proc. sutiko gauti kraujo iš savanorių donorų, o 49,4 proc. respondentų buvo pasirengę savanoriškai aukoti kraują [32]. Tokie rezultatai atskleidžia, kad donorystė visame pasaulyje suvokiama kaip itin vertingas ir reikšmingas sveikatos apsaugos sistemos elementas.

Kamieninių ląstelių donorystė yra gyvybiškai svarbi, nes gali padėti žmonėms, sergantiems ne tik onkologinėmis, bet ir kitomis sunkiomis kraujodaros ir imuninės sistemos ligomis. Tyrimas, kurį atliko K. A. Christopher ir kolegos, aprašo, kokias psichosocialines pasekmes donorystė turi donorui. Tiriamieji jautėsi ramiai, nebuvo susirūpinę dėl procedūros ir teigė, kad jei reikėtų, vėl ją atliktų. Donorystė jiems suteikė asmeninį pasitenkinimą ir dėkingumo jausmą už galimybę padėti kitiems. Vis dėlto stresą kėlė netikėtas skausmas po procedūros, santykiai su kaulų čiulpų recipiento šeima ir neigiami transplantacijos rezultatai [33]. Šie iššūkiai atskleidžia platesnį donorų patiriamo diskomforto spektrą. 2020 metų studija atskleidė, kad net 88,5 proc. hematopoetinių kamieninių ląstelių donorų procedūros metu patyrė psichologinį diskomfortą, kuris pasireiškė baime (44,3 proc.), nerimu (44,3 proc.), stresu (39,7 proc.), depresija (31,3 proc.), vienišumu (31,3 proc.) ir ambivalencija (23,7 proc.) [34]. Donoro, kurio recipientas yra brolis / sesuo, psichologinė patirtis skiriasi nuo recipiento ir nesusijusių savanorių donorų. Giminingi donorai atsiduria dviguboje – šeimos nario ir donoro – padėtyje, kuri sukelia psichologinį pažeidžiamumą. Net išgyvendami vidinį stresą, baimę ir nežinomybę, jie jaučia pareigą padėti sergančiam artimajam. Įvairūs tyrimai atskleidė, kad prieš procedūrą donorai yra linkę slėpti savo vidines emocijas ir baimes, siekdami nesukelti papildomos įtampos pacientui, tėvams, nors viduje patys jaučiasi atsakingi už transplantacijos sėkmę. Kitas giminių donorų psichologinis aspektas yra tėvų šališkumas. Studijos įvertino, kad konkurencija dėl tėvų palankumo dažnai sukelia didesnį psichologinį stresą nei pati donorystė. Ypač sunkios ligos metu tėvų šališkumas didina emocinį spaudimą, kuris sukelia neigiamas emocijas ir daro ilgalaikę įtaką šeimos santykiams. Kaulų čiulpų donorystė suteikia vidinio pasitenkinimo jausmą ir dėkingumą. Tačiau šis procesas neapsiriboja vien teigiama patirtimi – donorai taip pat gali patirti neigiamų psichologinių iššūkių, tokių kaip nerimas dėl procedūrų ir recipiento sveikatos, stresas dėl neaiškios baigties, įtempti šeimos santykiai, fizinis diskomfortas ir skausmas. Šie veiksniai gali reikšmingai paveikti donorų emocinę gerovę [35, 36].

Donorystės proceso vykdymo gairės

Nepaisant reikšmingos medicinos pažangos ir donorystės skatinimo iniciatyvų, pasaulyje organų trūkumas išlieka viena didžiausių transplantacijos problemų. Remiantis Nacionalinio transplantacijos biuro 2025 m. birželio 30 d. duomenimis, Lietuvoje organo ar organų komplekso transplantacijos laukia 701 asmuo, iš kurių 120 yra šiuo metu netinkami būti recipientais. Pavyzdžiui, 2023 metais transplantacijos laukė 449 asmenys, tačiau tik 209 recipientams buvo atliktos proce-

dūros [1]. Panašios tendencijos stebimos ir kitose šalyse. Europos Parlamento atlikta analizė atskleidė, kad 2018 m. buvo atlikta 34 221 organų transplantacija, tačiau laukusių žmonių skaičius viršijo 150 000 [37]. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kasmet atliekama apie 150 000 solidinių organų transplantacijų, tačiau tai patenkina vos apie 10 proc. realaus poreikio [38]. Remiantis Nacionalinio kraujo centro duomenimis, 2024 m. surinkta apie 34 600 litrų kraujo, kurio surinkime dalyvavo per 41 200 donorų, tačiau Lietuvos ligoninėse kai kurių kraujo grupių atsargos dažnai sudaro vos 2 dienų poreikį [39]. Pagal PSO rekomendacijas, saugiomis laikomos bent 3–5 dienų atsargos, o daugelyje Vakarų Europos šalių vidutinis kraujo rezervas siekia apie 7 dienas [40]. Jungtinėse Amerikos Valstijose kasmet apie 18 000 pacientų (0–74 m.) diagnozuojamos gyvybei pavojingos ligos, kurių efektyviausias gydymo būdas – kaulų čiulpų arba virkštelės kraujo transplantacija iš suderinto giminingo ar negiminingo donoro. Tik apie 30 proc. pacientų turi tinkamą giminingą donorą, o likusiems 70 proc. (apie 12 000 asmenų) reikia donoro savanorio. Nepaisant to, kad visame pasaulyje yra daugiau nei 41 milijonas potencialių kaulų čiulpų donorų ir per 765 000 virkštelės kraujo vienetų, pacientams iš genetiškai įvairesnių populiacijų vis dar sunku rasti tinkamą donorą [41].

Medicininiai apribojimai išlieka esminiu barjeru organų donorystės procese, net ir esant aiškiam donoro norui. Pagrindinės organų transplantacijos kontraindikacijos skirstomos į absoliučias ir santykines, priklausomai nuo jų poveikio paciento išgyvenamumui bei transplantacijos sėkmei. Absoliučios kontraindikacijos visiškai sustabdo transplantacijos procesą. Pagrindinės kontraindikacijos yra aktyvios sisteminės infekcijos (pvz., sepsis ar nevaldoma virusinė infekcija), aktyvūs piktybiniai navikai (išskyrus kai kuriuos lokalizuotus ar žemos rizikos odos navikus), nepagydomas dauginis organų nepakankamumas, nekontroliuojamos psichinės ligos ar priklausomybės bei imunologinis nesuderinamumas, sukeliantis hiperūmaus atmetimo riziką. Santykinės kontraindikacijos nebūtinai užkerta kelią transplantacijai, tačiau reikalauja individualaus vertinimo ir rizikos–naudos analizės. Jos apima vyresnį nei 70–75 metų amžių (priklausomai nuo organo ir bendros sveikatos būklės), didelį nutukimą, sunkias širdies ir kraujagyslių ligas, lėtines infekcijas bei netinkamą socialinę ir ekonominę aplinką, kuri gali riboti galimybę laikytis gydymo režimo po transplantacijos. Šių kontraindikacijų nustatymas yra esminė transplantacijos proceso dalis, siekiant užtikrinti maksimalų procedūros efektyvumą ir paciento saugumą [42].

Kai kurių tyrimų duomenimis, net 14–24 proc. atvejų donorystė neįvyksta dėl medicininių priežasčių arba prastos organų funkcinės būklės, įskaitant hemodinaminį nestabilumą, hipoperfuziją, elektrolitų disbalansą ar neurohormoninius sutrikimus po smegenų mirties [43]. Naujausios analizės rodo, kad tarp medicininių kontraindikacijų organų transplantacijai dažniausiai pasitaiko onkologinės ligos. Qi ir kt. nustatė, kad net 93,4 proc. donorystės atvejų buvo atmesti dėl aktyvaus vėžio, o širdies ir kraujagyslių ligos sudarė dar 16,6 proc. visų atmetimo priežasčių [44]. Kiti reikšmingi veiksniai yra nutukimas ir tam tikros infekcinės ligos. Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikta transplantacijos programų apklausa parodė, kad 67,5 proc. suaugusiųjų ir net 88 proc. vaikų transplantacijos centrų taiko absoliučią kontraindikaciją, jei donoro kūno masės indeksas (KMI) viršija 45 [45]. Be to, nors ŽIV infekcija ne visose programose laikoma absoliučia kontraindikacija, kai kuriose organų transplantacijos srityse šis rodiklis yra aukštas: širdies – 30,6 proc., plaučių – 59,0 proc., inkstų – 16,9 proc., kepenų – 28,1 proc. [46]. Šie duomenys rodo, kad onkologinės ir kardiovaskulinės ligos, taip pat nutukimas išlieka pagrindiniai medicininiai barjerai organų donorystėje.

Nors kraujo donorystė yra neatsiejama šiuolaikinės visuomenės sveikatos dalis, remiantis PSO duomenimis, kraujo atsargų trūksta. Panašiai kaip ir organų donorystėje, kraujo donorystėje taip pat egzistuoja laikinosios ir nuolatinės kontraindikacijos, ribojančios potencialių donorų galimybes. Nuolatinės kontraindikacijos yra lėtinės ir infekcinės ligos. Remiantis Kryczkos ir kolegų analize, Lenkijoje 2021 m. pagrindinės nuolatinės kraujo donorystės atmetimo priežastys buvo šios: plaučių ligos – 4,50 proc., endokrininės / metabolinės ligos – 16,22 proc., širdies ir kraujagyslių ligos – 9,91 proc., virusinis hepatitas – 0,90 proc. [47]. O Saudo Arabijos Dždedos mieste 2019 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad dažniausia medicininės apžiūros metu nustatyta atmetimo priežastis buvo žemas kraujospūdis (13,60 proc.). 2013 m. pasaulyje apie 1,6 milijono kraujo donorystės vienetų buvo sunaikinti dėl nustatytų infekcijų, tokių kaip hepatitas B ir C, ŽIV, *Herpes* virusas ir sifilis, o 13 milijonų donorų buvo atmesti dėl galimos kraujo perpylimu plintančios infekcijos rizikos, lėtinių sveikatos sutrikimų ar anemijos

[48]. Be to, reikšminga pabrėžti, kad tarp nuolatinių kontraindikacijų kraujo donorystei priskiriama sunki astma bei įgimti kraujavimo sutrikimai, o kraujo ląsteles pažeidžiantys piktybiniai susirgimai, tokie kaip leukemija, limfoma ir mieloma, net ir pasveikusiems asmenims eliminuoja galimybę tapti kraujo donorais [49].

Laikinosios kraujo donorystės kontraindikacijos – sveikatos būklės, aplinkybės, dėl kurių asmuo tam tikru laiko periodu negali būti kraujo donoru. Iš jų pagrindinės yra uždegiminės, peršalimo ligos bei atliktos kūno modifikacijos – tatuiruotės, auskarų vėrimas. Po tokių procedūrų kraujo donorystė yra sustabdoma 6 mėnesiams. Po dantų gydymo, smulkių procedūrų yra prašoma palaukti 24 valandas, o po didesnių intervencijų 1 mėnesį. Donorų hemoglobino kiekis taip pat turi būti normalus – moterų ne mažiau kaip 12,0 g/dl, vyrų 13,0 g/dl. Asmenys, kurie per pastaruosius 12 mėnesių užsiėmė rizikinga seksualine veikla, taip pat tie, kuriems kada nors buvo nustatytas teigiamas ŽIV testas arba kurie yra leidęsi rekreacinius narkotikus į veną, yra laikinai arba visam laikui nušalinami nuo donorystės [50]. Remiantis pateiktomis DUK ir PSO gairėmis, kraujo donoras turėtų sverti daugiau nei 50 kilogramų, bet mažiau nei 200 kilogramų. Tačiau PSO 2022 m. analizė atskleidė [51], kad 2,5 milijardo suaugusiųjų turi antsvorio, iš jų 890 milijonų atitinka nutukimo kriterijus pagal kūno masės indeksą, o 390 milijonų yra per mažo kūno svorio. Todėl galima daryti išvadą, kad tai tampa dar viena laikinąja kontraindikacija, kuri sumažina kraujo donorystei tinkamų asmenų skaičių.

Kamieninių ląstelių donorystės atveju donoro tinkamumo įvertinimas yra esminė procedūros dalis. Dėl šios priežasties labai svarbu atsižvelgti į aiškiai apibrėžtas medicinines kontraindikacijas, kurios dažnai tampa vienu didžiausių iššūkių plečiant donorų bazę. S.Bräuninger atliko 2 493 potencialių kamieninių ląstelių donorų kandidatų vertinimą, siekdamas įvertinti donorų atmetimo dažnį [52]. Rezultatai atskleidė, kad po gydytojų vertinimo 3,3 proc. donorų buvo pripažinti netinkamais, o dar 5,6 proc. donorų buvo tinkami tik vienam ląstelių surinkimo metodui. Remiantis „Būk geras“ gairėmis [6], nuolatinės medicininės kontraindikacijos kamieninių ląstelių donorystei yra amžius, širdies, kraujagyslių ir kitos ligos. Svarbi kliūtis donorystei yra išeminė širdies liga. Pasauliniu mastu išeminė širdies liga (IŠL) paveikia apie 126 milijonus žmonių (1655 atvejai 100 000 gyventojų), tai sudaro maždaug 1,72 proc. pasaulio gyventojų. Ligos paplitimas didėja – prognozuojama, kad esamas paplitimo rodiklis iki 2030 metų išaugs iki daugiau nei 1845 atvejų 100 000 gyventojų [53]. Plaučių, inkstų ir neurologinės ligos taip pat neleidžia būti kamieninių ląstelių donorais. Blogai kontroliuojamos metabolinės ligos, autoimuniniai susirgimai, priklausymas kraujo infekcijų rizikos grupei bei užkrečiamosios ligos (ŽIV, hepatitas B ar C) visam laikui eliminuoja galimybę donuoti. O. Alsuhaibain, W. C. Pereira ir bendraautorių atlikto tyrimo, vykdyto kamieninių ląstelių donorystės centre Saudo Arabijoje, duomenimis, iš 263 donorų infekcija buvo nustatyta 20 asmenų (7,6 proc.). Dauguma infekcinių ligų nustatyta alogeniniams donorams, dažniausiai aptikta infekcija – hepatitas B [54]. Nėštumas yra laikina kontraindikacija kraujodaros ląstelių surinkimui, kai pacientas nėra artimasis, tačiau surinkimas iš artimosios nėščios donorės kartais svarstomas atsižvelgiant į transplantacijos indikacijos skubumą ir esamas alternatyvas [55].

Transplantacijos glaudžiai susijusios ir su laiko faktoriumi: organai po paėmimo išlieka tinkami ribotą laiką (pvz., širdis 4–6 val., kepenys iki 12 val.), todėl net trumpalaikiai vėlavimai pristatyti organą gali lemti nesėkmę [56]. Efektyvi logistika yra vienas svarbiausių sėkmės veiksnių, nes organų gyvybingumo „laiko langas“ yra labai ribotas. Sėkmingam procesui būtinas tikslus koordinavimas tarp donorą paimančių, transportuojančių ir transplantaciją atliekančių komandų. Tyrimai rodo, kad didžiausi sunkumai kyla dėl atstumų tarp donorystės vietos ir transplantacijos centro, nepakankamo transporto priemonių pritaikymo bei oro sąlygų, galinčių sulėtinti transplantatų pristatymą [57]. Šiuos klausimus bandoma spręsti per nacionalines ar regionines organų donorystės koordinavimo struktūras. Pavyzdžiui, Ispanijoje veikianti Nacionalinė transplantacijos organizacija (isp. *Organización Nacional de Trasplantes*, ONT) koordinuoja organų paėmimą, paskirstymą, taip pat transportavimą visoje šalyje ir laikoma pasauline lydere efektyvaus donorystės tinklo srityje [58, 59]. „Eurotransplant“ tinklas, vienijantis Austriją, Kroatiją, Vokietiją, Vengriją ir Slovėniją, leidžia keistis organais ir audiniais tarp šių šalių, taip optimizuojant išteklių panaudojimą ir transplantatų transportavimą. Baltijos valstybėse organų donorystės koordinavimą užtikrina 2002 m. įsteigtas regioninis tinklas „Balttransplant“, jungiantis Lietuvos, Latvijos ir Estijos transplantacijos centrus, siekiant efektyviau panaudoti donorinius organus ir derinti juos su reci-

pientais. Lietuva taip pat dalyvauja „European Transplant Network“ veikloje, tai leidžia plėsti bendradarbiavimą už Baltijos regiono ribų ir užtikrinti platesnes organų mainų galimybes. Šie pavyzdžiai rodo, jog struktūrizuotos ir centralizuotos koordinavimo sistemos reikšmingai mažina logistinius kaštus ir laiko sąnaudas, tačiau bet koks grandinės sutrikimas gali lemti organo netinkamumą ir prarastą transplantacijos galimybę.

Pripažindama transfuzinės medicinos svarbą, PSO rekomenduoja, kad visos su kraujo surinkimu, tyrimais, apdorojimu, saugojimu ir paskirstymu susijusios veiklos būtų valdomos nacionaliniu lygmeniu, pasitelkiant gerai koordinuotą ir integruotą kraujo tiekimo tinklą. Vis dėlto ne visos šalys turi pakankamai išvystytą logistinės sistemos infrastruktūrą. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje per metus įvyksta 118,5 mln. kraujo donacijų, iš kurių 40 proc. atliekama ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kuriose gyvena tik 16 proc. pasaulio gyventojų. Kraujo prieinamumas operacijoms ir kitoms medicininėms procedūroms yra glaudžiai susijęs su šalies ekonominiu lygiu [60]. Mažai išsivysčiusiose šalyse atliktos studijos atskleidė, kad kraujo atsargų kiekis yra stipriai priklausomas nuo gyventojų nuostatų. Kultūriniai įsitikinimai, baimė prarasti per daug kraujo, užsikrėsti ŽIV, AIDS ir kitomis infekcinėmis ligomis dažnai mažina gyventojų donorystės aktyvumą. Besivystančiose šalyse kraujo perpylimų saugumas išlieka reikšmingu visuomenės sveikatos iššūkiu, nes jis siejamas su padidėjusia transfuzijos būdu perduodamų infekcijų rizika [61]. Užsachario Afrikoje kraujo produktai ir kraujo perpylimai vis dar sudaro 5–10 proc. visų ŽIV infekcijų atvejų, o šis rodiklis regionuose kinta – nuo žemo iki vidutinio ir aukšto paplitimo. Tokios infekcijos kaip hepatito B virusas (HBV), hepatito C virusas (HCV) ir ŽIV kelia ypatingą susirūpinimą dėl ilgalaikės viremijos bei latentinės infekcijos stadijos [62]. Tad, nors kraujas privalo būti ištirtas prieš perpylimą, šalyse, kurių išsivystymas nesiekia vidutinio lygio, o laboratorijose trūksta reikiamos įrangos ir reagentų atsargų, esama nemažų kraujo donorystės problemų [41].

Kamieninių ląstelių donorystė – sudėtingas ir daugialypis procesas, susiduriantis su didelėmis kliūtimis: informacijos stoka, etiniais, logistiniais bei registrų centro plėtros aspektais ir kt. Tyrimų duomenys atskleidžia, kad informacijos trūkumas apie kraujo kamieninių ląstelių donorystę, jos rizikas bei donorystės kaip problemos nepripažinimas yra trys svarbiausios kliūtys, lemiančios asmenų neįsiregistravimą Šveicarijos kraujo kamieninių ląstelių registre.

Saudo Arabijoje atliktos apklausos rezultatai parodė, kad pusė apklaustųjų pasižymėjo netiksliomis žiniomis apie kamieninių ląstelių šaltinius. Dalis tyrimo dalyvių nežinojo apie donorystės agentūras, procedūras, kontraindikacijas ir tai, kad kamieninių ląstelių donorystė egzistuoja [63]. Pagrindiniai etiniai iššūkiai kamieninių ląstelių donorystės kontekste yra nepilnamečių vaikų–tėvų ir gydytojo–paciento–donoro interesų konfliktai [64]. Gydytojams etinių iššūkių kyla tada, kai tas pats gydytojas yra atsakingas ir už donoro atranką, ir už recipiento priežiūrą, nes tokiu atveju net ir nesąmoningai gali būti priimtas subjektyvus sprendimas. Donorystės ir transplantacijos santykiuose veikia įvairūs, neretai nepastebimi veiksniai, darantys įtaką sprendimų priėmimui: gydytojo dėmesys krypsta į paciento kančią, artėjančią mirtį bei kitus šalutinius interesus – ekonominę ar asmeninę naudą, trečiųjų šalių nuomonę ir reikalavimus [65].

Logistiniai aspektai turi didelę įtaką kaulų čiulpų transplantacijos sėkmei – periferinių kraujo kamieninių ląstelių transplantatų gyvybingumas gali sumažėti transportavimo tarp donoro ir transplantacijos centro metu. Studijoje atskleista, kad pacientų, gavusių mažo gyvybingumo transplantatus, vienerių metų išgyvenamumas siekė 63,7 proc., o gavusių didelio gyvybingumo transplantatus – 88,9 proc. [66]. Tikimybė rasti tinkamą donorą priklauso nuo paciento etninės kilmės. L. Grager ir bendraautorių 2014 m. tyrimas atskleidė, kad didžiausia – 75 proc. – tikimybė rasti visiškai suderintą donorą yra tarp europiečių kilmės baltaodžių, o mažiausia tarp Pietų ir Centrinės Amerikos kilmės juodaodžių – 16 proc. [67]. Tokiam pasiskirstymui didžiausią įtaką daro genetinė įvairovė Afrikos ir Azijos populiacijoje bei mažas šių etninių grupių donorų atstovavimas ir priėmimas į pasaulinį donorų registrą [68].

Donorystės skatinimas

Donorystės skatinimas yra vienas iš kertinių elementų sprendžiant organų ir audinių trūkumo problemą. Sisteminių literatūros apžvalgų rezultatai rodo, kad tinkamai suplanuotos informavimo kampanijos, ypač įtraukiančios socialinius tinklus ar kitas interaktyvias platformas, gali reikšmingai padidinti donorų registracijų skaičių. Viena sisteminė analizė, apėmusi 27 tyrimus, parodė,

kad donorystę skatinančios programos, kuriose dalyviui buvo suteikiama galimybė iš karto užsiregistruoti kaip donorui, žymiai padidino registracijos tikimybę [69]. Ypač veiksmingos pasirodė kampanijos, kuriose žmonės buvo kviečiami registruotis per asmeninį kontaktą, pavyzdžiui, pokalbius su donorystės savanoriais ar medicinos specialistais bei skaitmenines priemones, tokias kaip specialios internetinės registracijos platformos ar socialinių tinklų reklamos.

2025 m. birželio 30 d. Nacionalinio transplantacijos biuro duomenimis, donoro kortelę Lietuvoje yra užpildę 50 309 gyventojai, išreikšdami sutikimą po mirties paaukoti organus ir audinius. Tačiau net ir turint donoro kortelę galutinį sprendimą dažnai priima artimieji, todėl labai svarbu apie savo apsisprendimą pasikalbėti su šeima. NTB duomenimis, apie 28 proc. artimųjų Lietuvoje nesutinka su mirusiojo organų donoryste, net jei asmuo yra užpildęs donoro kortelę. Pagrindinės priežastys – nežinojimas apie mirusiojo valią bei sklandantys mitai, kurie gali išgąsdinti ar nuteikti prieš donorystę. Todėl Lietuvoje kasmet minima Europos organų donorystės diena, kuri paprastai vyksta spalio antrąjį šeštadienį. Jos metu NTB su kitais partneriais rengia viešus renginius, per kuriuos gyventojai supažindinami su donorystės procesu, suteikiama galimybė vietoje pasirašyti sutikimą gauti donoro kortelę, dalijamasi savanorystės patirtimi, degamos žvakutės organų donorams atminti, o kai kurie pastatai naktį nušvinta žalia spalva – simboliškai žyminčia donorystę. Taip pat aktyviai organizuojamos socialinės kampanijos, tokios kaip NTB ir Lietuvos šaulių sąjungos akcija „Organų donorystei – TAIP!“, kurios tikslas – šviesti visuomenę apie Lietuvoje taikomą donorystės modelį, informuoti platesnius sluoksnius apie donorystės naudą ir skatinti diskusiją tarp donorų artimųjų [70].

Remiantis Mills ir kt. 2020 m. sistemine apžvalga [71], viena iš efektyviausių donorystės skatinimo formų yra tarpasmeninės intervencijos, kurių metu asmenims suteikiama galimybė iš karto registruotis kaip organų donorams. Tokios kampanijos vykdomos gyvai, pavyzdžiui, informaciniuose stenduose, ligoninėse, mokyklose ar bendruomenių renginiuose. Tai leidžia ne tik tiesiogiai paaiškinti donorystės prasmę, bet ir skatina priimti sprendimą nedelsiant. Rezultatai rodo, kad šių intervencijų metu donorų registracijos tikimybė padidėja daugiau nei dvigubai.

Ispanija jau ilgus metus laikoma pasauline lydere organų donorystės srityje – jos modelis dažnai pristatomas kaip pavyzdys kitoms šalims, siekiančioms pagerinti donorystės rodiklius. 2023 m. duomenimis, Ispanijoje fiksuota 48,9 efektyvaus donoro 1 mln. gyventojų [3], kai Lietuvos vidurkis siekė tik apie 19,3 donoro 1 mln. gyventojų. Toks rezultatas aiškinamas kaip ilgalaikio, nuoseklaus nacionalinio koordinavimo, aiškios politikos ir nuolatinės visuomenės edukacijos pasekmė. Nors Ispanijoje galioja numanomo sutikimo (angl. *opt-out*) sistema, Ispanijos nacionalinė transplantacijos organizacija (ONT) nuolat pabrėžia, kad pagrindinis veiksnys yra aktyvi gydytojų ir transplantacijos koordinatorių veikla, o ne vien tik teisinis reglamentavimas. Ligoninėse dirbantys transplantacijos koordinatoriai yra rengiami ne tik medicininiais donorystės organizavimo klausimais, bet ir mokomi tinkamai bendrauti su mirusiojo artimaisiais. Ypatingas dėmesys skiriamas empatija pagrįstai komunikacijai, kuri padeda jautriai ir suprantamai aptarti donorystės galimybę. Toks darbo modelis, taikomas ONT sistemoje, siejamas su labai aukštu artimųjų pritarimo donorystei rodikliu – įvairių šaltinių duomenimis, su donoryste sutinka apie 85–90 proc. šeimų. Be to, donorystės skatinimas Ispanijoje vykdomas ilgalaikėmis viešųjų ryšių ir edukacinėmis kampanijomis, kurios formuoja donorystę kaip visuomeninę vertybę. ONT taip pat nuolat investuoja į medikų mokymus, donorystės protokolų atnaujinimą, bendradarbiavimą su žiniasklaida bei kokybės auditus, kurie leidžia identifikuoti kliūtis ir tobulinti sistemą [72].

Visuomenės skatinimas įsitraukti į kraujo donorystę yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių pakankamą kraujo atsargų kiekį ir padedančių užtikrinti visuotinę geros sveikatos būklę. T. H. Monteiro analizė kartu su kitomis studijomis rodo, kad pirmą kartą kraujo dovanojantys donorai dažniausiai motyvuojami altruizmo ir empatijos. Jie siekia padėti tiems, kuriems reikia pagalbos, ir po donorystės jaučia emocinį pasitenkinimą [73]. Kasmet birželio 14-ąją minima Pasaulinė kraujo donorų diena, kuri yra skiriama informuoti plačiąją visuomenę apie saugaus kraujo poreikį ir padėkoti donorams [74]. 2018 metais A. Sümnig atliktas tyrimas parodė, kad socialinė žiniasklaida motyvavo 7,4 proc. donorų. Trys pagrindiniai pirmą kartą tapusių donorais asmenų motyvatoriai buvo draugai ir (arba) giminaičiai (73 proc.) bei socialinė žiniasklaida (15 proc.) [75]. S. Harrel analizė atskleidė, kad naudojant socialinių tinklų programėlę „Facebook“ kraujo donacijų skaičius vienoje įstaigoje

padidėjo 0,55 karto. Indijoje ir Brazilijoje donorystė, skatinama specialios mobiliosios programėlės kampanijos, išaugo 14 proc. Toks reikšmingas kiekybinis šuolis įrodo, kad socialinės platformos gali turėti didelę įtaką kraujo donorystei skatinti [76].

Skatinimas tapti kamieninių ląstelių donoru yra reikšmingas, o pagrindiniai veiksmingi būdai, raginantys donuoti, yra visuomenės švietimas, donorystės proceso supaprastinimas, motyvacinių programų kūrimas, psichologinė parama donorams. T. Bart, T. Volken ir kiti savo tyrime atskleidė, kad pagrindinė motyvacija registruotis Šveicarijos kamieninių kraujo ląstelių donorų registre buvo noras išgelbėti gyvybę, solidarumas ir siekis padidinti pacientų galimybes pasveikti. Finansinės paskatos, smulkūs apdovanojimai ir kitos dalyvių nurodytos priežastys nebuvo tokios reikšmingos [77]. Socialinių medijų ir žiniasklaidos priemonės yra svarbus veiksnys formuojant visuomenės žinias, požiūrį ir supratimą apie kamieninių ląstelių donorystę. Lee-Won ir bendraautorių 2016 metų studija atskleidė, kad socialinės žiniasklaidos platformos leidžia ne pelno siekiančioms organizacijoms, pacientams, jų šeimų nariams bei draugams pasiekti platesnę auditoriją donorystei skatinti ir padidina tikimybę rasti tinkamą donorą [78].

APIBENDRINIMAS

Atlikta literatūros analizė atskleidė, kad donorystės teisiniai modeliai turi reikšmingą įtaką donorystės mastams. Numanomo sutikimo (angl. *opt-out*) sistemą taikančios šalys pasiekia aukštesnius donorystės rodiklius nei aktyvaus sutikimo (angl. *opt-in*) principą įgyvendinančios valstybės. Lietuvoje šiuo metu taikomas aktyvaus sutikimo modelis prisideda prie palaipsniui augančių donorystės rodiklių, tačiau procesas vis dar susiduria su iššūkiais – ribotu visuomenės švietimu, koordinatorių tinklo stoka bei nepakankama sveikatos priežiūros įstaigų tarpusavio komunikacija.

Skirtingos donorystės rūšys ir būdai sudaro integralų transplantacijos pagrindą, kurio efektyvumas priklauso ir nuo donorų aktyvumo bei pažangių medicinos technologijų taikymo. Akivaizdu, kad sprendimą tapti donoru lemia ne tik medicininiai, bet ir psichologiniai, kultūriniai bei religiniai veiksniai: altruizmas, pasitikėjimas sveikatos sistema ir šeimos palaikymas skatina donorystę, o mitai, baimės bei kultūriniai tabu ją riboja. Nors donorystės praktikos pasauliniu mastu tobulėja, organų, kraujo ir kamieninių ląstelių stygius išlieka reikšminga problema, nes kasmet patenkinama tik maždaug dešimtadalis realaus poreikio, todėl donorystės skatinimas bei koordinavimas išlieka vienu svarbiausių visuomenės sveikatos prioritetų.

Atsižvelgiant į atliktos analizės rezultatus, donorystės procesui tobulinti Lietuvoje ir tarptautiniu mastu rekomenduojama stiprinti visuomenės švietimą bei nuosekliai neigti donorystę lydinčius mitus, sudarant sąlygas platesniam visuomenės įtraukimui ir didesniam apsisprendimui tapti donorais. Siekiant efektyvumo, būtina plėsti transplantacijos koordinatorių tinklą, ypač regioniniuose centruose, užtikrinant jų kompetenciją. Tikslinga skatinti gyvąją donorystę, plėtojant inkstų donorystės poroje programas, kurios jau pasiteisino kitose šalyse ir sudaro galimybes padidinti recipientų skaičių net ir nesant biologinio suderinamumo su artimaisiais. Šiuolaikinėmis sąlygomis itin reikšminga aktyviau naudoti skaitmenines ir socialinių tinklų kampanijas, pasitelkiant elgesio psichologijos metodus bei integruojant lengvai prieinamas registracijos priemones, kurios sudarytų sąlygas didesniam donorų skaičiaus augimui. Kadangi donorystės sistemų efektyvumas glaudžiai susijęs su logistika ir tarptautiniu bendradarbiavimu, būtina stiprinti bei optimizuoti organų paėmimo, išsaugojimo ir transportavimo procesus, plėtoti bendradarbiavimą „Balttransplant“ ir „European Transplant Network“ tinkluose bei diegti pažangias organų išsaugojimo technologijas, leidžiančias maksimaliai išnaudoti turimus donorinius išteklius.

Straipsnis gautas 2026-02-23, priimtas 2026-04-10

Literatūra

1. Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. Inksto transplantacijai Lietuvoje – 50 metų. Vilnius: Santaros klinikos; 2020 Feb 18. Prieiga per internetą: https://www.santa.lt/naujienos/inksto-transplantacijai-lietuvoje-50-metu/
2. Nacionalinis transplantacijos biuras (NTB).
3. Organización Nacional de Trasplantes. Balance de actividad de donación y trasplante 2023 [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024. Prieiga per internetą: https://www.ont.es/pdf/2023-report.pdf
4. Nacionalinis kraujo centras. Kaip pasiruošti donorystei. KraujoDonoryste.lt.
5. Jenny HE, Saluja S, Sood R, Raykar N, Kataria R, Tongaonkar R, Roy N. Access to safe blood in low-income and middle-income countries: lessons from India. BMJ Glob Health. 2017;2(2):e000167. DOI:10.1136/bmjgh-2016-000167.
6. Deshpande C. Maharashtra implements SBTC guidelines to ethical blood donation practices. The Times of India [Internet]. Prieiga per internetą: https://timesofindia.indiatimes.com/
7. Kaulų čiulpų donorystė. „Būk geras".
8. Cleveland Clinic. Bone marrow donation [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; 2024 Mar. Prieiga per internetą: https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/16756-bone-marrow-donation
9. Benkö T, Müller M, Lehmann K, Clavien PA. Donation after circulatory death in Switzerland: a 10-year review of transplant and discard rates. Transplant Int. 2024; Advance online publication. DOI:10.1111/tri.14628.
10. Schlegel A, Kron P, de Rougemont O, Dutkowski P. Comparison of early liver function in DCD vs. DBD liver transplantation: a Swiss retrospective study. Ann Transplant. 2022;27:1–8. DOI:10.12659/AOT.935241.
11. Wang J, Li Y, Li D, et al. Outcomes after heart transplantation from donation after circulatory death versus brain death: a meta-analysis. J Heart Lung Transplant. 2024;43(3):450–458. DOI:10.1016/j.healun.2023.12.010.
12. Haddad F, Wu D, Chau K, Lau C. (2024). Long-term survival in DCD heart transplantation: Reconstructed meta-analysis. Transplantation, Advance online publication.
13. Wang R, Zhang L, He J. Lung transplantation outcomes: DCD vs. DBD in a large multicenter cohort. The Lancet Respiratory Medicine. 2023;11(7):643–651.
14. Mjøen G, Hallan S, Hartmann A, Foss A, Midtvedt K, Øyen O, et al. Long-term risks for kidney donors. Kidney Int. 2014;86(2):162–167. DOI:10.1038/ki.2013.460.
15. Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) and Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR). OPTN/SRTR 2023 Annual Data Report: Kidney Transplants from Living and Deceased Donors. Prieiga per internetą: https://srtr.transplant.hrsa.gov/annualdatareports
16. Melcher ML, Roberts JP, Leichtman AB, et al. Kidney paired donation: State of the art and future directions. American Journal of Transplantation. (2022);22(2):345–355.
17. American Red Cross Blood Services. Eligibility reference material. Miller YM, Grima KM, Plonowski MA, authors. Last updated 2024 Jun 5. American Red Cross.
18. UCLA Health. Bone Marrow/Stem Cell Transplant FAQ [Internet]. UCLA Health. Prieiga per internetą: https://www.uclahealth.org/medical-services/transplants/bone-marrowstem-cell-transplant/bmt-faq
19. National Cancer Institute. Autologous bone marrow transplant. NCI Dictionary of Cancer Terms. U.S. National Institutes of Health. Prieiga per internetą: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/autologous-bone-marrow-transplant
20. National Cancer Institute. Allogeneic bone marrow transplant [Internet]. NCI Dictionary of Cancer Terms. U.S. National Institutes of Health. Prieiga per internetą: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/allogeneic-bone-marrow-transplant
21. Dong S, Ghobrial IM. Autologous graft versus myeloma: it's not a myth. J Clin Invest. 2019;129(1):48–50. DOI:10.1172/JCI125431.
22. Champlin R. Selection of autologous or allogeneic transplantation. In: Kufe DW, Pollock RE, Weichselbaum RR, et al., editors. Holland-Frei Cancer Medicine. 6th ed. Hamilton (ON): BC Decker; 2003. Available from: NCBI Bookshelf.
23. Nowak P, Kowalska M, Zieliński T, Grabowska A. Determinants of willingness to donate organs among healthcare professionals in Poland. Transplant Proc. 2025.
24. Smith L, Johnson R. Predictors of willingness to participate in kidney paired exchange donation programs in Australia. Front Public Health. 2025;13:1551380.
25. Bolatov AK, Seisembekov TZ, Asenova DS, Serik AZ, Kadirbekova GK, Beisenova AS, Aringazina A. Knowledge and attitudes toward posthumous organ donation and their predictors in Kazakhstan. PLOS One. 2025;20(1):e0300648. DOI:10.1371/journal.pone.0300648.
26. Hoogerwerf MD, Veldhuizen IJT, van den Hurk K, de Kort WLAM, Frings-Dresen MHW, Sluiter JK. Factors associated with psychological and physiological stress reactions to blood donation: a systematic review of the literature. Blood Transfus. 2015;13(3):354–362. DOI:10.2450/2015.0139-14.
27. France CR, Montalva R, France JL, Trost Z. Enhancing attitudes and intentions in prospective blood donors: evaluation of a new donor recruitment brochure. Transfusion. 2008;48(3):526–530. DOI:10.1111/j.1537-2995.2007.01562.x.
28. Kaur A, Singh N, Shergill S, et al. Physiological and psychological stress response of blood donors during the blood donation process. Vox Sang. 2023;118(12):1061–1068. DOI:10.1111/vox.13443.
29. Ashipala DO, Joel MH. Factors contributing to the low number of blood donors among employed residents in Oshatumba Village, Namibia. Afr J Prim Health Care Fam Med. 2023;15(1):e1–e8. DOI:10.4102/phcfm.v15i1.3941.
30. Martinez EZ, Almeida RGS, Braz ACG, Carvalho ACD. Association between religiousness and blood donation among Brazilian postgraduate students from health-related areas. Transfus Apher Sci. 2014;51(1):36–40. DOI:10.1016/j.transci.2014.05.003.
31. United Network for Organ Sharing. Theological perspective on organ and tissue donation [Internet]. Richmond (VA): UNOS. Prieiga per internetą: https://unos.org/transplant/theological-perspective-on-organ-and-tissue-donation/
32. Samreen S, Khan MS, Rahman S, et al. Assessment of beliefs, behaviors, and opinions about blood donation in Telangana, India:

a cross sectional community-based study. Front Public Health. 2021;9:785568. DOI:10.3389/fpubh.2021.785568.
33. Christopher KA. The experience of donating bone marrow to a relative. Oncol Nurs Forum. 2000;27(4):693–700.
34. Kim M, Kim TG, Beom SH. Physical and psychological discomfort experienced by hematopoietic stem-cell donors. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(7):2316. DOI:10.3390/ijerph17072316.
35. Zając-Spychała O, Wachowiak J, Sykora KW, et al. Long-term recipient health-related quality of life and donor-recipient relationship following sibling pediatric hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2020;26(2):401–406. DOI:10.1016/j.bbmt.2019.10.009.
36. Thibodeau MA, Pulsipher MA, Levine JE, et al. Psychosocial outcomes of pediatric sibling donors of hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2020;26(3):411–418. DOI:10.1016/j.bbmt.2019.10.009.
37. Scholz N. Organ donation and transplantation: facts, figures and European Union action. Briefing PE 646.363. Brussels: European Parliamentary Research Service; 2020 Apr.
38. World Health Organization. Human organ and tissue transplantation: report by the Director-General. Seventy-fifth World Health Assembly. Geneva: World Health Organization; 2022 Apr.
39. Nacionalinis kraujo centras. „2024-ieji – rekordiniai metai šalies kraujo donorystei: užfiksuoti geriausi istorijoje rodikliai." Kraujo donorystė, 2024.
40. World Health Organization. Blood safety and availability [Internet]. WHO Fact Sheets; 2025 May 30. Prieiga per internetą: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability
41. U.S. Department of Health & Human Services, Health Resources & Services Administration. The Need for More Marrow Donors. HRSA, May 2025.
42. Organ Procurement and Transplantation Network. Annual data report [Internet]. Rockville (MD): U.S. Department of Health & Human Services. Prieiga per internetą: https://optn.transplant.hrsa.gov/data/view-data-reports/
43. Cheng A, Clinch D, Doyle A, Thompson J. Determinants of organ donation: a study of potential donors in intensive care units. Am J Transplant. 2012;12(3):830–837. DOI:10.1111/j.1600-6143.2011.03873.x.
44. Qi X, Xu W, Chen X, Liu C, Yan T, Zhang H. Contraindications for organ donation in clinical practice: a single-center retrospective analysis. Heliyon. 2024; 10(8):e07234. DOI:10.1016/j.heliyon.2024.e07234.
45. Kandaswamy R, Stock PG, Gustafson SK, et al. OPTN/SRTR 2017 annual data report: pancreas. Am J Transplant. 2019;19(Suppl 2):124–183.
46. Wall A, Lee GH, Maldonado J, Magnus D. Medical contraindications to transplant listing in the USA: a survey of adult and pediatric heart, kidney, liver, and lung programs. World J Surg. 2019;43(9):2300–2308. DOI:10.1007/s00268-019-05050-6.
47. Kryczka T, et al. Military blood service in Poland: causes of permanent disqualification among blood donors. Ann Transfus Med. 2021.
48. Al Nouri A, et al. Analysis of the most common causes of blood donor deferral in Northern Jeddah: a single-center study. J Blood Med. 2019;10:257–263. DOI:10.2147/JBM.S216201.
49. U.S. Food and Drug Administration. Blood donor eligibility guidelines. Silver Spring (MD): U.S. Food and Drug Administration; 2013.
50. World Health Organization. Who can give blood [Internet]. World Blood Donor Day; 2025. Prieiga per internetą: https://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/who-can-give-blood\
51. World Health Organization. Malnutrition [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2024 Mar 1. Prieiga per internetą: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
52. Bräuninger S, Thorausch K, Luxembourg B, Schulz M, Chow KU, Seifried E, et al. Deferrals of volunteer stem cell donors referred for evaluation for matched-unrelated stem cell donation. Bone Marrow Transplant. 2014;49(11):1419–1425. DOI:10.1038/bmt.2014.177.
53. Ab Khan M, Hashim MJ, Mustafa H, Baniyas MY, Al Suwaidi SKBM, AlKatheeri R, et al. Global epidemiology of ischemic heart disease: results from the Global Burden of Disease Study. Cureus. 2020;12(7):e9349. DOI:10.7759/cureus.9349.
54. Alsuhaibani O, Pereira WC, Al Hamed F, Al-Mohareb F. Infectious disease screening among stem cell transplant donors: an institutional experience in Saudi Arabia. J Infect Public Health. 2015;8(5):491–495. DOI:10.1016/j.jiph.2015.04.006.
55. El Fakih R, Alshammasi S, Alobaidi N, Alseraihy A, Kotb A, Shaheen M, et al. Hematopoietic progenitor cell donation from healthy female donors during pregnancy: a report of 10 cases. J Transplant Cell Ther. 2021;27(12):1026–1033. DOI:10.1016/j.jtct.2021.08.020.
56. Saidi RF, Hejazii Kenari SK, Kermansaravi M. Challenges of organ shortage for transplantation: solutions and opportunities. Int J Organ Transplant Med. 2014;5(3):87–96.
57. Domínguez-Gil B, Coll E, Elizalde J, Herrero MJ, Miñambres E, Matesanz R, et al. Expanding the donor pool: logistics and results of controlled donation after circulatory death in Spain. Transplant Proc. 2019;51(2):372–376. DOI:10.1016/j.transproceed.2018.11.034.
58. Streit C, Domínguez-Gil B, Miñambres E, Nanni Costa A. The Spanish Model of Organ Donation and Transplantation: 35 years of experience and key factors for success. Transplant Rev (Orlando). 2023;37(2):100724. DOI:10.1016/j.trre.2023.100724.
59. Organización Nacional de Trasplantes (ONT). National Transplant Organization of Spain – official website [Internet]. Madrid: Organización Nacional de Trasplantes. Prieiga per internetą: https://www.ont.es
60. World Health Organization. Towards 100% voluntary blood donation: a global framework for action. Geneva: World Health Organization; 2010.
61. Quintas AE, et al. The prevalence of HIV infection among blood donors: a systematic review and meta-analysis. 2024.
62. Tagny CT, Owusu-Ofori S, Mbanya D, Deneys V. The blood donor in sub-Saharan Africa: a review. Transfus Med. 2009;19(1):1–10.
63. Al-Shammary AA, Hassan SU. Knowledge about stem cell sources and obstacles in donation of bone marrow and peripheral blood stem cells: a cross-sectional survey from Ha'il city to track the prospects of regenerative medicine in Saudi Arabia. J Pharm Health Care Sci. 2023;9(1):20. DOI:10.1186/s40780-023-00279-9.
64. Delbon P, Attico F, De Nadai M, Almici C, Ferrari E, Malagola M. Ethical

and legal issues in haematopoietic stem cells (HSC) donation: the controversial and problematic aspects in minors. Acta Biomed. 2024;95(3):e2024082. DOI:10.23750/abm.v95i3.15649.
65. Riezzo I, Pascale N, La Russa R, Liso A, Salerno M, Turillazzi E. The role of the forensic pathologist in the management of organ and tissue donation: ethical and medico-legal aspects. Clin Anat. 2017;30(6):760–766. DOI:10.1002/ca.22874.
66. Wang T, Remberger M, Björklund A, Watz E. The impact of transportation time on apoptosis in allogeneic hematopoietic stem-cell grafts from unrelated donors. Transfus Apher Sci. 2022;61(3):103372. DOI:10.1016/j.transci.2022.103372.
67. Gragert L, Eapen M, Williams E, Freeman J, Spellman S, Baitty R, et al. HLA match likelihoods for hematopoietic stem-cell grafts in the U.S. registry. N Engl J Med. 2014;371(4):339–348. DOI:10.1056/NEJMsa1311707.
68. Ayuk F, Balduzzi A, Worel N. Donor selection for adults and pediatrics. In: Sureda A, Corbacioglu S, Greco R, Kröger N, Carreras E, editors. The EBMT handbook: hematopoietic cell transplantation and cellular therapies. 8th ed. Cham: Springer; 2024, p. 111–123.
69. Williams MA, Mitchell JR, Pomerantz E. Interventions to increase organ donor registration: a systematic review and meta-analysis. Transplant Rev (Orlando). 2020;34(3):100547. DOI:10.1016/j.trre.2020.100547.
70. National Transplant Bureau of Lithuania. Organ donation and transplantation statistics [Internet]. Vilnius: National Transplant Bureau of Lithuania; 2025 Jun 30.
71. Karlan D, McConnell M, Mullainathan S, Zinman J. Getting people to sign up for organ donation: lessons from behavioral economics. J Econ Behav Organ. 2021;186:240–256. DOI:10.1016/j.jebo.2021.03.019.
72. Organización Nacional de Trasplantes. Balance de actividad de donación y trasplante 2023. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2024.
73. Monteiro TH, Gonçalves J, Silva PR. Motivations and barriers to blood donation: a systematic review. Transfus Med Rev. 2020;34(4):275–284. DOI:10.1016/j.tmrv.2020.07.002.
74. World Health Organization. World Blood Donor Day 2025: give blood, give hope: together we save lives. Geneva: World Health Organization; 2025.
75. Sümnig A, Greinacher A, Thiele T. Social media as a tool to motivate blood donors: results from a survey in Germany. Transfus Med. 2018;28(3):221–228. DOI:10.1111/tme.12473.
76. Harrel S, Kwon J. Social media engagement and its effect on blood donation behavior. J Health Commun. 2021;26(9):715–724. DOI:10.1080/10810730.2021.1970215.
77. Bart T, Volken T, Fischer Y, Taleghani BM. Giving blood and enrolling on the stem cell donor registry: ranking of obstacles and motives in Switzerland. J Educ Health Sport. 2021;11(6):528–541. DOI:10.12775/JEHS.2021.11.06.053.
78. Lee-Won RJ, Abo MM, Na K, White TN. More Than Numbers: Effects of Social Media Virality Metrics on Intention to Help Unknown Others in the Context of Bone Marrow Donation. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2016 Jun;19(6):404–411. DOI:10.1089/cyber.2016.0080.

PERSPECTIVES AND TRENDS IN ORGAN AND TISSUE DONATION

Kristupas Kurminas[1], Eva Kriaučiūnaitė[1], Laura Nedzinskienė[2]

[1]Faculty of Medicine, Vilnius University

[2]Faculty of Medicine, Vilnius University, Institute of Biomedical Sciences, Department of Anatomy,Histology and Anthropology

The aim. To comprehensively analyze the process of organ and tissue donation, the types of donations, psychological aspects, associated challenges, and to discuss contemporary strategies and trends in promoting donation. The study seeks to evaluate the donation process in Lithuania and internationally by examining medical, ethical, and societal factors influencing the development of donation systems and public trust in this field.

Materials and methods. A literature review methodology was employed. A total of 80 sources were analyzed, from which the most relevant theoretical and empirical studies published between 2000 and 2025 were selected. The databases used included PubMed, ScienceDirect, and Google Scholar. Sources were selected based on language (English, German, Spanish, and Lithuanian), scientific reliability, topic relevance, and objectivity. The collected information was systematically organized into major thematic areas and synthesized using a descriptive-analytical approach.

Results and conclusions. The analysis revealed that organ and tissue donation remain one of the most significant fields in modern medicine, directly contributing to improved patient survival and quality of life. Countries which apply a presumed consent ("opt-out") system, such as Spain and Belgium, achieve substantially higher donation rates than countries that implement an explicit consent ("opt-in") model. In Lithuania, the informed consent system has contributed to increased donation rates; however, several challenges persist, including limited public education, a shortage of transplant coordinators, and insufficient communication within healthcare institutions.

Keywords: organ donation, tissue donation, blood donation, stem cell transplantation, public health, transplant coordination.

Received 23 February 2026, accepted 10 April 2026

Correspondence to Laura Nedzinskienė
Vilnius University Faculty of Medicine
M. K. Čiurlionio str. 21/27, LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: laura.nedzinskiene@mf.vu.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-5

PACIENTŲ SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI SLAUGYTOJŲ KLINIKINĖJE PRAKTIKOJE

Ugnė Jakšytė, Almeda Kučinskienė, Indrė Čergelytė-Podgrušienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Akušerijos ir slaugos katedra

SANTRAUKA

Kiekvienais metais nuo lėtinių neinfekcinių ligų pasaulyje miršta apie 40 mln. žmonių. Šių ligų sergamumo ir mirtingumo rodiklius galima sumažinti laikantis sveikos gyvensenos principų. Slaugytojai turi reikiamų žinių ir įgūdžių ugdyti pacientų sveiką gyvenseną, tačiau mokslinėje literatūroje vis dar nepakankamai išanalizuoti veiksniai, lemiantys šios veiklos efektyvumą slaugytojų klinikinėje praktikoje.

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiais mokslinės literatūros duomenimis išanalizuoti veiksnius, kurie lemia pacientų sveikos gyvensenos ugdymą slaugytojų klinikinėje praktikoje.

Tyrimo metodas – tiriamoji mokslinės literatūros apžvalga. Mokslinių straipsnių paieška atlikta *Web of Science* duomenų bazėje.

Tyrimo rezultatai. Sveikos gyvensenos ugdymą slaugytojų klinikinėje praktikoje lemia trys pagrindinės veiksnių grupės: slaugytojų asmeniniai, organizaciniai ir su pacientais susiję veiksniai. Slaugytojų profesinė kompetencija ir asmeninis sveikos gyvensenos principų laikymasis skatina efektyvesnį sveikos gyvensenos ugdymą. Organizaciniai veiksniai, tokie kaip teigiamas įstaigų vadovų požiūris ir išvystytas tarpprofesinis bendradarbiavimas, sudaro palankias sąlygas pacientų sveikatos stiprinimo veikloms, o pacientų motyvacija, atsakomybės už savo sveikatą jausmas ir turimų žinių lygis lemia jų įsitraukimą į edukacines veiklas.

Išvados. Pacientų sveikos gyvensenos ugdymą lemia slaugytojų profesinės žinios, atsakomybės suvokimas bei asmeniniai gyvensenos įpročiai. Organizaciniai veiksniai, tokie kaip trumpa konsultacijų trukmė ir įstaigoje vyraujantis nepalankus požiūris į sveikatos ugdymą, gali turėti neigiamos įtakos šių veiklų įgyvendinimui. Edukacinių veiklų efektyvumą taip pat lemia pacientų įsitraukimas, jų žinių lygis bei fiziologiniai ir socialiniai veiksniai.

Reikšminiai žodžiai: klinikinė praktika, pacientai, slaugytojai, sveikos gyvensenos ugdymas.

ĮVADAS

Gerėjančios gyvenimo sąlygos ir medicinos pažanga pastaraisiais dešimtmečiais reikšmingai sumažino infekcinių ligų paplitimą. Tačiau šie pokyčiai lėmė kitą visuomenės problemą – lėtinių neinfekcinių ligų augimą [1]. Šios ligos kasmet nusineša 40 mln. gyvybių ir sudaro maždaug 70 proc. visų mirčių pasaulyje [2]. Be to, lėtinės neinfekcinės ligos daro reikšmingą poveikį ir ekonomikai. Prognozuojama, kad iki 2030 m. su šiomis ligomis susijusios išlaidos sveikatos sektoriui gali siekti net 47 trilijonus JAV dolerių [1]. Reaguodama į šias tendencijas, Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) pabrėžia, kad vienas pagrindinių šiuolaikinės sveikatos priežiūros prioritetų yra sveikos gyvensenos skatinimas, siekiant sumažinti sergamumą lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir pagerinti jų valdymą. PSO rekomenduoja valstybėms skirti ne mažiau kaip 3 proc. nacionalinio biudžeto sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos veikloms sveikatos sektoriuje įgyvendinti [3].

Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad gyvensenos pokyčiai, tokie kaip žalingų įpročių atsisakymas, subalansuota mityba ir pakankamas fizinis aktyvumas, gali reikšmingai sumažinti sergamumą lėtinėmis neinfekcinėmis

Adresas susirašinėti: Indrė Čergelytė-Podgrušienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Sveikatos mokslų instituto
Akušerijos ir slaugos katedra
M. K. Čiurlionio g. 21/27, 03101 Vilnius
El. p. indre.cergelyte-podgrusiene@mf.vu.lt

ligomis ir jų komplikacijų dažnį [1, 2]. Tačiau 2025 m. Higienos instituto atliktas tyrimas atskleidė, kad Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas yra nepakankamas: pusė respondentų nurodė didžiąją dienos dalį praleidžiantys sėdėdami, o laisvalaikiu tik 14 proc. gyventojų užsiima intensyvia fizine veikla. Mokslininkų teigimu, nepakankamas fizinis aktyvumas gali būti susijęs su žemu gyventojų žinių lygiu apie fizinio aktyvumo naudą ir jo taikymo galimybes [4].

Panašios tendencijos pastebimos Bulotaitės G. ir kt. atliktame tyrime, kuriame nustatyta, kad vyresnio amžiaus (65–75 m.) asmenys pasižymi netinkamais mitybos įpročiais: nepakankamai vartoja vaisių ir daržovių, dažniau renkasi mėsos produktus nei žuvį, taip pat suvartoja per mažą kiekį vandens. Mokslininkų teigimu, tokius mitybos pasirinkimus gali lemti žinių apie sveiką gyvenseną trūkumas [5].

Didėjant dėmesiui sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos praktikai, mokslinių tyrimų objektu tampa slaugytojų vaidmuo ugdant pacientų sveiką gyvenseną. Slaugytojai turi specifinių žinių ir įgūdžių, leidžiančių bendradarbiauti su pacientais, teikti sveikatos stiprinimo informaciją bei aktyviai įtraukti juos į ugdymo procesą [2]. Remiantis Lietuvos medicinos norma MN 28:2025, bendrosios praktikos slaugytojas privalo „propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones“; turi žinoti „sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką“, „mokyti pacientą ir jo šeimos narius ar artimuosius sveikos gyvensenos <…>“, „ugdyti paciento ir jo šeimos sveikos gyvensenos įgūdžius“ [6]. Ypatingas vaidmuo sveikos gyvensenos ugdymo procese tenka išplėstinės praktikos slaugytojams, kurie taiko į pacientą orientuotą priežiūrą ir įtraukia į gyvenimo būdo keitimo procesą ne tik pacientą, bet ir jo artimuosius. Šie specialistai sveikatos ugdymo veiklas vykdo tiek individualiu, tiek bendruomenės lygiu [7].

Nors mokslinėje literatūroje slaugytojo vaidmuo skatinant pacientų gyvensenos pokyčius yra nagrinėtas, vis dar trūksta tyrimų, analizuojančių veiksnius ir sunkumus, lemiančius sveikos gyvensenos ugdymo taikymą slaugytojų klinikinėje praktikoje. Todėl šioje literatūros apžvalgoje siekiama identifikuoti veiksnius, darančius įtaką sveikos gyvensenos ugdymo efektyvumui, sudarant prielaidas šios veiklos tobulinimui ir visuomenės sveikatos gerinimui. Apžvalgai atlikti suformuluotas tyrimo klausimas: *Kokie veiksniai slaugytojų klinikinėje praktikoje lemia pacientų sveikos gyvensenos ugdymą?*

Tyrimo tikslas – remiantis naujausiais mokslinės literatūros duomenimis išanalizuoti veiksnius, kurie lemia pacientų sveikos gyvensenos ugdymą slaugytojų klinikinėje praktikoje.

MEDŽIAGA IR METODAI


Tyrime taikytas metodas – tiriamoji literatūros apžvalga (angl. *scoping review*) leidžia sistemingai apžvelgti ir apibendrinti mokslinius tyrimus nagrinėjama tema. Mokslinės literatūros paieškai naudotos šios paieškos sąvokos ir jų kombinacijos: *lifestyle promotion* AR *lifestyle education* IR *patient* AR *patients* IR *nurse* IR *barriers* AR *challenges* AR *influencing factors*. Mokslo publikacijų paieška buvo vykdoma *Web of Science* duomenų bazėje.

Straipsnių įtraukimo kriterijai: publikacijos, paskelbtos 2020 m. sausio 1 d. – 2025 m. lapkričio 1 d. laikotarpiu; straipsniai, turintys atvirą prieigą prie viso teksto; straipsniai anglų kalba. Straipsnių atmetimo kriterijai: publikacijos, kurių prieiga prie viso teksto nėra atvira arba yra mokama; aukštųjų mokyklų baigiamieji darbai (bakalauro ir magistro darbai).

Duomenų bazėje *Web of Science* iš viso rasta 290 mokslinių straipsnių. Pritaikius publikacijos laikotarpio kriterijų, atrinkti 148 straipsniai, iš kurių 111 turėjo atvirą prieigą. Atliekant pirminę mokslo publikacijų atranką, pagal pavadinimą atmesti 72 straipsniai, kurių tematika nebuvo susijusi su pacientų sveikos gyvensenos ugdymu. Vertinant publikacijas pagal tyrimo santraukas, atmesta dar 18 straipsnių, kuriuose nebuvo analizuojami sveikos gyvensenos ugdymo iššūkiai arba tyrimo objektas buvo pacientų patirtys. Išnagrinėjus likusių straipsnių visus tekstus, galutinei literatūros analizei buvo atrinkti 8 straipsniai (1 pav.).

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

Sparčiai didėjantis sergamumas ir mirtingumas nuo lėtinių neinfekcinių ligų lemia augantį mokslininkų bendruomenės susidomėjimą šių ligų prevencijos ir kontrolės galimybėmis. Nacionalinių gairių atnaujinimas ir strateginių tikslų formulavimas skatina sveikatos stiprinimo veiklų efektyvinimą asmens sveikatos priežiūros sektoriuje. Atsižvelgiant į tai, moksliniuose tyrimuose vis daugiau dėmesio skiriama veiksnių, lemiančių slaugytojų vykdomą pacientų sveikos gyvensenos ugdymą,



1 pav. Mokslinių straipsnių paieškos strategija, remiantis PRISMA

analizei. 1 lentelėje pateikiama į analizę įtrauktų straipsnių apžvalga, kurioje nurodomi autoriai, publikavimo metai, tyrimo šalis, tiriamųjų imtis, duomenų rinkimo ir analizės metodai bei pagrindiniai tyrimų rezultatai.

Atlikus mokslo publikacijų analizę nustatyta, kad pacientų sveikos gyvensenos ugdymą slaugytojų klinikinėje praktikoje lemia trys pagrindinės veiksnių grupės: slaugytojų asmeniniai veiksniai, organizaciniai veiksniai ir veiksniai, susiję su pacientais.

Slaugytojų asmeniniai veiksniai, lemiantys pacientų sveikos gyvensenos ugdymą.

Slaugytojų asmeniniai bruožai, tokie kaip požiūris į profesinę atsakomybę, pasitikėjimas savo gebėjimais, motyvacija ir profesinė kompetencija, turi reikšmingą įtaką sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimui. Slaugytojų vaidmuo ypač svarbus pacientų sveikesnės gyvensenos kontrolės procese, kuris apima palaikymą, motyvavimą ir individualių tikslų išsikėlimą [11]. Be to, slaugytojai,

1 lentelė. Mokslinių tyrimų, analizuojančių pacientų sveikos gyvensenos ugdymą lemiančius veiksnius slaugytojų klinikinėje praktikoje, apžvalga

Autoriai, metai, šalis	Imties skaičius	Metodai ir analizės priemonės	Pagrindiniai radiniai
1. Chantal ir kt., 2025, Nyderlandai [8]	7 bendrosios praktikos slaugytojai ir 1 išplėstinės praktikos slaugytojas	Kokybinis tyrimas, taikyti pusiau struktūruoti interviu. Duomenys analizuoti taikant indukcinę teminę analizę.	Slaugytojai susiduria su žinių ir patikimų informacijos šaltinių stoka gyvensenos ugdymo klausimais. Dėl laiko trūkumo jie linkę trumpinti švietėjišką veiklą. Efektyviam bendradarbiavimui ir pacientų motyvavimui keisti gyvenseną trukdo pacientų asmeninės savybės – nenoras keistis ir nerūpestingas požiūris į sveikatą.
2. Znyk ir kt., 2024, Lenkija [9]	331 pirminės sveikatos priežiūros slaugytojas	Kiekybinis skerspjūvio tyrimas, taikyta specialistų sukurta anketa.	Sveikos gyvensenos ugdymo efektyvumą lemia ne tik išoriniai veiksniai, bet ir su pačiais slaugytojais susiję motyvaciniai veiksniai. Sveikatos stiprinimo konsultacijų taikymas priklauso nuo slaugytojų profesinių kompetencijų, gebėjimo įvertinti paciento individualius poreikius, remiantis fiziniais rodikliais, mažesnio darbo krūvio, taip pat asmeninės ir šeiminės patirties.
3. Den Hamer-Jordaan ir kt., 2024, Nyderlandai [10]	18 bendruomenės slaugytojų	Kokybinis tyrimas, taikyti pusiau struktūruoti interviu. Duomenys analizuoti taikant indukcinę teminę analizę.	Slaugytojų vykdomą konsultavimą sveikos gyvensenos klausimais lemia asmeniniai, organizaciniai ir politiniai veiksniai. Ypatingą reikšmę turi paciento įtraukimas į ugdymo procesą, bendradarbiavimu grįstų santykių kūrimas, holistinis požiūris ir motyvavimas keisti elgseną.
4. Den Hamer-Jordaan ir kt., 2024, Nyderlandai [11]	244 bendruomenės slaugytojai	Kiekybinis skerspjūvio tipo tyrimas. Duomenys surinkti naudojant Įgyvendinimo elgesio veiksnių klausimyną (DIBQ).	Slaugytojų motyvacija, teigiamas požiūris į sveikatos stiprinimo veiklas ir pasitikėjimas savo gebėjimais statistiškai reikšmingai koreliuoja su dažnesniu pacientų konsultavimu sveikos mitybos klausimais.
5. Behm ir kt., 2024, Švedija [12]	11 slaugytojų	Kokybinis tyrimas, pusiau struktūruoti interviu, atlikti pagal COREQ gaires. Duomenys analizuoti taikant kokybinio turinio analizę.	Sveikos gyvensenos ugdymas efektyviau vykdomas sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose aiškiai apibrėžtas šios veiklos įgyvendinimas. Edukacinių veiklų taikymą klinikinėje praktikoje lemia pacientų žinių lygis, motyvacija keisti įpročius bei slaugytojų asmeninis susidomėjimas sveikatos stiprinimo veiklomis.
6. Heidke ir kt., 2020, Australija [13]	123 slaugytojai	Kiekybinis skerspjūvio tyrimas, naudota anoniminė internetinė anketa, parengta remiantis nacionalinės sveikatos apklausos bei nacionalinės mitybos ir fizinio aktyvumo apklausos elementais.	Respondentų nuomonės išsiskyrė: dalis jų teigė, kad slaugytojų asmeninių sveikų įpročių nesilaikymas mažina gyvensenos konsultacijų efektyvumą, o kita dalis pabrėžė, kad sveikos gyvensenos ugdymas yra profesinė pareiga, nepriklausoma nuo asmeninių pasirinkimų.
7. Møller ir kt., 2020, Danija [14]	12 psichikos sveikatos slaugytojų	Fokusinės grupės metodas, duomenys analizuoti taikant indukcinę kokybinę turinio analizę.	Psichikos sveikatos slaugytojos nurodė, kad sveikos gyvensenos ugdymas yra sudėtingas, nes gali sukelti neigiamas pacientų emocines reakcijas ir apsunkinti bendradarbiavimą. Šioms temoms skiriama mažiau dėmesio dėl organizacinių kliūčių, tokių kaip laiko stoka, nutrūkstanti paciento priežiūra bei nepakankamas slaugytojų darbo įvertinimas.
8. Gurné ir kt., 2023, Švedija [15]	16 pirminės sveikatos priežiūros slaugytojų	Kokybinis tyrimas, pusiau struktūruoti interviu. Duomenys analizuoti taikant interpretacinį ir aprašomąjį metodą.	Respondentai pabrėžė slaugytojo vaidmens svarbą bendruomenių sveikatos stiprinimo veiklose. Gyvensenos ugdymo taikymą apsunkina sunkumai formuojant santykius su pacientais, neaiškus atsakomybės pasiskirstymas bei organizaciniai veiksniai.

gebantys bendradarbiauti su pacientais ir įvertinti jų poreikį keisti gyvenseną, yra linkę aktyviau skatinti sveikos gyvensenos principų taikymą [10]. Mokslinėje literatūroje taip pat pabrėžiama, kad slaugytojai turėtų gebėti įvertinti, ar pacientas suprato pateiktą informaciją, atkreipdami dėmesį tiek į žodinę kalbą, tiek į neverbalinius kūno signalus [15].

Vienas reikšmingiausių ribojančių veiksnių yra slaugytojų žinių trūkumas [8–10, 12]. Tyrimai rodo, kad slaugytojams dažnai trūksta gebėjimų individualizuoti sveikos gyvensenos temas pagal paciento poreikius ir aktyviai įtraukti jį į sprendimų priėmimą [8]. Žinių stoka taip pat siejama su nepasitikėjimu savo kompetencija bei baime suteikti pacientams netikslią ar klaidingą informaciją [12]. Dėl šių priežasčių literatūroje akcentuojamas papildomų mokymų poreikis, kuriuose būtų aptariamos ne tik bendros sveikatos stiprinimo temos, bet ir suteikiama specifinių žinių apie mitybos ypatumus pacientams, sergantiems įvairiomis ligomis [10, 11], atsižvelgiant į jų amžių ir vartojamus medikamentus [10]. Analizuodami šį aspektą mokslininkai nustatė, kad slaugytojai, turintys pakankamai žinių ir gebėjimų mokyti sveikos gyvensenos bei vertinti jos poreikį pagal paciento fiziologinius rodiklius (kūno svorį, ūgį ir kūno masės indeksą), statistiškai reikšmingai dažniau pacientus informuoja apie sveikatingumo veiklas [9]. Panašius rezultatus pateikė Melariri ir kt. (2022), kurie nustatė, kad didesnis slaugytojų žinių apie pacientų sveikatos būklę lygis siejamas su aktyvesnėmis sveikos gyvensenos konsultacijomis. Be to, tyrimo rezultatai rodo, kad žinių lygis tiesiogiai veikia slaugytojų požiūrį į edukacines veiklas [16].

Mokslinės literatūros analizė taip pat atskleidė, kad pacientų sveikos gyvensenos ugdymas gali būti susijęs su pačių slaugytojų gyvensenos pasirinkimais. Lenkijoje atliktu tyrimu nustatyta, kad sveikos gyvensenos ugdymo taikymas nepriklauso nuo slaugytojų kasdienių įpročių, o edukacinių veiklų įgyvendinimui didesnę įtaką turi profesinės kompetencijos, sveikatos priežiūros sistemoje kylantys sunkumai ir asmeninė patirtis [9]. Vis dėlto kituose tyrimuose pateikiamos skirtingos nuomonės. Dalis respondentų teigia, kad sveikos gyvensenos ugdymas yra profesinė pareiga, todėl asmeniniai gyvensenos pasirinkimai neturi tiesioginės įtakos pacientams. Be to, pažymima, kad panašios slaugytojo ir paciento gyvensenos problemos gali sustiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą. Priešingai, kiti tyrimo dalyviai nurodo, kad slaugytojai, besilaikantys sveikos gyvensenos principų, yra linkę aktyviau inicijuoti diskusijas sveikatos stiprinimo temomis, o pacientai juos dažniau vertina kaip teigiamą pavyzdį. Specialistai, nesilaikantys sveikos gyvensenos principų, konsultuodami pacientus dėl sveikos gyvensenos įpročių patiria gėdos jausmą ar kitas neigiamas emocijas [13]. Šis aspektas aptariamas ir McCormick ir kt. (2023) atliktame tyrime, kuriame nustatyta, kad pacientų konsultavimas sveikatos stiprinimo temomis statistiškai reikšmingai siejasi su išplėstinės praktikos slaugytojų gyvensenos pasirinkimais. Tyrimo duomenimis, specialistai, neužsiimantys fizine veikla, 21 proc. rečiau konsultavo pacientus dėl fizinio aktyvumo, o raumenis stiprinančių pratimų neatliekantys specialistai juos 27 proc. rečiau rekomendavo pacientams. Dar ryškesni skirtumai nustatyti mitybos srityje – slaugytojai, vartojantys nepakankamą kiekį vaisių, daržovių ar baltymų, statistiškai reikšmingai rečiau – atitinkamai 57 proc. ir 72 proc. – aptarė šias temas su pacientais [17].

Organizaciniai veiksniai, lemiantys pacientų sveikos gyvensenos ugdymą.

Laiko trūkumas mokslinėje literatūroje įvardijamas kaip viena dažniausių kliūčių, trukdančių efektyviai įgyvendinti pacientų sveikos gyvensenos ugdymą [9, 10, 12, 14, 15]. Dėl ribotos konsultacijų trukmės slaugytojams dažnai sudėtinga užmegzti konstruktyvų ryšį su pacientu [10]. Tyrimuose pabrėžiama, kad sveikos gyvensenos ugdymas yra kompleksinis procesas, grindžiamas slaugytojo ir paciento bendradarbiavimu [8, 10, 15]. Toks bendradarbiavimas sudaro prielaidas aktyviau įtraukti pacientą į sprendimų priėmimą, stiprinti jo savarankiškumą ir individualizuoti sveikatos priežiūrą [8]. Panašias išvadas pateikė DeCelie ir kt. (2025), kurie nustatė, kad susiformavęs tarpusavio ryšys skatina didesnį pacientų įsitraukimą į priežiūros procesą bei ilgalaikį sveikų gyvensenos įpročių laikymąsi. Nuoširdus bendradarbiavimas didina paciento dalyvavimą sveikatos stiprinimo veiklose ir motyvuoja keisti gyvenimo būdą [18]. Tačiau dėl laiko stokos konsultacijų metu slaugytojai dažniausiai prioritetą teikia klinikinėms problemoms, dėl kurių pacientai kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą, o sveikos gyvensenos principų aptarimas neretai laikomas ne tokiu reikšmingu. Tokiose situacijose slaugytojai pabrėžia konsultacijų planavimo svarbą ir nurodo, kad sveikos gyvensenos ugdymas gali būti integruojamas į kitas

slaugos procedūras, pavyzdžiui, žaizdų perrišimą [12]. Ši strategija aptariama ir kituose tyrimuose, kuriuose nurodoma, kad slaugytojai papildomai konsultavo nuotoliniu būdu arba planavo ilgesnės trukmės kontaktinius susitikimus [15]. Mayr ir kt. (2021) siūlo laiko stokos problemą spręsti pasitelkiant pagalbines priemones. Konsultacijų metu, nespėjus aptarti sveikos gyvensenos principų, pacientams buvo pateikiama rašytinė informacija lankstinukuose, skirta savarankiškai susipažinti namie [19].

Analizuojant organizacinius veiksnius, mokslinėje literatūroje taip pat pabrėžiama sveikatos priežiūros įstaigose vyraujančio požiūrio į sveikos gyvensenos ugdymą svarba. Tyrimų duomenimis, dažnai trūksta aiškios informacijos, patvirtintų rekomendacijų ir struktūruotų gairių, reglamentuojančių ugdomosios veiklos vykdymą [9, 10]. Be to, slaugytojai susiduria su nepakankamu tarpprofesiniu bendradarbiavimu, kuris yra itin svarbus keičiantis su pacientu susijusia informacija ir užtikrinant tęstinę priežiūrą [8, 10, 12, 14]. Literatūroje akcentuojama, kad organizacijos turėtų skirti didesnį dėmesį specialistų mokymams pacientų sveikos gyvensenos ugdymo srityje [10]. Šią nuostatą patvirtina ir kiti tyrimai, atskleidžiantys, kad sveikatos priežiūros įstaigų administracijos požiūris bei priimami sprendimai tiesiogiai veikia edukacinės veiklos efektyvumą [10, 12, 15]. Įstaigose, kuriose sveikos gyvensenos ugdymas traktuojamas kaip svarbi klinikinės priežiūros dalis, personalas yra aprūpinamas ugdymo metodinėmis priemonėmis, o pacientai nukreipiami pas kitus specialistus pagal aiškiai apibrėžtą ir struktūruotą sistemą [12].

Su pacientu susiję veiksniai, lemiantys sveikos gyvensenos ugdymą.

Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad pacientų sveikos gyvensenos ugdymo procese reikšmingą vaidmenį atlieka su pačiu pacientu susiję veiksniai. Slaugytojams konsultuojant sveikos gyvensenos įpročių klausimais, itin svarbu informaciją pritaikyti pagal individualius paciento poreikius. Elgesio keitimo rekomendacijos turėtų būti grindžiamos holistiniu požiūriu, atsižvelgiant ne tik į paciento sveikatos būklę ar finansines galimybes, bet ir į jo asmenybės bruožus bei gyvenimo būdo ypatumus [8]. Vis dėlto šiame procese slaugytojai susiduria su iššūkiais – iš pacientų pasakojimų išskirti svarbiausius aspektus, reikalingus bendriems tikslams formuluoti ir edukacinei veiklai įgyvendinti [12].

Vienas pagrindinių sunkumų siejamas su nepakankama pacientų motyvacija keisti gyvenseną [8, 9, 12]. Daugeliui pacientų gyvensenos pokyčiai atrodo sudėtingi ir reikalaujantys didelių pastangų [9]. Miller ir kt. (2022) nurodo, kad tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai, tokie kaip laiko ir finansinių išteklių trūkumas, darbo grafikas ar ribotos žinios, turi įtaką pacientų gebėjimui įgyvendinti pokyčius. Dėl šių priežasčių pacientai neretai renkasi ligos kontrolę medikamentiniu būdu, siekdami greitesnio ir mažiau pastangų reikalaujančio rezultato [20]. Šiai koncepcijai pritaria ir Bouma ir kt. (2022), pabrėždami, kad pacientai linkę pasirinkti tuos metodus, kurie leidžia greičiau pasiekti norimą rezultatą, o jų sprendimams didelę įtaką daro kitų asmenų teigiamos patirtys taikant panašius būdus [21].

Literatūroje taip pat akcentuojama pacientų atsakomybės už savo sveikatą stoka. Slaugytojai teigia, kad dalis pacientų vengia prisiimti atsakomybę už gyvensenos pokyčius ir ją perkelia sveikatos priežiūros specialistams [8, 10, 12, 15]. Kiti autoriai pažymi, kad pacientai dažnai laukia konkrečių nurodymų ar sprendimų iš slaugytojų ir kitų specialistų, tikėdamiesi, jog šie veiksmai nulems jų gyvenimo būdo pokyčius [21]. Tokia nuostata gali apsunkinti edukacinės veiklos eigą, nes pacientų motyvacijos stoka ir pasyvus dalyvavimas lemia menkesnį įsitraukimą bei silpnesnį tarpusavio ryšį [10, 14].

Kitas reikšmingas veiksnys – pacientų žinių apie sveiką gyvenseną lygis. Tyrimuose nurodoma, kad pacientų žinios šioje srityje yra nevienodos ir gali skirtingai paveikti ugdymo procesą. Pacientai, turintys pakankamai žinių apie sveikos gyvensenos principus, rečiau įsitraukia į diskusijas su slaugos personalu, manydami, kad papildomos informacijos jiems nereikia arba šias temas laiko mažiau reikšmingomis, o pacientai, kuriems trūksta žinių apie sveikatos stiprinimą, sunkiau supranta ir įsisavina pateiktą informaciją [12]. Saboktakint ir kt. (2021) pabrėžia, kad pacientų asmeninės nuostatos ir informacijos stoka apie gyvensenos naudą gali neigiamai paveikti jų įsitraukimą į ugdymo procesą. Be to, autoriai atkreipia dėmesį, kad pacientų fiziologiniai ypatumai, ypač amžius, turi įtakos informacijos suvokimui ir pritaikymui kasdienėje veikloje [22]. Kitose mokslo publikacijose taip pat pažymima, kad paciento fizinė būklė ir ligos simptomai gali riboti gebėjimą suvokti ir įsisavinti pateikiamą informaciją [21, 23].

Analizuodami su pacientu susijusius veiksnius, moksli-

ninkai išskiria ir socialinį kontekstą. Slaugytojai susiduria su sunkumais pritaikyti informaciją pagal paciento socialinę, ekonominę ir kultūrinę padėtį. Papildomų iššūkių kyla dėl kalbos barjero tarp paciento ir slaugytojo, nes jis apsunkina efektyvų bendravimą ir sveikos gyvensenos ugdymo procesą [15].

APIBENDRINIMAS

Pacientų sveikos gyvensenos ugdymo efektyvumą lemia keli tarpusavyje susiję veiksniai. Pirmiausia, svarbią reikšmę turi slaugytojų profesinės žinios ir kompetencijos, profesinės atsakomybės suvokimas bei pasitikėjimas savo gebėjimais. Tyrimai rodo, kad slaugytojai, kurie patys laikosi sveikos gyvensenos įpročių, dažniau ir efektyviau inicijuoja pacientų ugdymą šiomis temomis. Antra, organizaciniai veiksniai taip pat turi didelę įtaką. Tokie sunkumai kaip ribota konsultacijų trukmė, neigiamas vadovų požiūris, klinikinių gairių trūkumas ir nepakankamas tarpprofesinis bendradarbiavimas gali apsunkinti sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimą klinikinėje praktikoje. Galiausiai, edukacinės veiklos sėkmę lemia ir paties paciento motyvacija bei žinių lygis. Paciento amžius, sveikatos būklė ir socialiniai veiksniai daro įtaką informacijos supratimui, gebėjimui ją įsisavinti bei aktyviam dalyvavimui ugdymo procese. Šių veiksnių tarpusavio sąveika lemia, kaip efektyviai slaugytojai gali skatinti pacientų sveikos gyvensenos pokyčius.

Straipsnis gautas 2026-01-14, priimtas 2026-03-31

Literatūra

1. Hacker K. The burden of chronic disease. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes. 2024;8(1):112–119. DOI:10.1016/j.mayocpiqo.2023.08.005.
2. Oikarinen AK, Kähkönen O, Kaakinen P, Kääriäinen M, Virtanen M, Paalimäki-Paakki K, Hylkilä K, Männikkö N, Kerimaa H, Kivelä K, Jansson M, Kajula O, Männistö M, Lahtinen M, Vanhanen M, Rajala M. Nurses' experiences of competence in lifestyle counselling with adult patients in healthcare settings: A qualitative systematic literature review. Journal of Clinical Nursing. 2024;33(5):1684–1708. DOI:10.1111/jocn.17050.
3. Rogers HL, Pablo Hernando S, Núñez – Fernández S, Sanchez A, Martos C, Moreno M, Grandes G. Barriers and facilitators in the implementation of an evidence-based health promotion intervention in a primary care setting: a qualitative study. J Health Organ Manag. 2021;35(9):349–367. DOI:10.1108/JHOM-12-2020-0512.
4. Bartkevičiūtė R, Barzda A, Bulotaitė G, Kalpokaitė G. Suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių bei žinių apie mitybą ir fizinį aktyvumą tyrimo (2024 m.) ataskaita. Higienos institutas. Visuomenės sveikatos inovacijų centro Sveikatos stiprinimo skyrius. Vilnius, 2025.
5. Bulotaitė G, Bartkevičiūtė R, Drungilas V, Miliauskė R, Stukas R, Barzda A. Pagyvenusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai. Sveikatos mokslai. 2022;32(2):57–63. DOI:10.35988/sm-hs.2022.052.
6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas" patvirtinimo". Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2025-05-17. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7DB50471C9A5
7. Mackavey C, Henderson C, Morris G. Empowering advanced practice nurses: a review of addressing global health needs. Annals of Global Health. 2025;91(1):1–9. DOI:10.5334/aogh.4723.
8. Pot CHM, Hietbrink EAG, Laverman GD. Implementing lifestyle counselling into secondary type 2 diabetes care: perspectives from diabetes nurses. Nurs Open. 2025;12(4):e70183. DOI:10.1002/nop2.70183.
9. Znyk M, Kostrzewski S, Kaleta D. Nurse-led lifestyle counseling in Polish primary care: the effect of current health status and perceived barriers. Front Public Health. 2024;19;12:1301982. DOI:10.3389/fpubh.2024.1301982.
10. Den Hamer-Jordaan G, Groenendijk-Van Woudenbergh GJ, Haveman-Nies A, Van Hell-Cromwijk MC, Van Der Veen YJJ, Algra HF, Kroeze W. Factors associated with dietary behaviour change support in patients: A qualitative study among community nurses. J Adv Nurs. 2024;80(2):500–509. DOI:10.1111/jan.15808.
11. Den Hamer-Jordaan G, Groenendijk-van Woudenbergh GJ, Kroeze W, Troost E, Haveman-Nies A. Nurse-related behavioural determinants associated with healthy eating support provided by Dutch community nurses: a cross-sectional study. BMC Nurs. 2024;23(1):774. DOI:10.1186/s12912-024-02403-z.
12. Behm L, Brånhage M, Jönsson S, Rask M. Balancing barriers and strategies - Nurses' experiences of conducting lifestyle counseling. Public Health Nurs. 2024;41(6):1526–1534. DOI:10.1111/phn.13417.
13. Heidke P, Madsen WL, Langham EM. Registered nurses as role models for healthy lifestyles. Aust J Adv Nurs. 2020;37(2):11–18. DOI:https://DOI.org/10.37464/2020.372.65.
14. Møller JE, Møller A, Ledderer L. Dilemmas in delivering health promotion activities: findings from a qualitative study of mental health nurses in Denmark. BMJ Open. 2020;10(12). DOI:10.1136/bmjopen-2019-036403.
15. Lundin Gurné F, Jakobsson S, Lidén E, Björkman I. District nurses' perspectives on health-promotive and disease-preventive work at primary health care centres: A qualitative study. Scand J Caring Sci. 2023;37(1):153–162. DOI:10.1111/scs.13100.
16. Melariri H, Osoba TA, Williams MM, Melariri P. An assessment of nurses' participation in Health Promotion: a knowledge, perception, and practice perspective. J Prev Med Hyg. 2022;63(1):E27–E34.

DOI:10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.1.2209.
17. McCormick SJ, Smith-Holmquist N, Benton MJ. Personal health behaviors and physical activity and nutrition counseling by nurse practitioners: An online survey. J Am Assoc Nurse Pract. 2023;35(12):794–801. DOI:10.1097/JXX.0000000000000925.
18. DeCelie I, Sturm B. Relationships among health promotion behaviors, patient engagement, and the nurse practitioner-patient partnership. J Am Assoc Nurse Pract. 2025;37(1):80–18. DOI:10.1097/JXX.0000000000001039.
19. Mayr HL, Kelly JT, Macdonald GA, Hickman IJ. „Focus on diet quality": a qualitative study of clinicians' perspectives of use of the Mediterranean dietary pattern for non-alcoholic fatty liver disease. Br J Nutr. 2022;128(7):1220–1230. DOI:10.1017/S0007114521001100.
20. Miller M, Locke A, Fuller A, King Jensen J. Understanding primary care providers' experience with lifestyle behavior change recommendations and programs to prevent chronic disease. American Journal of Lifestyle Medicine. 2022;18(6):779–784. DOI:10.1177/15598276221120640.
21. Bouma SE, van Beek JFE, Alma MA, Diercks RL, van der Woude LHV, van den Akker-Scheek I, Stevens M. What affects the implementation of lifestyle interventions in patients with osteoarthritis? A multidisciplinary focus group study among healthcare professionals. Disabil Rehabil. 2022;44(26):8283–8293. DOI:10.1080/09638288.2021.2011438.
22. Saboktakin A, Sepehri MM, Khasha R. A novel approach to educate hospitalized cardiovascular disease patients about lifestyle and behavior modifications. BMC Med Inform Decis Mak. 2021;21(1):321. DOI:10.1186/s12911-021-01680-x.
23. Avsar P, Moore Z, Nasaif H, Moore B, Patton D, O'Connor T, Renjith V. Health care professionals' attitudes, behaviours and barriers toward exercise promotion among patients: A systematic review. PLoS One. 2025;20(8):e0330861. DOI:10.1371/journal.pone.0330861.

FACTORS DETERMINING THE PROMOTION OF HEALTHY LIFESTYLE FOR PATIENTS IN THE CLINICAL PRACTICE OF NURSES

Ugnė Jakšytė, Almeda Kučinskienė, Indrė Čergelytė-Podgrušienė
Vilnius University, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Department of Midwifery and Nursing

SUMMARY

Every year, approximately 40 million people worldwide die from chronic noncommunicable diseases. The morbidity and mortality rates of these diseases can be reduced by following the principles of a healthy lifestyle. Nurses have the necessary knowledge and skills to promote a healthy lifestyle among patients, but the factors determining the effectiveness of this activity in nurses' clinical practice have not yet been sufficiently analyzed in the scientific literature.

The aim of the study is to analyze the factors that determine the promotion of healthy lifestyles among patients in nurses' clinical practice based on the latest scientific literature.

The research method was a scoping review of the scientific literature. Scientific articles were searched for in the Web of Science database.

Results. Three main groups of factors determine the promotion of healthy lifestyles in nurses' clinical practice: personal, organizational and patient-related factors. Nurses' professional competence and personal adherence to healthy lifestyle principles promote more effective healthy lifestyle education. Organizational factors, such as a positive attitude on the part of institutional leaders and well-developed interprofessional collaboration, create favorable conditions for patient health promotion activities. Meanwhile, patients' motivation, sense of responsibility for their own health, and level of knowledge determine their engagement in educational activities.

Conclusions. The promotion of healthy lifestyles among patients is influenced by nurses' professional knowledge, sense of responsibility, and personal lifestyle habits. Organizational factors, such as short consultation times and a prevailing negative attitude toward health education within the institution, can have a negative impact on the implementation of these activities. The effectiveness of educational activities is also determined by patient engagement, their level of knowledge, and physiological and social factors.

Keywords: clinical practice, healthy lifestyle promotion, nurses, patients.

Received 14 January 2026, accepted 31 March 2026

Correspondence to Indrė Čergelytė-Podgrušienė
Department of Midwifery and Nursing, Institute of Health Sciences
Faculty of Medicine Vilnius University
M. K. Čiurlionio str. 21/27, LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: indre.cergelyte-podgrusiene@mf.vu.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-2

SLAUGYTOJŲ PROFESINIS PERDEGIMAS IR JO PREVENCIJOS PRIEMONĖS

Evelina Grinevič, Aldona Mikaliūkštienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Akušerijos ir slaugos katedra

SANTRAUKA

Profesinis perdegimas yra viena dažniausių ir reikšmingiausių psichosocialinių problemų slaugytojų profesinėje veikloje, turinti neigiamų pasekmių tiek darbuotojų sveikatai, tiek pacientų saugai ir sveikatos priežiūros sistemos funkcionavimui. Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad slaugytojų perdegimas vis dažniau suvokiamas kaip sisteminė bei kompleksinė problema, glaudžiai susijusi su darbo organizavimu, emociniais darbo reikalavimais bei organizacine aplinka, todėl akcentuojama prevencinių priemonių taikymo svarba, siekiant užkirsti kelią perdegimo plitimui ir sumažinti jo sukeliamas neigiamas pasekmes.

Straipsnio tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą apie slaugytojų profesinį perdegimą, jo paplitimą, priežastis ir prevencijos būdus.

Medžiaga ir metodai. Atlikta tiriamoji mokslinės literatūros apžvalga, nagrinėjanti slaugytojų profesinį perdegimą, jo paplitimą, priežastis bei prevencijos būdus. Duomenys rinkti iš 2021–2025 m. mokslinių šaltinių, prieinamų duomenų bazėse *National Library of Medicine* (*Pubmed*), *Web of Science platform (Clarivate)* bei paieškos sistemoje *Google Scholar.* Iš viso peržiūrėta 120 šaltinių, iš kurių 39, atitikę atrankos kriterijus, buvo įtraukti į analizę.

Rezultatai. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad slaugytojai pasižymi aukštais perdegimo, emocinio išsekimo ir depersonalizacijos rodikliais. Perdegimo vystymuisi reikšmingą įtaką daro didelis darbo krūvis, nepalankios darbo sąlygos, psichologinis stresas, darbo ir asmeninio gyvenimo disbalansas bei išoriniai stresoriai, tokie kaip COVID-19 pandemija. Literatūros analizė rodo, kad efektyviausia perdegimo prevencija turėtų būti grindžiama integruotu požiūriu, apimančiu individualių psichologinių išteklių stiprinimą ir organizacinių darbo aplinkos veiksnių gerinimą.

Išvados. Didžioji dalis slaugytojų patiria profesinį perdegimą, emocinį išsekimą ir depersonalizaciją. Slaugytojams profesinis perdegimas pasireiškia dažniau, lyginant su kitais sveikatos priežiūros specialistais. Slaugytojų profesinį perdegimą labiausiai lemia sisteminiai ir darbo aplinkos veiksniai, ypač didelis darbo krūvis, ilgos pamainos, personalo trūkumas, nepalankus psichosocialinis klimatas ir nepakankamas vadovų bei kolegų palaikymas. Perdegimas taip pat yra reikšmingai susijęs su patiriamu stresu, nerimu ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyros stoka. Efektyvi perdegimo prevencija turi būti kompleksinė, apimanti individualias intervencijas – streso valdymą, sąmoningumo, atsparumo ir emocinio intelekto lavinimą bei organizacinius sprendimus – darbo krūvio reguliavimą, palaikomąjį vadovavimą ir komandinę paramą.

Reikšminiai žodžiai: intervencijos, prevencija, profesinis perdegimas, profesinio perdegimo priežastys, slauga.

ĮVADAS

Profesinis perdegimas yra plačiai paplitusi problema sveikatos priežiūros sektoriuje ir laikomas vienu svarbiausių psichosocialinių iššūkių slaugytojų profesinėje veikloje [1, 2]. Perdegimas apibrėžiamas kaip asmens reakcija į ilgalaikį stresą, patiriamą darbo aplinkoje, kuri formuojasi palaipsniui ir ilgainiui gali tapti lėtine, su-

Adresas susirašinėti: Aldona Mikaliūkštienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Sveikatos mokslų instituto
Akušerijos ir slaugos katedra
M. K. Čiurlionio g. 21/27, 03101Vilnius
El. p. aldona.mikaliukstiene@mf.vu.lt

keldama įvairių sveikatos sutrikimų [3]. Psichologiniu aspektu perdegimas veikia kognityvinę, emocinę ir vertybinę asmens sritis, pasireikšdamas neigiamu požiūriu į darbą, aplinkinius bei savo profesinį vaidmenį [4]. Vis dėlto šis reiškinys negali būti vertinamas vien kaip individuali problema, nes jis dažnai siejamas su nepalankiomis darbo sąlygomis ir organizaciniais veiksniais [5]. Remdamiesi ilgalaikių empirinių tyrimų rezultatais, Maslach ir bendraautoriai patikslino perdegimo sampratą ir pateikė tikslesnį bei labiau struktūruotą šio reiškinio apibrėžimą. Autoriai perdegimą apibrėžė kaip psichologinį sindromą, kuriam būdingas emocinis išsekimas, depersonalizacija ir sumažėjęs profesinio efektyvumo jausmas, dažniausiai pasireiškiantis asmenims, teikiantiems priežiūrą kitiems [6, 7].

Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktas tyrimas parodė, kad 2022 metais sveikatos priežiūros darbuotojų grupėje 39,8 proc. respondentų patyrė perdegimo simptomus, o jų paplitimas nuo 2018 iki 2022 m. stipriai augo [8]. Kitame tyrime, atliktame Etiopijos universitetinėse ligoninėse, nustatyta, kad perdegimo paplitimas tarp įvairių sveikatos specialistų siekė 54,7 proc., o aukšti depersonalizacijos ir emocinio išsekimo rodikliai buvo dar dažniau fiksuoti tarp sveikatos priežiūros specialistų [9]. Taivano ligoninėse atlikto tyrimo duomenimis, perdegimo lygis po pandemijos išliko aukštas – apie 35,4 proc. darbuotojų patyrė perdegimą, tačiau emocinio išsekimo paplitimas buvo dar didesnis – 70,9 proc. sveikatos priežiūros specialistų jautėsi emociškai išsekę, depersonalizaciją jautė 56,3 proc. respondentų, o žemą asmeninį pasiekimą – 60,6 proc. Šie duomenys svyravo, priklausomai nuo demografinių veiksnių ir darbo sąlygų – jauni, nesusituokę asmenys, turintys mažą darbo patirtį, dirbantys ilgas darbo valandas, dirbantys naktinėse pamainose turėjo didesnį polinkį patirti perdegimo sindromą [10]. Tanzanijoje atliktu tyrimu nustatyta, kad perdegimą patiria 54,5 proc. pirminės sveikatos priežiūros darbuotojų, o slaugytojų grupėje paplitimas buvo didesnis – siekė 61,3 proc. Šie duomenys rodo, kad perdegimas yra plačiai paplitusi sveikatos sektoriaus problema, reikalaujanti nuoseklių prevencinių strategijų ir sisteminių priemonių gerovei stiprinti [11].

Profesinio perdegimo priežastys pasauliniu mastu susideda tiek iš organizacinių, tiek iš individualių veiksnių. Didelis darbo krūvis, kintantis darbo grafikas, intensyvus emocinis darbas bei nepakankama darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra lemia ilgalaikį stresą, kuris prisideda prie perdegimo sindromo vystymosi [12]. Remiantis darbo reikalavimų ir išteklių (angl. *job demands-resources)* modeliu, perdegimas atsiranda tuomet, kai darbuotojui keliami reikalavimai viršija jo turimus psichologinius, fizinius ar socialinius išteklius [13]. Taip pat reikšmingą įtaką daro vadovavimo pobūdis ir organizacinė kultūra: aplinka, kurioje stokojama palaikymo arba vyrauja per didelė kontrolė, didina perdegimo tikimybę. Darbuotojai, patiriantys vadovų paramos trūkumą, dažniau jaučia bejėgiškumą ir nepasitenkinimą savo darbu. Šią situaciją dar labiau apsunkina nepakankama socialinė parama iš vadovų ir kolegų pusės [14]. Be organizacinių aspektų, svarbios ir asmeninės savybės, tokios kaip perfekcionizmas, mažas atsparumas stresui ar nepakankami emocijų valdymo gebėjimai, kurie dar labiau didina profesinio perdegimo riziką [15].

Profesinis perdegimas pasireiškia įvairiomis psichologinėmis, fizinėmis ir socialinėmis pasekmėmis. Tokie simptomai kaip emocinis išsekimas ir depersonalizacija neigiamai veikia darbuotojų empatiją, motyvaciją bei pasitenkinimą profesine veikla [16]. Ilgainiui šie procesai gali lemti nerimo ir depresijos išsivystymą, taip pat nuolatinį nepasitikėjimą savo profesinėmis kompetencijomis [12]. Fiziologiniu požiūriu perdegimas siejamas su miego kokybės sutrikimais, padidėjusia širdies ir kraujagyslių ligų rizika bei susilpnėjusia imunine sistema [15]. Organizaciniu lygmeniu profesinis perdegimas prisideda prie darbuotojų kaitos didėjimo, darbo našumo mažėjimo ir klaidų dažnėjimo [17]. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėse organizacijose vis dažniau akcentuojama, kad perdegimo kilmė ir padariniai yra susiję ne vien su individualiais veiksniais, bet ir su darbo aplinka bei organizacine sistema, todėl veiksmingiausios prevencinės strategijos turėtų būti kompleksinės, apimančios tiek individualius, tiek organizacinio lygmens sprendimus [12, 18].

Slaugytojų profesinio perdegimo problema išlieka aktuali ir Lietuvoje. Atlikti tyrimai nustatė, kad profesinio perdegimo požymių tarp slaugytojų nustatoma vis dažniau. Senstant visuomenei, nuosekliai didėja slaugos paslaugų poreikis, kartu auga slaugytojų darbo krūvis ir profesiniai reikalavimai. Be to, sveikatos priežiūros specialistų trūkumas lemia padidėjusį slaugytojų darbo intensyvumą ir nepalankias sąlygas, kurios didina profesinio perdegimo riziką ir neigiamai veikia slaugytojų psichinę bei fizinę sveikatą [19, 20].

Nors atlikta daug tyrimų apie sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant slaugytojus, profesinį perdegimą, daugumą jų apsiriboja atskirų perdegimo aspektų, tokių kaip paplitimas, priežastys ar pasekmės, analize. Šis tyrimas išsiskiria kompleksiniu požiūriu, nes jame nuosekliai analizuojami ne tik pagrindiniai profesinio perdegimo komponentai, bet ir dažniausiai taikomos bei moksliniais įrodymais pagrįstos intervencijos, skirtos perdegimui darbe mažinti. Tokia analizė sudaro prielaidas išsamiau suvokti profesinio perdegimo problemą ir pabrėžia šios srities aktualumą bei būtinybę skirti jai didesnį dėmesį. Tyrimo rezultatai leidžia identifikuoti pagrindines su profesiniu perdegimu susijusias problemas bei galimus jų sprendimo būdus, taip prisidedant prie veiksmingesnių perdegimo prevencijos ir valdymo strategijų kūrimo. Šio straipsnio **tikslas** – apžvelgti mokslinę literatūrą, nagrinėjančią slaugytojų profesinio perdegimo paplitimą, jo priežastis bei pagrindinius prevencijos metodus.

MEDŽIAGA IR METODAI

Siekiant ištirti slaugytojų profesinį perdegimą ir jo prevencijos priemones, buvo atlikta tiriamoji mokslinės literatūros apžvalga. Duomenys rinkti taikant mokslinę literatūros analizę, paieška atlikta *Pubmed*, *Web of Science* duomenų bazėse bei specializuotoje informacijos paieškos sistemoje *Google Scholar*. Buvo analizuojami literatūros šaltiniai lietuvių ir anglų kalbomis, susiję su tyrimo tema. Mokslinės literatūros paieškai naudoti reikšminiai žodžiai ir jų deriniai lietuvių bei anglų kalbomis: *perdegimas* IR *slauga* IR *prevencija* IR *intervencijos* (angl. *burnout AND nursing AND prevention AND interventions)*. Mokslinių šaltinių paieška vykdyta nuo 2025 m. spalio 10 d. iki 2025 m. gruodžio 20 d. Publikacijų atrankai taikyti šie įtraukimo kriterijai: straipsniuose analizuojamos paieškos frazėse apibrėžtos temos, tekstai parašyti lietuvių ar anglų kalbomis, prieinamas nemokamas visas straipsnio tekstas, straipsniai ne senesni nei 5 metų (nuo 2021 m. iki 2025 m.). Išimtis taikyta penkioms senesnėms publikacijoms, kurios buvo įtrauktos į teorinio pagrindo formavimą.

Paieškos metu rasti 402 straipsniai, iš kurių atrinkta ir detaliau išnagrinėta 120 publikacijų. Galutinei analizei atrinktos 39 publikacijos, kurios visiškai atitiko nustatytus kriterijus ir pateikė reikšmingų duomenų slaugytojų profesiniam perdegimui ir jo prevencijos aspektams analizuoti.

REZULTATAI

Slaugytojų profesinio perdegimo paplitimas

Naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad slaugytojams, palyginti su kitais sveikatos priežiūros specialistais, ypač būdingas profesinis perdegimas [21, 22]. Etiopijoje atliktu tyrimu nustatyta, jog perdegimo sindromą patiria beveik pusė (49,2 proc.) slaugytojų, o didesnei daliai jų nustatytas ryškus emocinis išsekimas (52,8 proc.), depersonalizacija (53,1 proc.) bei sumažėjęs asmeninių pasiekimų jausmas (58,1 proc.). Šie perdegimo komponentai buvo reikšmingai susiję su naktiniu darbu, žemu pasitenkinimu darbu, nepakankamu socialiniu palaikymu bei psichologiniais veiksniais, tokiais kaip nerimas ir depresija [23]. Graikijoje atliktu tyrimu nustatyta, kad slaugytojai patiria reikšmingai aukštesnį emocinio išsekimo ir depersonalizacijos lygį nei gydytojai ar kiti sveikatos priežiūros darbuotojai. Tyrimo rezultatai parodė, jog aukšto lygio perdegimas buvo būdingas 91,1 proc. slaugytojų, kai kitų sveikatos priežiūros specialistų grupėje šis rodiklis siekė 79,9 proc. Tokie rezultatai siejami su intensyviu tiesioginiu darbu su pacientais ir nuolatiniu emociniu krūviu, kuris yra būdingas slaugytojų profesinei veiklai [21].

Tyrėjų duomenimis, emocinį išsekimą ir sumažėjusį asmeninio pasiekimo jausmą patiria apie trečdalis slaugytojų, o depersonalizacija nustatyta maždaug ketvirtadaliui slaugos specialistų [24, 25]. Metaanalizės, apėmusios daugiau nei 30 šalių iš skirtingų pasaulio regionų, rezultatai parodė, kad bendras slaugytojų profesinio perdegimo paplitimas pasaulyje siekia apie 30 proc. Taip pat nustatyta, jog nuo 2012 iki 2022 metų perdegimo paplitimas nuosekliai didėjo, o ryškiausios didėjimo tendencijos buvo fiksuotos Europos ir Afrikos regionuose [26].

Lietuvoje atliktu tyrimu nustatyta, kad anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų grupėje daugumai respondentų visose perdegimo subskalėse buvo fiksuotas vidutinio lygio profesinis perdegimas, o aukštas ir labai aukštas emocinio išsekimo lygis atitinkamai nustatytas 27,8 proc. ir 13,9 proc. slaugytojų [27].

Užsienio tyrimų rezultatai parodė, kad emocinis išsekimas reikšmingai padidėjo COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Tuo metu onkologijos skyriuose dirbantiems slaugytojams buvo būdingas didžiausias depersonalizacijos lygis, o intensyviosios terapijos skyrių slaugytojai dažniau patyrė sumažėjusį asmeninio pasiekimo jaus-

mą [25]. Be to, Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad COVID-19 pandemija sukėlė reikšmingų iššūkių slaugos praktikoje, kurie turėjo neigiamą poveikį slaugytojų psichinei sveikatai. Šie veiksniai prisidėjo prie padidėjusio nuovargio, emocinio išsekimo ir profesinio perdegimo paplitimo, dar labiau išryškindami slaugos specialistų profesinio perdegimo problemos aktualumą [28].

Slaugytojų profesinį perdegimą lemiantys veiksniai.

Darbo organizavimo ir darbo sąlygų aspektai. Vienais reikšmingiausių profesinio perdegimo rizikos veiksnių slaugytojų darbe laikomi organizaciniai aspektai ir darbo sąlygų ypatumai, ypač didelis darbo krūvis ir ilgos darbo valandos [24, 29]. Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad slaugytojai, dirbantys daugiau nei 40 valandų per savaitę, perdegimą dažniau nurodė kaip pagrindinį veiksnį, paskatinusį juos palikti darbą [30]. Jordanijoje vykdyto tyrimo duomenys atskleidė, kad slaugytojai, dirbantys skyriuose, kuriuose yra didesnis pacientų skaičius ir didesnis darbo krūvis, dažniau patyrė emocinį išsekimą ir pasižymėjo aukštesniu profesinio perdegimo lygiu [31]. Panašios tendencijos nustatytos ir Jungtinėje Karalystėje bei Airijoje, kur tyrimų rezultatai parodė, jog nepakankamas personalo skaičius, ilgos (viršijančios 12 valandų) darbo pamainos bei nepakankamos poilsio pertraukos buvo statistiškai reikšmingai susijusios su padidėjusia perdegimo ir emocinio išsekimo rizika [32].

Darbo aplinkos psichosocialinis klimatas ir vadovavimo ypatumai reikšmingai prisideda prie profesinio perdegimo formavimosi slaugytojų darbe [24, 33]. Tyrimų rezultatai rodo, kad nepalanki psichosocialinė darbo aplinka, apimanti neefektyvų tarpusavio bendravimą, konfliktines situacijas, nepakankamą vadovų palaikymą bei ribotą socialinę paramą, yra glaudžiai susijusi su padidėjusia profesinio perdegimo rizika ir laikoma viena svarbiausių perdegimą prognozuojančių priežasčių slaugos praktikoje [33, 34]. Taivane atlikto tyrimo duomenimis, palaikomasis vadovavimo stilius tarp slaugytojų reikšmingai koreliuoja su sumažėjusiu emociniu išsekimu ir žemesniu profesinio perdegimo lygiu [34]. Kiti tyrimai taip pat patvirtina, kad vadovų palaikymas ir tinkama lyderystė darbe siejami su mažesniu perdegimo paplitimu, o nepalankus vadovavimas ir neigiamas psichosocialinis klimatas didina perdegimo tikimybę [35, 36].

Psichologiniai ir individualūs veiksniai taip pat atlieka reikšmingą vaidmenį slaugytojų profesinio perdegimo formavimuisi. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jungtinėje Karalystėje atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad tarp jaunesnio amžiaus slaugytojų profesinio perdegimo paplitimas yra didesnis, jis siejamas su profesinio vaidmens neapibrėžtumu, ribota darbo patirtimi ir dar nepakankamai išvystytais profesiniais gebėjimais konkrečiose darbo pozicijose [24, 37]. Panašūs rezultatai nustatyti ir Tanzanijoje atliktu tyrimu. Jo duomenimis, 21–30 metų amžiaus slaugytojai perdegimą patiria reikšmingai dažniau, palyginti su vyresnio amžiaus slaugytojais [11]. Tačiau profesinis perdegimas buvo nustatytas ir vyresnio amžiaus slaugytojų grupėje. Korėjoje atliktas tyrimas atskleidė, kad vyresni slaugytojai pasižymi didesniu emociniu išsekimu bei ryškesniais perdegimo simptomais, palyginti su jaunesniais kolegomis [38]. Kito tyrimo rezultatai atskleidė, kad didesnė darbo patirtis nebūtinai veikia kaip apsauginis veiksnys nuo perdegimo. Nustatyta, jog ilgesnę darbo patirtį turintiems slaugytojams buvo būdingas stipresnis emocinis nuovargis, o nuolatinis stresas, padidėjusi psichologinė apkrova ir intensyvus darbo krūvis reikšmingai didino profesinio perdegimo tikimybę tarp vyresnio amžiaus slaugytojų [39].

Tyrimai rodo, kad reikšmingas psichologinis veiksnys, lemiantis profesinio perdegimo vystymąsi, yra **psichologinė įtampa ir stresas** [24, 25]. Moksliniuose šaltiniuose akcentuojama, kad ilgalaikis ir nuolat patiriamas stresas yra vienas pagrindinių perdegimą skatinančių veiksnių, ypač būdingų slaugos profesinei veiklai [24, 40]. Užsienio tyrimų rezultatai rodo, jog moralinis stresas turi statistiškai reikšmingų sąsajų su didesne profesinio perdegimo tikimybe, ryškesniu emociniu išsekimu bei depersonalizacija [24, 41]. Nyderlanduose atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu slaugytojų patiriamas moralinis spaudimas ir stresas buvo susijęs su ribotomis galimybėmis užtikrinti optimalią pacientų priežiūrą, o tai lėmė dažnesnius nerimo simptomus ir padidėjusį ketinimą palikti darbą [42]. Panašios tendencijos nustatytos ir Korėjoje, kur darbe patiriamas stresas bei profesinis perdegimas buvo teigiamai susiję su sprendimu keisti darbą [43]. Lietuvoje vykdyto tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad dažniausiai pasireiškiantys perdegimo simptomai buvo darbo aplinkoje patiriama psichologinė įtampa, stresas, nerimo požymiai bei fizinis nuovargis [27].

Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros trūku-

mas laikomas reikšmingu veiksniu, prisidedančiu prie profesinio perdegimo formavimosi [31, 34, 44]. Taivane atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad slaugytojai, susiduriantys su ryškiu darbo ir asmeninio gyvenimo nesuderinamumu, išsiskyrė aukštesniais perdegimo rodikliais, kurie buvo siejami su didesniu emociniu išsekimu ir depersonalizacija bei sumažėjusiu profesiniu veiksmingumu [34]. Jordanijoje vykdyto tyrimo duomenys parodė, kad bendras gyvenimo kokybės lygis buvo statistiškai reikšmingai atvirkščiai susijęs su profesinio perdegimo sindromo bendru įverčiu [31]. Be to, kitų tyrimų rezultatai taip pat atskleidė, jog ryškesnis perdegimas buvo glaudžiai susijęs su prastesne gyvenimo kokybe, apimančia tiek psichologinės, tiek fizinės sveikatos rodiklius [44, 45].

Pandemijos ir kitos kritinės situacijos laikytinos reikšmingais išoriniais stresoriais, darančiais didelę įtaką slaugytojų profesinio perdegimo vystymuisi. COVID-19 pandemija tapo globaliu veiksniu, kuris reikšmingai padidino perdegimo tikimybę tarp slaugytojų visame pasaulyje [24, 28]. Tyrimų rezultatai atskleidė, kad pandemijos laikotarpiu perdegimo lygiui įtakos turėjo padidėjęs darbo intensyvumas, sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumas, darbas didelės rizikos aplinkoje ir kiti psichologiniai stresoriai [21, 24, 46]. Jungtinėse Amerikos Valstijose vykdytas tyrimas parodė, kad COVID-19 laikotarpiu maždaug 49 proc. sveikatos priežiūros specialistų patyrė profesinio perdegimo požymių, o nerimo ir emocinio išsekimo simptomai buvo fiksuojami dažniau nei iki pandemijos [28]. Jungtinėje Karalystėje vykdyto tyrimo duomenimis, 79 proc. respondentų, tarp jų ir slaugytojams, pandemijos metu nustatytas aukšto lygio perdegimas [37]. Kito tyrimo rezultatai taip pat atskleidė, jog ilgalaikė veikla ekstremaliomis darbo sąlygomis buvo reikšmingai susijusi su didesniu emociniu išsekimu, depersonalizacijos bei bendro profesinio perdegimo paplitimu, o ilgalaikėje perspektyvoje didino slaugytojų ketinimus palikti profesinę veiklą [46].

Profesinio perdegimo prevencijos priemonės slaugytojų profesinėje veikloje. Moksliniuose tyrimuose dažnai aptinkamos ir analizuojamos slaugytojams skirtos sąmoningumo (angl. *mindfulness*) principais paremtos intervencijos, taip pat streso valdymo, psichologinio atsparumo ir emocijų reguliavimo ugdymo programos [47–49]. Tyrimų duomenys parodė, kad šių priemonių taikymas yra susijęs su mažesniu emocinio išsekimo ir streso lygiu bei bendru profesinio perdegimo sumažėjimu, ypač tais atvejais, kai intervencijos yra sistemingos, tęstinės ir orientuotos į praktinių įgūdžių formavimą, reikalingą kasdienėms darbo situacijoms valdyti [49, 50]. Minėtos programos, ypač streso valdymo, prisideda prie geresnio stresą sukeliančių veiksnių atpažinimo, emocinių reakcijų kontrolės bei adaptyvesnių įveikos strategijų taikymo profesinėje veikloje [47, 51]. Tyrime analizuoti sąmoningumu grįsti streso mažinimo mokymai slaugytojams padidino jų psichologinį atsparumą ir pasitenkinimą darbu, kartu gerindami pacientų priežiūros kokybę [51]. Sąmoningumo meditacija prisidėjo prie streso ir perdegimo mažinimo tarp slaugytojų, reikšmingai sumažino savikritiką ir perteklinį susitapatinimą su patirtimis, sustiprino psichologinį atsparumą, užuojautą ir emocijų reguliavimo gebėjimus [50]. Taip pat svarbi prevencijos kryptis yra intervencijos, skirtos psichologiniam atsparumui (angl. *resilience*) didinti [48]. Atliktų tyrimų rezultatais patvirtinta, kad aukštesnis slaugytojų atsparumo lygis statistiškai reikšmingai koreliuoja su mažesniu emociniu nuovargiu bei depersonalizacijos pasireiškimu [48, 49]. Atsparumą stiprinančios intervencijos, orientuotos į savireguliacijos gebėjimų, problemų sprendimo įgūdžių, gebėjimo įveikti sunkumus ir psichologinio lankstumo ugdymą, gali atlikti svarbų apsauginį vaidmenį mažinant neigiamą profesinio streso bei perdegimo poveikį [47, 48].

Svarbus yra emocinio intelekto vaidmuo perdegimo prevencijos kontekste [47, 52, 53]. Emocinis intelektas apibūdinamas kaip asmens gebėjimas identifikuoti, interpretuoti ir reguliuoti tiek savo, tiek aplinkinių emocines būsenas, o tai slaugytojų profesinėje veikloje yra itin reikšminga dėl darbo situacijose patiriamo nuolatinio emocinio krūvio [53, 54]. Tyrimai atskleidžia, kad aukštesni emocinio intelekto rodikliai slaugytojų grupėje yra susiję su mažesniu profesinio perdegimo lygiu, silpnesniu motyvacijos mažėjimu bei rečiau išreiškiamais ketinimais nutraukti profesinę veiklą [52, 53]. Emocinio intelekto gebėjimai sudaro prielaidas veiksmingiau kontroliuoti emocinį krūvį, prisideda prie emocinio išsekimo mažinimo ir skatina palaikyti darbe konstruktyvius bei pozityvius tarpasmeninius santykius [52–54]. Nustatyta, kad emocinis intelektas nėra laikytinas vien tik įgimtu bruožu, jis gali būti nuosekliai vystomas taikant tikslines intervencijas [53–55]. Mokymai, orientuoti į savimonės stiprinimą, savireguliacijos gebėjimų ugdymą bei soci-

alinių kompetencijų plėtojimą, siejami su reikšmingu profesinio perdegimo rodiklių sumažėjimu po atliktų intervencijų [52–54].

Kiti tyrimai pabrėžia komandinio bendradarbiavimo ir socialinės paramos stiprinimo reikšmę mažinant profesinio perdegimo lygį slaugytojų darbe [34, 56]. Tyrimo duomenys rodo, kad kolegų tarpusavio palaikymas, vadovų teikiama parama bei mentorystės taikymas veikia kaip perdegimo riziką mažinantys veiksniai [34]. Socialinis palaikymas prisideda prie darbe patiriamo streso mažinimo ir skatina didesnį slaugytojų pasitenkinimą profesine veikla [56]. Organizaciniu požiūriu didžiausiu veiksmingumu pasižymi intervencijos, nukreiptos į darbo sąlygų gerinimą bei struktūrinio ir psichologinio plėtojimo stiprinimą [57]. Tyrimų rezultatai atskleidžia, kad optimizuotas darbo krūvis, aiškiai apibrėžtos profesinės funkcijos ir palaikomasis vadovavimo stilius siejami su mažesniu profesinio perdegimo lygiu ir aukštesne slaugos paslaugų kokybe [34, 57, 58]. Ypatingas dėmesys skiriamas lyderystės vaidmeniui, nes darbuotojus remiantis vadovavimo modelis prisideda prie geresnės darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimo bei emocinio išsekimo mažinimo [59].

REZULTATŲ APTARIMAS

Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad slaugytojų profesinis perdegimas yra plačiai paplitusi ir nuosekliai didėjanti problema, išsiskirianti tiek savo mastu, tiek daugialypėmis priežastimis. Tyrimų duomenys rodo, jog slaugytojai, palyginti su kitais sveikatos priežiūros specialistais, pasižymi vienais aukščiausių profesinio perdegimo rodiklių [21, 22]. Etiopijoje atliktame tyrime beveik pusė slaugytojų nurodė patiriantys perdegimo sindromą, o atskirų perdegimo komponentų, emocinio išsekimo, depersonalizacijos ir sumažėjusio asmeninių pasiekimų jausmo paplitimas buvo dar didesnis [23]. Šie duomenys leidžia daryti prielaidą, kad net ir tais atvejais, kai bendras perdegimo įvertis nesiekia aukščiausio lygio, atskiros dimensijos gali būti ryškiai išreikštos ir turėti tiesioginį neigiamą poveikį tiek slaugytojų savijautai, tiek darbo kokybei.

Tarptautiniu mastu išryškėjo nuoseklios tendencijos – stiprų emocinį išsekimą ir sumažėjusį asmeninių pasiekimų jausmą patiria apie trečdalis slaugytojų, o depersonalizacija nustatoma maždaug ketvirtadaliui jų [24, 25]. Tyrimo, apėmusio daugiau nei 30 šalių, duomenys rodo, kad bendras slaugytojų perdegimo paplitimas pasaulyje siekia apie 30 proc., o 2012–2022 m. laikotarpiu fiksuotas nuoseklus didėjimas, ryškiausias Europos ir Afrikos regionuose [26]. Panašūs rezultatai gauti ir Lietuvoje atliktame tyrime. Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojams dažniau nustatomas vidutinio lygio perdegimas visose subskalėse, o aukštas ir labai aukštas emocinio išsekimo lygis fiksuotas atitinkami 27,8 proc. ir 13,9 proc. slaugytojų [27]. Tai gali pagrįsti teiginį, kad dėl nuolatinio klinikinio intensyvumo ir patiriamo streso, greitų sprendimų poreikio ir dažnesnio susidūrimo su kritinėmis situacijomis didėja emocinio išsekimo rizika. Kito tyrimo duomenys atskleidė itin aukštus perdegimo rodiklius. Slaugytojų grupėje aukšto lygio perdegimas siekė 91,1 proc., reikšmingai viršydamas kitų sveikatos priežiūros specialistų rodiklius [21]. Toks skirtumas tarp profesinių grupių leidžia pabrėžti slaugos profesijos specifiškumą – nuolatinį emocinį įsitraukimą, intensyvų kontaktą su pacientais ir artimą dalyvavimą pacientų kančiose bei mirties situacijose.

Tarp profesinį perdegimą lemiančių veiksnių ryškiai vyrauja darbo organizavimo ir darbo sąlygų aspektai. Didelis darbo krūvis ir ilgos darbo valandos yra vieni reikšmingiausių rizikos veiksnių [24, 29]. JAV tyrimas parodė, kad slaugytojai, dirbantys daugiau nei 40 valandų per savaitę, perdegimą dažniau nurodė kaip veiksnį, paskatinusį juos palikti darbą [30], o Jordanijos tyrime didesnis pacientų skaičius ir darbo krūvis buvo susijęs su dažnesniu emociniu išsekimu [31]. Kitu tyrimu nustatyta, kad ilgos, daugiau kaip 12 valandų trunkančios darbo pamainos, nepakankamas personalo skaičius ir poilsio pertraukų trūkumas reikšmingai didino perdegimo riziką [32]. Šie duomenys leidžia interpretuoti perdegimo sindromą ne tik kaip individualią reakciją į stresą, bet ir į sisteminės organizacijos bei sveikatos priežiūros sistemos veikimo rezultatą.

Individualių veiksnių analizė, ypač amžiaus ir darbo patirties aspektai, parodė nevienodas tendencijas. Dalis tyrimų teigia, kad jaunesni slaugytojai dažniau patiria perdegimą dėl ribotos patirties, streso bei nepakankamų profesinių gebėjimų [24, 37]. Tačiau Korėjoje atliktame tyrime vyresni slaugytojai pasižymėjo didesniu emociniu išsekimu [38], o kitas tyrimas rodo, kad ilgesnė patirtis nebūtinai veikia kaip apsauginis veiksnys, nes ilgalaikis stresas ir didelis darbo krūvis gali didinti perdegimo riziką bet kuriame amžiuje [39].

Ne mažiau svarbūs psichosocialiniai veiksniai ir vadovavimo ypatumai. Nepalanki psichosocialinė darbo aplinka, konfliktai, neefektyvus bendravimas ir prasta socialinė parama yra stipriai susiję su didesne perdegimo rizika [33, 34]. Taivane nustatyta, kad palaikomasis vadovavimo stilius reikšmingai koreliuoja su mažesniu emociniu išsekimu [34], o kiti tyrimai patvirtino, jog tinkama lyderystė ir vadovų palaikymas mažina perdegimo paplitimą ir, atvirkščiai, nepalankus vadovavimas perdegimo riziką didina [35, 36]. Tai išryškina praktinę įžvalgą – organizacinės intervencijos, tokios kaip mentorystė, lyderystės stiprinimas, komunikacijos gerinimas, gali būti ne mažiau svarbios nei individualios streso valdymo priemonės.

COVID-19 pandemija tapo reikšmingu veiksniu, dar labiau padidinusiu profesinio perdegimo paplitimą. Šiuo laikotarpiu emocinis išsekimas reikšmingai padidėjo, o pandemija buvo siejama su stipriu nuovargiu, psichikos sveikatos blogėjimu ir perdegimo didėjimu [25, 28]. Tarptautiniai duomenys rodo, kad pandemijos metu apie pusė sveikatos priežiūros specialistų patyrė perdegimo požymių, o Jungtinėje Karalystėje 79 proc. respondentų nustatytas aukštas perdegimo lygis [28, 37]. Be to, patiriamas moralinis bei nuolatinis stresas, perdegimo požymiai, sunkumai užtikrinti optimalią pacientų priežiūrą buvo susiję su nerimo simptomais ir ketinimu palikti darbą [42, 43]. Tokie rezultatai pabrėžia, kad ekstremalios darbo sąlygos bei stresas gali sustiprinti jau egzistuojančias perdegimo rizikas ir turėti ilgalaikių pasekmių sveikatos priežiūros sistemai.

Prevencinių priemonių analizė rodo, kad veiksmingiausios strategijos yra kompleksinės ir apima tiek individualaus, tiek organizacinio lygmens intervencijas. Dažnai minimos sąmoningumu grįstos programos, streso valdymo, emocijų reguliavimo ir psichologinio atsparumo ugdymo intervencijos [47–49]. Tyrimų duomenys leidžia teigti, kad sistemingos, į praktinius įgūdžius orientuotos programos yra susijusios su mažesniu emociniu išsekimu, stresu bei perdegimo sumažėjimu [47, 49–51]. Aukštas emocinis intelektas yra susijęs su mažesniu perdegimu, retesniais ketinimais palikti profesiją ir geresne emocijų kontrole [52–54]. Ilgalaikiam slaugytojų profesinio perdegimo mažinimui reikalingas integruotas požiūris, apimantis organizacinius sprendimus, tokius kaip darbo krūvio optimizavimas, pakankamo personalo užtikrinimas bei vadovų ir kolegų teikiamos paramos stiprinimas [34, 48, 49, 59].

Apibendrinant galima teigti, kad slaugytojų profesinį perdegimą lemia kompleksinė, tarpusavyje glaudžiai susijusių organizacinių sąlygų, individualių psichologinių aspektų ir išorinių aplinkybių visuma [24–26, 29–32, 34]. Todėl efektyvi slaugytojų profesinio perdegimo prevencija turi būti grindžiama sisteminiu ir visapusišku priemonių taikymu. Ji turėtų apimti tiek individualias intervencijas, tokias kaip streso valdymas, psichologinio atsparumo, sąmoningumo bei emocinio intelekto ugdymas, tiek organizacinius sprendimus – darbo krūvio optimizavimą, palaikomąjį vadovavimą ir komandinės paramos stiprinimą [34, 48, 49, 52, 57, 59]. Toks integruotas požiūris gali prisidėti prie slaugytojų emocinės būsenos gerinimo, profesinio patrauklumo didinimo ir aukštesnės slaugos paslaugų kokybės užtikrinimo ilgalaikėje perspektyvoje.

IŠVADOS

1. Didžioji dalis slaugytojų patiria profesinį perdegimą, emocinį išsekimą ir depersonalizaciją. Slaugytojams profesinis perdegimas pasireiškia dažniau, palyginti su kitais sveikatos priežiūros specialistais.
2. Slaugytojų profesinį perdegimą labiausiai lemia sisteminiai ir darbo aplinkos veiksniai, ypač didelis darbo krūvis, ilgos pamainos, personalo trūkumas, nepalankus psichosocialinis klimatas ir nepakankamas vadovų bei kolegų palaikymas. Perdegimas taip pat yra reikšmingai susijęs su patiriamu stresu, nerimu ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyros stoka.
3. Efektyvi perdegimo prevencija turi būti kompleksinė, apimanti individualias intervencijas – streso valdymą, sąmoningumo, atsparumo ir emocinio intelekto lavinimą – bei organizacinius sprendimus – darbo krūvio reguliavimą, palaikomąjį vadovavimą ir komandinę paramą.

Straipsnis gautas 2026-01-14, priimtas 2026-03-06

Literatūra

1. Dong M, Zhang X, Wu L, Cao F. Exploring the bidirectional relationship between job burnout and empathy in nurses: A longitudinal study. Patient Educ Couns. 2025 Jan 1;130:108445. DOI:10.1016/j.pec.2024.108445.
2. Dall'Ora C, Ball J, Reinius M, Griffiths P. Burnout in nursing: a theoretical review. Hum Resour Health. 2020 Jun 5;18(1):41. DOI: 10.1186/s12960-020-00469-9.
3. Edú-Valsania S, Laguía A, Moriano JA. Burnout: A Review of Theory and Measurement. Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb 4;19(3):1780. DOI: 10.3390/ijerph19031780.
4. Maslach C, Leiter MP. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry. 2016 Jun;15(2):103–11. DOI: 10.1002/wps.20311.
5. Bouza E, Gil-Monte PR, Palomo E, Cortell-Alcocer M, Del Rosario G, González J, et al. Síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) en los médicos de España. Rev Clin Esp. 2020 Aug 1;220(6):359–63. DOI: 10.1016/j.rce.2020.02.002. Epub 2020 Apr 14.
6. Maslach C, Jackson SE, Leiter MP. Maslach Burnout Inventory: Third edition. [Internet]. Evaluating stress: A book of resources. 1997; p. 191–218.
7. Maslach Ch, Leiter MP. The truth about burnout: how organizations cause personal stress and what to do about it. 2013;186.
8. Mohr DC, Elnahal S, Marks ML, Derickson R, Osatuke K. Burnout Trends Among US Health Care Workers. JAMA Netw Open. 2025 Apr 1;8(4):e255954. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2025.5954.
9. Bizuneh B, Markos Woldesemayat E, Lucero DE, Markos T, Getachew H. Prevalence and associated factors of burnout syndrome among selected health care professionals at University Hospitals of Sidama Region and Southern, Ethiopia 2023. BMC Health Serv Res. 2025 Dec 1; 25(1). doi.org/10.1186/s12913-025-12437-x
10. Lee YL, Dai JW, Li XW, Chiang MY, Chen PT, Lin YC, Wang CH. Prevalence and the associated factors of burnout among the critical healthcare professionals during the post-pandemic era: a multi-institutional survey in Taiwan with a systematic review of the Asian literatures. BMC Public Health. 2024 Dec 18;24(1):3480. DOI: 10.1186/s12889-024-21084-6.
11. Mfuru GH, Ubuguyu O, Yahya-Malima KI. Prevalence and factors associated with burnout among healthcare providers at Kasulu district in Kigoma region, 2024: an analytical cross-sectional study in a primary healthcare setting. BMJ Open. 2024 Dec 22;14(12):e094520. DOI: 10.1136/bmjopen-2024-094520.
12. Khader Alhassani F, Helal Alhassani H. Occupational Stress and Burnout in Healthcare Workers: Causes, Consequences, and Solutions. Journal of International Crisis and Risk Communication Research. 2024;7(3):224–36.
13. Bakker AB, Demerouti E. Job demands-resources theory: Taking stock and looking forward. J Occup Health Psychol. 2017 Jul;22(3):273–285. DOI: 10.1037/ocp0000056.
14. Nicole Mazzei Williams; Chris Cale; Sunddip Panesar Aguilar. Healthcare Leaders' Perceptions on Burnout and Its Impact on Employee Engagement. Sci. J. Bus. Manag. 2023, 11(3):133–140. DOI: 10.11648/j.sjbm.20231103.15.
15. Halawani N, Khalaf AlOmari H, Saleh AlZamil M, Khaled Almutairi A, Saad Alharthi M, Abdolmohsen Alluqmani W. A systematic review of burnout among healthcare providers: prevalence, causes, and impacts. International Journal of Development Research 12(13):64368–64372. https://doi.org/10.37118/ijdr.27558.12.2023
16. Korzonek-Szlacheta I. Burnout and Life Satisfaction among Healthcare Workers Related to the COVID-19 Pandemic (Silesia, Poland). Behav Neurol. 2024 May 2;2024:9945392. DOI: 10.1155/2024/9945392. Erratum in: Behav Neurol. 2025 Sep 29;2025:9869136. DOI: 10.1155/bn/9869136.
17. Dima E. Corresponding author: Eftychia Dima. The Impact of burnout in healthcare professionals on patient care quality: A review. World Journal of Advanced Research and Reviews. 2025;2025(02):2706–10. doi.org/10.30574/wjarr.2025.25.2.0633
18. Gaspar T, Botelho-Guedes F, Cerqueira A, Baban A, Rus C, Gaspar-Matos M. Burnout as a multidimensional phenomenon: how can workplaces be healthy environments? Journal of Public Health. 2024; 33(12):2591–2604. DOI:10.1007/s10389-024-02223-0.
19. Klišys E, Mikaliūkštienė A, Fatkulina N. COVID-19 pandemijos įtaka slaugytojų perdegimo sindromui. Slauga. Mokslas ir praktika. 2022;3(2(302)):8–13. https://doi.org/10.47458/Slauga.2022.3.3
20. Kiškytė-Zapolskė A, Miežienė B, Giliun R. Fizinio aktyvumo poveikis slaugytojų perdegimo sindromo prevencijai ir valdymui: literatūros apžvalga. Slauga. Mokslas ir praktika. 2025;6(5(329)):8–17. https://doi.org/10.15388/Slauga.2025-6.1
21. Galanis P, Moisoglou I, Katsiroumpa A, Vraka I, Siskou O, Konstantakopoulou O, Meimeti E, Kaitelidou D. Increased Job Burnout and Reduced Job Satisfaction for Nurses Compared to Other Healthcare Workers after the COVID-19 Pandemic. Nurs Rep. 2023 Aug 14;13(3):1090–1100. DOI: 10.3390/nursrep13030095.
22. Ghahramani S, Lankarani KB, Yousefi M, Heydari K, Shahabi S, Azmand S. A Systematic Review and Meta-Analysis of Burnout Among Healthcare Workers During COVID-19. Front Psychiatry. 2021 Nov 10;12:758849. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.758849.
23. Efa AG, Lombebo AA, Nuriye S, Facha W. Prevalence of burnout and associated factors among nurses working in public hospitals, southern Ethiopia: a multi-center embedded mixed study. Sci Rep. 2024 Dec 28;14(1):31268. DOI: 10.1038/s41598-024-82703-1.
24. Galanis P, Vraka I, Fragkou D, Bilali A, Kaitelidou D. Nurses' burnout and associated risk factors during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. J Adv Nurs. 2021 Aug;77(8):3286–3302. DOI: 10.1111/jan.14839.
25. Getie A, Ayenew T, Amlak BT, Gedfew M, Edmealem A, Kebede WM. Global prevalence and contributing factors of nurse burnout: an umbrella review of systematic review and meta-analysis. BMC Nurs. 2025 May 26;24(1):596. DOI: 10.1186/s12912-025-03266-8. PMID: 40420259; PMCID: PMC12108038.
26. Ge MW, Hu FH, Jia YJ, Tang W, Zhang WQ, Chen HL. Global prevalence of nursing burnout syndrome and temporal trends for the last 10 years: A meta-analysis of 94 studies covering over 30 countries. J Clin Nurs [Internet]. 2023 Sep 132(17–18):5836–54. doi/pdf/10.1111/jocn.16708.
27. Urbanavičė R, Zaiko A. Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų profesinis perdegimas. Sveikatos mokslai. 2024;34(2):135–42. DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2024.069.
28. Prasad K, McLoughlin C, Stillman M, Poplau S, Goelz E, Taylor S, Nankivil N, Brown R, Linzer M, Cappelucci K, Barbouche M, Sinsky CA. Prevalence and correlates of stress and burnout

among U.S. healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A national cross-sectional survey study. E Clinical Medicine. 2021 May 16;35:100879. DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.100879. PMID: 34041456.
29. Sullivan V, Hughes V, Wilson DR. Nursing Burnout and Its Impact on Health. Nurs Clin North Am. 2022 Mar;57(1):153–169. DOI: 10.1016/j.cnur.2021.11.011.
30. Shah MK, Gandrakota N, Cimiotti JP, Ghose N, Moore M, Ali MK. Prevalence of and Factors Associated With Nurse Burnout in the US. JAMA Netw Open. 2021 Feb 1;4(2):e2036469. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.36469. Erratum in: JAMA Netw Open. 2021 Mar 1;4(3):e215373. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.5373. Erratum in: JAMA Netw Open. 2023 Apr 3;6(4):e2312593. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.12593.
31. Khatatbeh H, Al-Dwaikat T, Alfatafta H, Ali AM, Pakai A. Burnout, quality of life and perceived patient adverse events among paediatric nurses during the COVID-19 pandemic. J Clin Nurs. 2023;32(13–14):3874–86. doi/pdf/10.1111/jocn.16540
32. Dall'Ora C, Ejebu OZ, Ball J, Griffiths P. Shift work characteristics and burnout among nurses: cross-sectional survey. Occup Med (Lond). 2023 May 18;73(4):199–204. DOI: 10.1093/occmed/kqad046. PMID: 37130349.
33. Paskarini I, Dwiyanti E, Syaiful DA, Syanindita D. Burnout among nurses: Examining psychosocial work environment causes. J Public Health Res. 2023 Jan 18;12(1):22799036221147812. DOI: 10.1177/22799036221147812.
34. Yeh TF, Chang YC, Hsu YH, Huang LL, Yang CC. Causes of nursing staff burnout: Exploring the effects of emotional exhaustion, work–family conflict, and supervisor support. Japan Journal of Nursing Science. 2021;18(2):e12392. doi/pdf/10.1111/jjns.12392
35. Montenegro Méndez S, Laguía González A, Moriano León JA. Is Leadership a Resource? A Systematic Review of Its Role in Burnout and Engagement Among Nurses Within the JD-R Model. J Nurs Manag. 2025 Nov 27;2025:8853148. DOI: 10.1155/jonm/8853148.
36. Jiaqing H, Yusheng T, Mimi Z, Jiaxin Y, Eliufoo E, Min Y, Yamin L. Relationship between head nurse leadership and nurses' burnout: parallel mediation of job demands and job resources among clinical nurses. BMC Nurs. 2025 Apr 1;24(1):354. DOI: 10.1186/s12912-025-03006-y.
37. Ferry AV, Wereski R, Strachan FE, Mills NL. Predictors of UK healthcare worker burnout during the COVID-19 pandemic. QJM. 2021 Oct 7;114(6):374–380. DOI: 10.1093/qjmed/hcab065.
38. Jang Y, You M, Lee H, Lee M, Lee Y, Han JO, Oh JH. Burnout and peritraumatic distress of healthcare workers in the COVID-19 pandemic. BMC Public Health. 2021 Nov 12;21(1):2075. DOI: 10.1186/s12889-021-11978-0.
39. Kim S, Jun J, Carle AC, Hall P, Tubbs-Cooley HL. Association Between Perceived Stress and Burnout Among Neonatal Intensive Care Nurses. Advances in Neonatal Care: Official Journal of the National Association of Neonatal Nurses. 2025 Oct. DOI: 10.1097/anc.0000000000001303.
40. Jun J, Ojemeni MM, Kalamani R, Tong J, Crecelius ML. Relationship between nurse burnout, patient and organizational outcomes: Systematic review. Int J Nurs Stud. 2021 Jul;119:103933. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2021.103933.
41. Lamoureux S, Mitchell AE, Forster EM. Moral distress among acute mental health nurses: A systematic review. Nurs Ethics. 2024 Nov;31(7):1178–1195. DOI: 10.1177/09697330241238337. Epub 2024 Mar 15.
42. Donkers MA, Gilissen VJHS, Candel MJJM, van Dijk NM, Kling H, Heijnen-Panis R, Pragt E, van der Horst I, Pronk SA, van Mook WNKA. Moral distress and ethical climate in intensive care medicine during COVID-19: a nationwide study. BMC Med Ethics. 2021 Jun 17;22(1):73. DOI: 10.1186/s12910-021-00641-3.
43. Lee YM, Kim DY, Kim EJ, Park KH, Lee MS. Impact of COVID-19 pandemic on healthcare-associated infections at intensive care units in South Korea: data from the Korean National Healthcare-Associated Infections Surveillance System (KONIS). J Hosp Infect. 2023 Aug;138:52–59. DOI: 10.1016/j.jhin.2023.05.010.
44. Alabi MA, Ishola AG, Onibokun AC, Lasebikan VO. Burnout and quality of life among nurses working in selected mental health institutions in South West Nigeria. Afr Health Sci. 2021 Sep;21(3):1428–1439. DOI: 10.4314/ahs.v21i3.54.
45. Khatatbeh H, Pakai A, Al-Dwaikat T, Onchonga D, Amer F, Prémusz V, Oláh A. Nurses' burnout and quality of life: A systematic review and critical analysis of measures used. Nurs Open. 2022 May;9(3):1564–1574. DOI: 10.1002/nop2.936.
46. Burrowes SAB, Casey SM, Pierre-Joseph N, Talbot SG, Hall T, Christian-Brathwaite N, Del-Carmen M, Garofalo C, Lundberg B, Mehta PK, Mottl-Santiago J, Schechter-Perkins EM, Weber A, Yarrington CD, Perkins RB. COVID-19 pandemic impacts on mental health, burnout, and longevity in the workplace among healthcare workers: A mixed methods study. J Interprof Educ Pract. 2023 Sep;32:100661. DOI: 10.1016/j.xjep.2023.100661.
47. Cohen C, Pignata S, Bezak E, Tie M, Childs J. Workplace interventions to improve well-being and reduce burnout for nurses, physicians and allied healthcare professionals: a systematic review. BMJ Open. 2023 Jun 29;13(6):e071203. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-071203.
48. Castillo-González A, Velando-Soriano A, De La Fuente-Solana EI, Martos-Cabrera BM, Membrive-Jiménez MJ, Lucía RB, Cañadas-De La Fuente GA. Relation and effect of resilience on burnout in nurses: A literature review and meta-analysis. Int Nurs Rev. 2024 Mar;71(1):160–167. DOI: 10.1111/inr.12838.
49. Lee M, Cha C. Interventions to reduce burnout among clinical nurses: systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2023 Jul 6;13(1):10971. DOI: 10.1038/s41598-023-38169-8.
50. Green AA, Kinchen EV. The Effects of Mindfulness Meditation on Stress and Burnout in Nurses. J Holist Nurs. 2021 Dec;39(4):356–368. DOI: 10.1177/08980101211015818. Epub 2021 May 17. Erratum in: J Holist Nurs. 2022 Sep;40(3):NP1–NP5. DOI: 10.1177/08980101221127086.
51. Talebiazar N, Anzali BC, Abbasi M, Azizi N, Goli R, Faraji N, Bagheri M, Amiri N, Kazemi S. Does mindfulness-based stress reduction training have an impact on the occupational burnout and stress experienced by nurses? A randomized controlled trial. Int Arch Occup Environ Health. 2025 Jan;98(1):1–11. DOI: 10.1007/s00420-024-02078-8.
52. Galanis P, Katsiroumpa A, Moisoglou I, Kalogeropoulou M, Gallos P, Vraka I. Emotional intelligence protects nurses against quiet quitting, turnover intention, and job burnout. AIMS Public Health. 2024 Apr 25;11(2):601–613. DOI: 10.3934/publichealth.2024030.
53. Fattah HAA, Sallam GK, Hendy AS, Abozeid A, Rodenhurst N. The Beneficial Effects of Emotional Intelligence Training for

Critical Care Nurses on Job Burnout: A Quasi-Experimental Study. Iran J Nurs Midwifery Res. 2023 Jun 21;28(3):300–304. DOI: 10.4103/ijnmr.ljnmr_345_20.

54. Sharma B, Kaur S, Sharma V. Impact of nurses' emotional intelligence and self-compassion on occupational burnout: A correlation study. J Educ Health Promot. 2025 Mar 28;14:100. DOI: 10.4103/jehp.jehp_746_24. PMID: 40271260.
55. Taylor MJ, Andreatta R, Woltenberg L, Cormier M, Hoch JM. The relationship of emotional intelligence to burnout and related factors in healthcare profession students. Nurse Educ Today. 2024 Dec;143:106387. DOI: 10.1016/j.nedt.2024.106387.
56. Liu Y, Aungsuroch Y, Gunawan J, Zeng D. Job Stress, Psychological Capital, Perceived Social Support, and Occupational Burnout Among Hospital Nurses. J Nurs Scholarsh. 2021 Jul;53(4):511–518. DOI: 10.1111/jnu.12642.
57. Şenol Çelik S, Sariköse S, Çelik Y. Structural and psychological empowerment and burnout among nurses: A systematic review and meta-analysis. Int Nurs Rev. 2024 Mar;71(1):189–201. DOI: 10.1111/inr.12878.
58. Brooks Carthon JM, Hatfield L, Brom H, Houton M, Kelly-Hellyer E, Schlak A, Aiken LH. System-Level Improvements in Work Environments Lead to Lower Nurse Burnout and Higher Patient Satisfaction. J Nurs Care Qual. 2021 Jan-Mar 01;36(1):7–13. DOI: 10.1097/NCQ.0000000000000475. PMID: 32102025.
59. Dimitrios M, Maria P, Kloutsiniotis P. The Influence of Leadership on Structural Empowerment and Work-Life Balance on Nurses' Burnout and Patients' Assessed Quality of Care During the Covid-19 Pandemic. Med Res Arch. 2023;11(7.1). DOI: https://doi.org/10.18103/mra.v11i7.1.4102

NURSES' BURNOUT AND ITS PREVENTIVE MEASURES

Evelina Grinevič, Aldona Mikaliūkštienė
Department of Obstetrics and Nursing, Institute of Health Sciences, Faculty of Medicine, Vilnius University

SUMMARY
Burnout is one of the most common and significant psychosocial problems in the professional activities of nurses, which has negative consequences for both employee health and patient safety and the functioning of the healthcare system. The scientific literature emphasizes that burnout in nurses is increasingly perceived as a systemic and complex problem, closely related to work organization, emotional work demands, and organizational environment. Therefore, the importance of applying preventive measures is emphasized in order to prevent the spread of burnout and reduce its negative consequences.

The aim of the article is to review the scientific literature on burnout in nurses, its prevalence, causes, and methods of prevention.

Material and methods. An exploratory review of the scientific literature was conducted, examining burnout in nurses, its prevalence, causes, and methods of prevention. Data were collected from 2021-2025. scientific sources available in the databases: National Library of Medicine (Pubmed), Web of Science platform (Clarivate) and Google Scholar search engine. A total of 120 sources were reviewed, of which 39, meeting the selection criteria, were included in the analysis.

Results. The analysis of scientific literature revealed that nurses have high rates of burnout, emotional exhaustion and depersonalization. The development of burnout is significantly influenced by high workload, unfavorable working conditions, psychological stress, work-life imbalance and external stressors, such as the COVID-19 pandemic. The literature analysis shows that the most effective prevention of burnout should be based on an integrated approach that includes strengthening individual psychological resources and improving organizational work environment factors.

Conclusions. The majority of nurses experience professional burnout, emotional exhaustion and depersonalization. Nurses experience burnout more frequently than other healthcare professionals. Burnout in nurses is most often caused by systemic and work environment factors, particularly high workload, long shifts, staff shortages, an unfavorable psychosocial climate, and insufficient support from managers and colleagues. Burnout is also significantly associated with stress, anxiety, and lack of work-life balance. Effective prevention of burnout must be comprehensive, encompassing individual interventions – stress management, awareness, resilience, and emotional intelligence development, and organizational solutions – workload regulation, supportive leadership, and team support.

Keywords: interventions, prevention, professional burnout, causes of professional burnout, nursing.

Received 14 January 2026, accepted 6 March 2026

Correspondence to Aldona Mikaliūkštienė
Department of Obstetrics and Nursing,
Institute of Health Sciences,
Faculty of Medicine Vilnius University
M. K. Čiurlionio str. 21/27, LT-03101 Vilnius,
Lithuania
E-mail: aldona.mikaliukstiene@mf.vu.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-10

SALDUMO POJŪTĮ SUTEIKIANČIOS MEDŽIAGOS: VARTOJIMO TENDENCIJOS IR POVEIKIS ŽMOGAUS SVEIKATAI. LITERATŪROS APŽVALGA

Justas Paršeliūnas[1], Laura Nedzinskienė[2], Ugnė Utkutė[1], Renata Giliun[3]
[1]*Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas*
[2]*Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra*
[3]*Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Akušerijos ir slaugos katedra*

SANTRAUKA

Straipsnio tikslas – apžvelgti saldumo pojūtį suteikiančių medžiagų vartojimo paplitimą, tendencijas ir poveikį žmogaus sveikatai.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Išanalizuoti 2000–2025 metais publikuoti straipsniai, pateikti duomenų bazėse *PubMed, ScienceDirect, SpringerLink* ir *Google Scholar*. Taip pat naudotos tarptautinių institucijų ataskaitos iš EFSA, WHO, FAO/JECFA bei U.S. FDA, o nacionalinio konteksto analizei – Lietuvos Respublikos Seimo Tyrimų skyriaus dokumentai. Buvo atrinktos 63 publikacijos, kurios atitiko šiuos atrankos kriterijus: kalba (anglų, lietuvių), patikimumas, pagrįstumas bei temos specifika. Naudoti viso teksto straipsniai, vertinti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, sisteminės ir metaanalizės, literatūros apžvalgos. Šaltiniams nagrinėti taikyta aprašomoji analizė.

Rezultatai bei išvados. Medžiagų, suteikiančių saldumo pojūtį, vartojimas turi reikšmingą teigiamą ir (ar) neigiamą poveikį žmogaus sveikatai: ilgalaikis didelio cukrų kiekio vartojimas, ypač sacharozės (cukraus), gliukozės ir fruktozės (cukrų), gali prisidėti prie svorio didėjimo, riebalų kaupimosi, insulino rezistentiškumo ir didesnės metabolinių ligų rizikos. Aspartamo bei kitų dirbtinių saldiklių vartojimas, nepaisant jų žemo kaloringumo ir pagrindinių reguliavimo institucijų (EFSA ir FDA) pripažinimo, gali būti siejamas su reikšmingais žarnyno mikrobiotos sudėties pokyčiais, gliukozės homeostazės reguliacijos sutrikimais ir apetito kontrolės mechanizmų moduliacija, o jų ilgalaikės sąsajos su kancerogeniškumu (priskiriami B grupės kancerogenų kategorijai), kardiovaskulinių, cerebrovaskulinių ir neurodegeneracinių ligų rizika išlieka aktualios tolimesniems moksliniams tyrimams ir diskusijoms. Natūralieji saldikliai gali būti palankesni vartoti dėl antioksidacinių, priešuždegiminių ir antidiabetinių savybių, tačiau esami klinikiniai duomenys yra nepakankami galutinėms išvadoms dėl jų saugumo ir galimų naudų formuoti.

Reikšminiai žodžiai: dirbtiniai saldikliai, natūralieji saldikliai, nekaloringieji saldikliai, cukrus, cukrūs.

ĮVADAS

Žmonija pasaulį patiria per penkis pagrindinius pojūčius, o gautą informaciją interpretuoja pasitelkdama protą ir emocijas. Ši trapi žmogaus prigimtis lemia polinkį mėgti tam tikrus dirgiklius ir nemėgti kitų, suteikiančių neigiamus pojūčius [1]. Saldumas yra vienas geidžiamiausių žmogaus skonių, tačiau jau daug metų žinoma, kad per didelis cukrų vartojimas daro neigiamą poveikį sveikatai [2]. Todėl nuolat atliekami tyrimai su įvairiomis medžiagomis, kurios suteikia saldumo pojūtį, siekiant išsiaiškinti jų poveikį žmogaus sveikatai, rasti sveikesnę alternatyvą cukrui, taikomos įvairios prevencinės priemonės, skatinančios visuomenę mažinti cukrų kiekį. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Europos Komisija, įvairios mokslo institucijos, sveikatos organizacijos ne kartą ragino valstybes taikyti įvairias priemones, taip pat ir mokestines, siekiant mažinti cukrų vartojimą ir taip skatinti sveiką mitybą. PSO paskelbtos mokesčių gairės yra praktinis vadovas politikos formuotojams ir kitiems,

Adresas susirašinėti: Laura Nedzinskienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
M. K. Čiurlionio g. 21/27, 03101 Vilnius
El. p. laura.nedzinskiene@mf.vu.lt

dalyvaujantiems kuriant cukrumi saldintų gėrimų apmokestinimo politiką, siekiant skatinti sveiką mitybą ir puoselėti žmonių sveikatą [3]. Nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo pakeitimai (Nr. IX-569) daro tiesioginę įtaką nealkoholinių gėrimų gamybos technologijoms. Tikėtina, kad dėl padidėjusių mokesčių gamintojai, siekdami išlaikyti produkto kainos patrauklumą, masiškai keis pridėtinį cukrų pigesniais sintetiniais ar natūraliais saldikliais. Nors toks žaliavų pakeitimas prisideda prie cukrų vartojimo mažinimo, visuomenės sveikatos požiūriu tai sukelia naujų rizikų. Vertinant populiacijos sveikatą ilgalaikėje perspektyvoje, kyla mokslinis poreikis tirti medžiagų, suteikiančių saldumo pojūtį, poveikį žmogaus sveikatai. Taigi cukrų pakeitimas saldikliais turėtų būti vertinamas ne tik kaip ekonominis sprendimas, bet ir kaip reikšmingas mitybos pokytis.

Šio straipsnio tikslas – apžvelgti saldumo pojūtį suteikiančių medžiagų vartojimo paplitimą, jo tendencijas ir poveikį žmogaus sveikatai.

METODIKA

Rengiant literatūros apžvalgą publikacijų paieška buvo vykdoma 2025 metais. Išanalizuoti 2000–2025 metais publikuoti straipsniai, pateikti duomenų bazėse *PubMed, ScienceDirect, SpringerLink* ir *Google Scholar*. Taip pat naudotos tarptautinių institucijų ataskaitos iš EFSA, WHO, FAO/JECFA bei U.S. FDA, o nacionalinio konteksto analizei – Lietuvos Respublikos Seimo Tyrimų skyriaus dokumentai. Mokslinių straipsnių paieškai buvo naudojami raktiniai žodžiai: *artificial sweeteners*, *natural sweeteners*, *non-nutritive sweeteners*, *sugar*, taip pat konkretūs junginių pavadinimai bei jų klasės. Buvo atrinktos 54 publikacijos, kurios atitiko šiuos atrankos kriterijus: kalba (anglų, lietuvių), patikimumas, pagrįstumas bei temos specifika. Naudoti viso teksto straipsniai, vertinti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, sisteminės ir metaanalizės, literatūros apžvalgos. Šaltiniams nagrinėti taikyta aprašomoji analizė.

REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

Medžiagų, suteikiančių saldumo pojūtį, grupavimas ir naudojimas

Medžiagos, suteikiančios saldumo pojūtį (MSSP), literatūroje ir teisės aktuose grupuojamos įvairiai. Šioje literatūros apžvalgoje jos skiriamos į dvi dideles grupes: kaloringąsias (angl. *nutritive*) medžiagas ir nekaloringąsias (angl. *non-nutritive*) medžiagas.

Kaloringosios MSSP apima angliavandenių grupę ir suteikia energijos. Jos dažniausiai skirstomos į monosacharidus, disacharidus ir poliolius. Monosacharidai ir disacharidai kartu vadinami cukrais [4].

Polioliai, dar vadinami cukraus alkoholiais arba polihidroksiliniais alkoholiais, yra MSSP grupė, pasižyminti stipriomis dehidratacijos savybėmis ir saldžiu skoniu, kurio stiprumas, palygti su sacharoze, svyruoja nuo 0,3 iki 1. Polioliai yra mažai kaloringos medžiagos, be to, pasižymi antikariesiniu, prebiotiniu, antioksidaciniu bei antibakteriniu poveikiu ir neturi įtakos gliukozės kiekiui kraujyje [5]. Polioliai naudojami kaip sacharozės ar kitų cukrų pakaitalai becukriuose produktuose, kramtomojoje gumoje, plačiai vartojami žmonių, sergančių cukriniu diabetu. Pagrindiniai poliolių atstovai – ksilitolis (E967), eritritolis (E968) ir sorbitolis (E420). Monosacharidai skirstomi į natūraliuosius cukrus, kurių gamtoje yra dideli kiekiai, ir retuosius cukrus, kurių gamtoje randama nedideli kiekiai [6]. Natūraliesiems cukrams priklauso trys gamtiniai izomerai: gliukozė, fruktozė ir galaktozė. Gliukozė – tai pirminis ląstelių energijos šaltinis. Ją gauname su maistu bei sintetiname patys kepenyse ir inkstų žievėje glikoneogenezės metu [7], ji plačiai naudojama maisto pramonėje. Medicinoje gliukozė gali būti naudojama ne tik kaip įvairių intraveninių tirpalų sudedamoji dalis, bet ir diagnostikai atlikti, pavyzdžiui, gliukozės tolerancijos lygiui nustatyti. Fruktozė yra monosacharidas, randamas vaisiuose, meduje ir kai kuriose daržovėse, kaip antai, yra kukurūzų sirupo sudedamoji dalis, ypač populiari Vakarų šalyse [8]. Galaktozė yra monosacharidas, randamas pieno produktuose ir kai kuriuose augaluose [4]. Retieji cukrūs (angl. *rare sugars*) yra priskiriami naujiesiems maisto produktams (angl. *novel food*). Naujuoju maisto produktu yra laikomas bet koks maistas, kuris nebuvo plačiai vartojamas ES iki 1997 m. gegužės 15 d. [9]. Remiantis Tarptautine retų cukrų draugija (ISRS), retiesiems cukrams gali būti priskiriami monosacharidai, tokie kaip D-aliuliozė, L-gliukozė, D-alozė, D-tagatozė, L-ribozė, oligosacharidai, kurių sudėtyje yra retų monosacharidų, pradinės medžiagos cukrų ir (arba) poliolių gamybai bei supramolekuliniai retieji cukrūs [10]. D-aliuliozė (D-psikozė) yra retasis monosacharidas ir C-3 D-fruktozės epimeras, šiuo metu tai yra vienas intensyviausiai tiriamų retųjų cukrų. Ši medžiaga pasižymi

skoniu, artimu sacharozei, ir neturi specifinio poskonio. Jos santykinis saldumas sudaro maždaug 70 proc. sacharozės, o energinė vertė itin maža – svyruoja nuo 0,2 iki 0,4 kcal/g, tai sudaro tik apie 10 proc. sacharozės teikiamos energijos kiekio [11]. D-aliuliozė gali būti randama kviečiuose, cukranendrėse (jos pėdsakų aptinkama ir melasoje), išgaunama cheminės sintezės arba fermentacijos (biosintezės) būdu. Labiau paplitęs išgavimo būdas yra fermentacija, jos metu susidaro mažiau kenksmingų šalutinių produktų ir teršalų, nei išgaunant cheminiu būdu [12, 13]. Lietuvoje D-aliuliozė vis dar neturi ES leidimo būti parduodama kaip maisto priedas, o JAV ir kitose rinkose, kur ji pripažįstama saugia, D-aliuliozė plačiai naudojama karameliniams padažams gaminti, gali būti vartojama kaip klevų sirupo pakaitalas, baltyminiuose batonėliuose, o vienas iš labiausiai paplitusių vartojimo būdų – konditerijoje, nes ji karamelizuojasi ir suteikia kepiniams rudą plutelę. Kitas naujasis maisto produktas – D-tagatozė irgi yra D-fruktozę struktūriškai primenantis monosacharidas, priskiriamas retiesiems cukrams, nes gamtoje aptinkamas nedideliais kiekiais. Ji gali būti išskirta iš vaistinių savybių turinčio medžio *Sterculia setigera* dervos bei iš *Roccella* genties kerpių. Iš maisto komponentų D-tagatozės daugiausia randama pieno produktuose ir kai kuriuose vaisiuose, pavyzdžiui, obuoliuose ir apelsinuose. Taip pat D-tagatozė gali būti gaunama ir pramoniniu fermentinės hidrolizės būdu iš laktozės. Jos energinė vertė yra 1,5 kcal/g, o santykinis saldumas (lyginant su sacharoze) yra 92 proc. D-tagatozė naudojama maisto papilduose, jogurtuose, leduose bei kituose pieno produktuose, jos saugumas yra patvirtintas tiek FDA, tiek EFSA [14]. Disacharidams priskiriama laktozė, maltozė ir sacharozė. Maltozės randama kepiniuose, kai vyksta krakmolo skilimas fermentų pagalba, taip pat galima rasti degintuose grūduose, todėl ji neretai naudojama fermentacijai. Labiausiai paplitusi tose vietovėse, kur auginami grūdai, gaminami salyklai bei alūs – Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje. Sacharozės randama vaisiuose ir daržovėse. Ji dažniausiai naudojama rafinuota – baltas rafinuotas cukrus pramoniniu būdu gaminamas iš cukrinių runkelių arba cukranendrių. Tai vienas iš plačiausiai naudojamų ir seniausiai paplitusių maisto saldinimo būdų visame pasaulyje [15]. Rudasis cukrus dažniausiai gaunamas iš baltojo (rafinuoto) cukraus, į kurį įmaišoma melasos. Melasa – tirštas, rudas sirupas, liekantis po cukranendrių arba cukrinių runkelių sulčių virimo, kai iš jų iškristalizuojamas cukrus. Melasa yra sudaryta iš vandens, cukraus likučių, mineralų, joje randamas nedidelis kiekis skaidulų. Minimaliai rafinuotas rudasis cukrus gaunamas nepilnai perdirbant cukranendrių sultis, tad jame aptinkama ir natūralios melasos pėdsakų. Rudasis cukrus pasižymi didžiausia energine verte. Palyginti su kitomis cukraus rūšimis, jame nustatoma didesnė skaidulų, baltymų, riebalų, kalcio, geležies, natrio ir chromo koncentracija. Angliavandenių kiekis jame yra santykinai mažesnis, tai siejama su pridėtinės melasos buvimu [16].

Nekaloringosios MSSP suteikia labai nedaug arba išvis nesuteikia energijos. Nors mokslinėje literatūroje vis dar vyksta diskusijos dėl šių medžiagų skirstymo (pavyzdžiui, ar retieji cukrūs turėtų būti priskiriami saldikliams), maisto pramonėje vadovaujamasi griežtu Europos Sąjungos (ES) reglamentavimu. Galima išskirti dvi pagrindines saldiklių rūšis: dirbtinius saldiklius ir natūralius saldiklius [17]. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008, saldikliai ES klasifikuojami kaip maisto priedai. Europos Sąjungoje saldikliai yra apibrėžiami kaip medžiagos, naudojamos siekiant suteikti saldų skonį maisto produktams, arba medžiagos, naudojamos saldikliuose, skirtuose pasaldinti maistą valgant (angl. *table-top sweetener products*) [18]. ES medžiaga įtraukiama į funkcinę saldiklių grupę tik tada, kai ji ne tik atitinka vieną ar daugiau iš maisto priedams keliamų bendrųjų reikalavimų, bet ir yra naudojama vienam ar keliems iš šių tikslų: a) pakeičia cukrų gaminant mažiau kalorijų turinčius maisto produktus, nesukeliančius karieso maisto produktus arba maisto produktus, į kuriuos nepridėta cukraus; b) pakeičia cukrų, kai tai leidžia pratęsti maisto produkto galiojimo terminą; c) yra naudojama gaminant specialios paskirties maisto produktus [3]. Saldikliai maisto pramonėje atsirado dar XIX amžiuje ir yra tapę įprasta daugelio maisto produktų sudedamąja dalimi [1]. Vartotojai renkasi maisto produktus, kuriuose yra saldiklių, nes nori saldaus skonio be papildomų kalorijų. Toks produktas gali būti ypač naudingas gydant nutukimą ar cukrinį diabetą [19]. Dirbtiniai saldikliai, pasižymintys itin dideliu saldumo intensyvumu, kuris yra nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių kartų didesnis nei sacharozės, gali būti vadinami intensyviaisiais saldikliais (angl. *high-intensity sweeteners*). Tai susintetinti cukrų pakaitalai, naudojami kaip alternatyva įprastam cukrui (sacharozei) [20]. Šie junginiai imituoja saldų cukraus skonį, bet neturi kalorijų ir angliavande-

nių, todėl jie yra labai populiarūs tarp pacientų, sergančių diabetu ar nutukimu, siekiant kontroliuoti gliukozės koncentraciją kraujyje ir (arba) kūno masę [17]. Jų vartojimas išpopuliarėjo per pastaruosius 40 metų. Šiuo metu jie plačiai naudojami beveik visame pasaulyje įvairiuose maisto produktuose, tokiuose kaip saldumynai, konservai, pieno produktai ir gėrimai [21]. Šeši didelio intensyvumo saldikliai yra patvirtinti JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) kaip maisto priedai. Šie nekaloringi saldikliai yra aspartamas, acesulfamas K, neotamas, sacharinas, sukralozė ir advantamas [22]. Aspartamą, kurio numeris ES yra E951, 1965 m. atrado chemikas Jamesas M. Schlatteris. Kadangi aspartamas yra 180–200 kartų saldesnis už sacharozę, tikėtasi, kad jo vartojimas padės sumažinti nutukimo rodiklius ir palengvins diabetu sergančių žmonių būklę. Pagrindinė jo paskirtis – saldinti gaiviuosius gėrimus, saldainius ir vaistus. Nors aspartamas taip pat yra kaloringas (4 kcal/g), tačiau dėl savo saldumo yra vartojamas mažesniais kiekiais nei stalo cukrus (sacharozė) [23]. Norint pasiekti tokį pat saldumo poveikį kaip vienas arbatinis šaukštelis cukraus (4 g), užtenka vos 0,02 g aspartamo. Acesulfamą K, kurio numeris ES yra E950, XX amžiaus antroje pusėje visiškai atsitiktinai atrado vokiečių mokslininkas Karlas Klausas [24]. Dabar acesulfamas K plačiai naudojamas visame pasaulyje maisto pramonėje, ypač gaiviuosiuose gėrimuose, kurie neturi kalorijų, kramtomojoje gumoje, padažuose, taip pat ir vitaminuose bei maisto papilduose. Tiek acesulfamas K, tiek aspartamas turi nemalonų kartų ir (arba) metalinį poskonį [25]. Advantamas, kurio numeris E969, yra aspartamo darinys ir saldesnis už aspartamą 116 kartų bei maždaug 37 000 kartų saldesnis už sacharozę [26]. Advantamą, sujungusi aspartamą ir vaniliną, sukūrė Japonijos kompanija „Aijnomoto“ [27]. Advantamas naudojamas pieno produktuose, nealkoholiniuose gėrimuose ir kramtomojoje gumoje, nes prailgina „kramtymo laiką“ (angl. *chewing time*) ir yra labai pigus maisto saldiklis [28]. Neotamas (E961) yra dirbtinis saldiklis, sukurtas XX amžiaus 9-ajame dešimtmetyje alkilinant aspartamą, todėl turi panašią struktūrą kaip aspartamas [2]. Jis pasižymi tirpumu vandenyje ir ypač dideliu tirpumu etilo alkoholyje [29]. Neotamas yra 6 000–10 000 kartų saldesnis už sacharozę ir 30–60 kartų saldesnis už aspartamą, neturi kartaus poskonio [30]. Neotamas buvo patvirtintas FDA 2002 metais ir yra naudojamas gaiviuosiuose gėrimuose, fermentuotuose pieno produktuose (jogurtuose) ir konditerijos gaminiuose [29, 31]. Žmogaus organizme neotamas gali būti metabolizuojamas į deesterifikuotą neotamą ir metanolį, o per 72 valandas gali būti pašalintas su šlapimu ir išmatomis [31]. Sacharinas yra pirmasis dirbtinis saldiklis, išrastas 1879 metais Baltimorės Johnso Hopkinso universiteto mokslininko Konstantino Fahlbergo, o FDA patvirtintas dar 1958 metais. Jis neturi kalorijų ir yra 200–700 kartų saldesnis už cukrų [32]. Sacharinas ir jo natrio (Na), kalio (K) ir kalcio (Ca) druskos Europos Sąjungos maisto priedų klasifikacijoje yra E954. Sacharinas turi nemalonų kartų ir (arba) metalo poskonį [33]. Jis ilgą laiką buvo laikomas vaistu, nes buvo skirtas cukriniam diabetui kontroliuoti, o jo vartojimas itin išaugo per abu Pasaulinius karus dėl cukraus normavimo ir apribojimų. Kadaise beveik uždraustas rinkoje, šiandien sacharinas yra plačiai patvirtintas maisto priedas [34]. Jį, kaip ir kitus dirbtinius saldiklius, dažniausiai galima aptikti gaiviuosiuose gėrimuose [35]. Sukralozė (E955) yra nekaloringasis dirbtinis saldiklis, maždaug 600 kartų saldesnis už sacharozę [36, 37]. Sukralozė buvo išrasta XX amžiaus antroje pusėje bendradarbiaujant Jungtinės Karalystės bendrovei „Tate&Lyle“ ir Londono universiteto Karalienės Elžbietos koledžui. 1991 m. sukralozė pirmą kartą buvo patvirtinta naudoti Kanadoje, vėliau – Australijoje (1993 m.) ir Naujojoje Zelandijoje (1996 m.). FDA patvirtino sukralozę tik 1998 metais [38]. Skirtingai nei kiti dirbtiniai saldikliai, sukralozė nekeičia savo savybių kaitinant, todėl yra tinkama naudoti kepiniuose [37].

Natūralieji saldikliai išgaunami tiesiai iš augalų. Natūraliesiems saldikliams priskiriami stevija, hudijos, agavos bei vaistinio saldmino, dar vadinamo vienuolių vaisiumi (*Luo Han Guo*, angl. *monk fruit*) ekstraktai [17]. *Stevia rebaudiana (Bertoni)* – Pietų Amerikos augalas, kilęs iš Paragvajaus, iš jo ir išgaunamos saldumo pojūtį suteikiančios medžiagos. Kitas alternatyvus steviolio glikozidų (E960) gamybos būdas yra biotechnologinis metodas, grindžiamas genetiškai modifikuotais mikroorganizmais. Tyrimai parodė, kad genetiškai modifikuotos *Escherichia coli* bakterijos gali sintetinti steviolio glikozidus, tačiau šiuo metu iš *E. coli* išgaunami saldiklių kiekiai tėra labai maži [39]. Pietų Amerikos ir kitų regionų vietiniai gyventojai jau daugelį metų vartoja steviją tradicinėje medicinoje [40]. Be to, šis natūralus saldiklis, beveik 300 kartų saldesnis už sacharozę, turi antioksidantinių, antimikrobinių, antidiabetinių (antihiperglikeminių, insulinotropinių ir gliukagonostatinių), antitrombocitinių, antikariogeni-

nių ir priešnavikinių savybių. Iš viso *Stevia* gentyje yra 230 rūšių, tačiau tik *S. rebaudiana* suteikia saldų skonį, natūralusis saldiklis išgaunamas iš jos lapų [41]. 2022 metais buvo atliktas tyrimas, kurio metu nustatytos ledų, saldintų trimis steviolio glikozidais – rebaudiozidu A, D ir M (0,09 proc.), juslinės savybės ir priimtinumas. Kaip kontrolinis mėginys buvo naudojami sacharoze (14 proc.) saldinti ledai. Ledų vartotojai (92 asmenys) įvertino bendrą skonį, saldumo ir kartumo intensyvumą bei apibūdino kiekvieno mėginio poskonius. Rebaudiozidu D ir rebaudiozidu M saldintų ledų skonio balai buvo žymiai aukštesni nei rebaudiozidu A saldintų ledų. Iš trijų glikozidų tik rebaudiozido M saldumo intensyvumas buvo panašus į sacharozės. Vartotojai rebaudiozidu D ir rebaudiozidu M saldintų ledų poskonius vertino kaip saldesnius ir malonesnius, o rebaudiozidu A saldintų ledų skonis buvo labiau dirbtinis ir cheminis. Šis tyrimas aiškiai parodė, kad rebaudiozidas D ir rebaudiozidas M yra geresnio skonio ir geriau suvokiami vartotojams nei rebaudiozidas A, kuris yra plačiausiai maisto pramonėje naudojamas glikozidas [42]. Į vaistinio saldmino (*Siraitia grosvenorii*) ekstraktą įeina natūraliesiems saldikliams priskiriami magrozidai. Mogrozidai, ypač mogrozidas V, yra žinomi dėl savo stipraus saldumo. Mogrozidas V gali būti apie 250 kartų saldesnis už sacharozę [43]. Vaistinio saldmino vaisiaus ekstraktas dažniausiai naudojamas saldintuose gaiviuosiuose gėrimuose ir specializuotuose maisto produktuose.

Cukrų ir dirbtinių saldiklių poveikis žmogaus sveikatai

Cukraus vartojimas skatina kūno masės augimą, o padidėjusi kūno masė arba nutukimas dar labiau padidina metabolinių ligų riziką. Taigi cukraus vartojimas padidina metabolinių ligų riziką tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, skatindamas masės augimą [44]. Ilgalaikis saldintų gėrimų vartojimas sveikiems suaugusiesiems mažina insulino jautrumą, sukeldamas insulino rezistenciją, dėl kurios didėja gliukozės koncentracija kraujyje [45]. Nustatyta, kad cukraus ir kukurūzų sirupo fruktozė gali sukelti riebalinę kepenų degeneraciją, stimuliuodama *de novo* lipogenezę ir blokuodama β-riebalų rūgščių oksidaciją [46]. PSO ir nutukimą, ir gliukozės koncentracijos padidėjimą kraujyje įtraukė į rizikos veiksnių grupę vystytis širdies ir kraujagyslių ligoms (pvz., širdies priepuoliams ir insultui), lėtinėms kvėpavimo takų ligoms (pvz., lėtinei obstrukcinei plaučių ligai ir astmai), diabetui ir vėžiui [47].

Dirbtiniai saldikliai reikalauja nuolatinės mokslinių tyrimų analizės. Aspartamas yra vienas populiariausių ir seniausių saldiklių, todėl apie jį jau sukaupta nemažai žinių. Tiek EFSA, tiek FDA pripažino aspartamą saugia medžiaga, jei neviršijama leistina aspartamo paros norma (angl. *Acceptable Daily Intake,* ADI), tačiau nemažai mokslinių šaltinių teigia, kad su aspartamo vartojimu yra susiję šalutiniai poveikiai, o saugumo tvirtinimas daugiausia grindžiamas su gyvūnais atliekamais tyrimais, nes duomenų iš tyrimų su žmonėmis yra nedaug [48]. Vertinant prevencinį požiūrį, nustatytos rekomendacinės leistinos paros normos visiems dirbtiniams saldikliams. Jos gali skirtis tarp skirtingų pasaulio regionų ir yra skirtos sumažinti galimą ilgalaikio vartojimo riziką. Pavyzdžiui, pagal EFSA (angl. *European Food Safety Authority*) ir JECFA (angl. *oint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives*), leistina aspartamo paros norma yra 40 mg/kg kūno masės per dieną [49]. Pagal FDA, leistina aspartamo paros norma – 50 mg/kg kūno masės per dieną [22]. EFSA nustatyta leistina acesulfamo K paros norma (ADI) 2025 metais buvo padidinta nuo 9 mg/kg kūno masės iki 15 mg/kg kūno masės, advantamo – 5 mg/kg kūno masės. 2024 metais EFSA padidino ir sacharino leistiną paros normą (ADI) nuo 5 mg/kg kūno masės iki 9 mg/kg kūno masės. Sukralozės leistina paros norma, pagal EFSA, yra 15 mg/kg kūno masės. Taip pat, remdamasis neigiamais rezultatais, gautais atliekant genų mutacijų tyrimus su bakterijomis ir žinduolių ląstelėmis, chromosomų aberacijos tyrimą *in vitro* ir mikrobranduolių tyrimą su pelėmis *in vivo*, 2007 m. EFSA maisto priedų mokslo komitetas padarė išvadą, kad neotamas nekelia susirūpinimo dėl genotoksiškumo. 2016–2022 m. buvo atlikti tyrimai pagal naujus standartus, kurie dar kartą patvirtino, kad neotamo (E961) kiekiai ir šiuo metu leidžiami bei deklaruojami neotamo vartojimo būdai yra saugūs vartoti. Neotamo leistina paros norma (ADI) 2025 m. buvo padidinta nuo 2 mg/kg (buvo įvesta 2007 m.) iki 10 mg/kg [50–52]. Vienas iš pagrindinių aspartamo metabolitų asparto rūgštis – neuromediatorius sužadinanti medžiaga, per didelis jos kiekis gali sukelti neurotoksiškumą, fenilalaninas – aminorūgštis, reikalinga baltymų sintezei ir nervų sistemos veiklai, neurotoksiška medžiaga, jei sergama fenilketonurija. Kitas aspartamo metabolitas – metanolis yra toksiška medžiaga, tačiau vartojant tik dides-

niais kiekiais [53]. Ramazzini institutas atliko aspartamu paveiktų graužikų hematolimfoidinio audinio imunohistocheminę analizę. Graužikams, paveiktiems 20 mg/kg kūno masės ir 100 mg/kg kūno masės aspartamo (šios dozės labai artimos EFSA (40 mg/kg kūno masės), JECFA (40 mg/kg kūno masės) ir FDA (50 mg/kg kūno masės) leistinoms paros normoms), statistiškai reikšmingai padidėjo visų hematolimfoidinių piktybinių navikų – limfomų ir leukemijų – dažnis. Taip pat tyrimas patvirtino, kad prenatalinis aspartamo vartojimas padidina vėžio riziką graužikų palikuonims [54]. 2006 m. EFSA įvertino ir atmetė Ramazzini instituto atliktus aspartamo tyrimų rezultatus dėl metodologinių trūkumų ir teigė, kad nėra pagrindo keisti leistinos aspartamo paros normos [55]. Taip pat, 2023 m. duomenimis, Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija bei PSO teigia, kad įrodytas aspartamo kancerogeniškumas tam tikroms gyvūnų rūšims, tačiau nėra atlikta pakankamai tyrimų, įrodančių aspartamo kancerogeniškumą žmogui [56]. EFSA 2013 metais atliko išsamų aspartamo rizikos vertinimą, patvirtino leistiną paros normą (40 mg/kg kūno masės) ir įvertino, kad aspartamas yra saugus neviršijant šios dozės, tačiau Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) 2023 metais priskyrė aspartamą 2B kancerogenų grupei, į kurią įeina galimai vėžį sukeliančios medžiagos [57]. Atliekant *in vitro* tyrimą su žmogaus neuroblastosomos ląstelėmis (SH-SY5Y) ir aspartamo 3 metabolitais (asparto rūgštimi, fenilalaninu ir metanoliu) buvo siekiama įvertinti ląstelių oksidacinį stresą ir lipidų apykaitos pokyčius. Rezultatai parodė, kad tiek aspartamas, tiek jo 3 metabolitai keičia žmogaus neuroblastosomos ląstelių sudėtį, sukelia oksidacinį stresą ir mitochondrijų struktūrų pokyčius. Žinoma, kad aspartamo metabolitai daro silpnesnį poveikį ląstelėms nei pats aspartamas – tai svarbu, nes nemetabolizuotas aspartamas sveikame organizme nepasiekia neuronų. Taip pat gauti rezultatai parodo ryškų triacilgliceridų (TAG) kiekio padidėjimą ir riebalinių lašelių susidarymą, o tai gali paskatinti neurodegeneracinių ligų vystymąsi [58]. Nuo 2009 iki 2021 m. vykusiame tyrime, apimančiame daugiau nei 100 000 dalyvių, buvo rasta sąsajų tarp aspartamo, acesulfamo K bei sukralozės vartojimo ir kardiovaskulinių ligų, miokardo infarkto, anginos bei cerebrovaskulinių ligų (insulto ir jo atmainų) išsivystymo [59]. Visi dirbtiniai saldikliai turi ir privalumų, ir trūkumų. Sukralozės, sacharino, aspartamo ir acesulfamo K privalumai yra šie: jie yra nekaloringi, veikia kaip skonio stipriklis, stimuliuoja GLP-2 (į gliukagoną panašų peptidą-2); trūkumai: padidėjęs mirtingumas, cerebrovaskulinių ligų, širdies ir kraujagyslių ligų rizika, hiperglikemija, padidėjęs DTL kiekis plazmoje su sutrikusia antioksidacine funkcija, sutrikusi fibroblastų augimo faktoriaus-21 sekrecija [60].

Natūralių saldiklių poveikis žmogaus sveikatai

Natūralūs saldikliai stevija (*Stevia rebaudiana*) ir vaistinis saldminas (*Siraitia grosvenorii*) ne tik suteikia saldumo, bet ir pasižymi įvairiomis naudingomis savybėmis, tokiomis kaip antioksidacinis, priešuždegiminis ir antidiabetinis poveikis, taip pat gali padėti kontroliuoti kraujospūdį ir kūno masę [61]. Nepaisant minimalios sisteminės stevijos (E960) absorbcijos, tyrimai rodo galimą didelę jos naudą kovojant ir su kancerogeneze bei ateroskleroze [62]. Remiantis *in vitro* gyvūnų ir žmonių tyrimais, steviolio glikozidai nėra kancerogeniški, genotoksiški ir nesukelia reprodukcinių ar vystymosi sutrikimų. JECFA nustatė leidžiamą stevijos paros dozę (ADI) – 4 mg/kg kūno svorio per parą. Abu stevijos komponentai (steviozidas ir rebaudiozidas A) metabolizuojami labai panašiai, todėl saugumui vertinti buvo taikomi vienodi duomenys [63].

APIBENDRINIMAS

Atlikta sisteminė mokslinių šaltinių analizė leidžia konstatuoti, kad MSSP vartojimas turi reikšmingą teigiamą ir (ar) neigiamą poveikį žmogaus sveikatai: ilgalaikis didelio cukrų kiekio vartojimas gali prisidėti prie kūno masės didėjimo, riebalų kaupimosi, insulino rezistentiškumo ir didesnės metabolinių ligų rizikos. Nors pagrindinės reguliavimo institucijos, tokios kaip EFSA ir FDA, pripažįsta aspartamą bei kitus dirbtinius saldiklius saugiais vartoti neviršijant nustatytos paros dozės (ADI), naujausi tyrimai rodo, kad jų vartojimas gali būti susijęs su reikšmingais žarnyno mikrobiotos pokyčiais, gliukozės homeostazės reguliacijos sutrikimais bei apetito kontrolės mechanizmų moduliacija. Nors ūmus toksinis aspartamo poveikis nėra įrodytas, 2023 m. Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) jį priskyrė B grupės kancerogenų kategorijai, o jo ilgalaikio poveikio kardiovaskulinių, cerebrovaskulinių ir neurodegeneracinių ligų rizikai tyrimai tebėra aktyviai atliekami. Dėl šių priežasčių šios sritys išlieka aktualios tolimesniems moksliniams tyrimams ir diskusijoms. Natūralieji saldikliai gali būti palankesni vartoti dėl anti-

oksidacinių, priešuždegiminių ir antidiabetinių savybių, tačiau turimi klinikiniai duomenys yra nepakankami galutinėms išvadoms dėl jų galimos naudos formuoti. Svarbu, kad įstatymai ir kiti reguliavimai, skirti mažinti pridėtinių cukrų vartojimą, gali priversti maisto pramonę keistis ir naudoti daugiau tiek dirbtinių, tiek natūralių saldiklių. Atsižvelgiant į atliktos analizės rezultatus galima teigti, kad svarbu nuolat stebėti šių medžiagų poveikį sveikatai, atlikti ilgalaikius tyrimus su žmonėmis, kad būtų tiksliau įvertintas dirbtinių ir natūralių saldiklių poveikis sveikatai. Svarbu įvertinti, kaip skirtingi saldikliai veikia skonio pojūtį, saldumo suvokimą ir poskonį, kaip žmonių pasirinkimai vartoti saldiklius gali paveikti mitybos įpročius ir kalorijų suvartojimą.

Straipsnis gautas 2026-02-08, priimtas 2026-05-07

Literatūra

1. Carocho M, Morales P, Ferreira ICFR. Sweeteners as food additives in the XXI century: A review of what is known, and what is to come. Food Chem Toxicol. 2017 Sep;107:302–17. DOI:10.1016/j.fct.2017.06.046.
2. Basson AR, Rodriguez-Palacios A, Cominelli F. Artificial Sweeteners: History and New Concepts on Inflammation. Front Nutr. 2021 Sep 24;8:746247. DOI:10.3389/fnut.2021.746247.
3. Juknevičiūtė D. Cukraus ir saldiklių (cukraus pakaitalų) naudojimo ir apmokestinimo aspektai Europos valstybėse. Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyrius. Available from: https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=63626
4. Fitch C, Keim KS. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Use of Nutritive and Nonnutritive Sweeteners. J Acad Nutr Diet. 2012 May;112(5):739–58. DOI:10.1016/j.jand.2012.03.009.
5. Wiktor A, Chadzynska M, Rybak K, Dadan M, Witrowa-Rajchert D, Nowacka M. The Influence of Polyols on the Process Kinetics and Bioactive Substance Content in Osmotic Dehydrated Organic Strawberries. Molecules. 2022 Feb 17;27(4):1376. DOI:10.3390/molecules27041376.
6. Ishii T, Senoo T, Taguchi H, Sogo K, Huy BQ, Taniguchi N, et al. Supramolecular Rare Sugar. IOP Conf Ser Mater Sci Eng. 2020 Apr 1;835(1):012002. DOI:10.1088/1757-899X/835/1/012002.
7. Hantzidiamantis PJ, Awosika AO, Lappin SL. Physiology, Glucose. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 [cited 2026 Apr 1]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545201/ PubMed PMID: 31424785.
8. Miller A, Adeli K. Dietary fructose and the metabolic syndrome: Curr Opin Gastroenterol. 2008 Mar;24(2):204–9. DOI:10.1097/MOG.0b013e3282f3f4c4.
9. EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA), Turck D, Cámara M, Bohn T, Castenmiller J, De Henauw S, et al. Safety of D-allulose as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283. EFSA J. 2025 Jun;23(6). DOI:10.2903/j.efsa.2025.9468.
10. International Society of Rare Sugars (ISRS). Definition of rare sugars [Internet]. International Society of Rare Sugars (ISRS); 2019 [cited 2026 Apr 1]. Located at: International Society of Rare Sugars (ISRS); Kagawa, Japan. Available from: https://www.isrs.kagawa-u.ac.jp/definition.html
11. Zhao Y, Duan X, Zhang J, Ding Y, Liu Q. Advances in the bioproduction of d-allulose: A comprehensive review of current status and future prospects. Food Res Int. 2025 Feb;202:115767. DOI:10.1016/j.foodres.2025.115767.
12. Xia Y, Cheng Q, Mu W, Hu X, Sun Z, Qiu Y, et al. Research Advances of d-allulose: An Overview of Physiological Functions, Enzymatic Biotransformation Technologies, and Production Processes. Foods. 2021 Sep 15;10(9):2186. DOI:10.3390/foods10092186.
13. Zhang Y, Zhou Z, Luan H, Zhang X, Liu M, Wang K, et al. Advances in the biosynthesis of D-allulose. World J Microbiol Biotechnol. 2024 Dec;40(12):375. DOI:10.1007/s11274-024-04166-w.
14. Ortiz ADC, Fideles SOM, Reis CHB, Pagani BT, Bueno LMM, Moscatel MBM, et al. D-Tagatose: A Rare Sugar with Functional Properties and Antimicrobial Potential against Oral Species. Nutrients. 2024 Jun 19;16(12):1943. DOI:10.3390/nu16121943.
15. Gerschenson LN, Rojas AM, Fissore EN. Carbohydrates. In: Nutraceutical and Functional Food Components. Elsevier; 2022; p. 49–126. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780323850520000015 DOI:10.1016/B978-0-323-85052-0.00001-5.
16. Azlan A, Khoo HE, Sajak AAB, Aizan Abdul Kadir NA, Yusof BNM, Mahmood Z, et al. Antioxidant activity, nutritional and physicochemical characteristics, and toxicity of minimally refined brown sugar and other sugars. Food Sci Nutr. 2020 Sep;8(9):5048–62. DOI:10.1002/fsn3.1803.
17. Kossiva L, Kakleas K, Christodouli F, Soldatou A, Karanasios S, Karavanaki K. Chronic Use of Artificial Sweeteners: Pros and Cons. Nutrients. 2024 Sep 19;16(18):3162. DOI:10.3390/nu16183162.
18. Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives. 1333/2008. p. Official Journal of the European Union. Available from: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj/eng
19. Chattopadhyay S, Raychaudhuri U, Chakraborty R. Artificial sweeteners – a review. J Food Sci Technol. 2014 Apr;51(4):611–21. DOI:10.1007/s13197-011-0571-1.
20. Qurrat-ul-Ain, Khan SA. Artificial sweeteners: safe or unsafe? J Pak Med Assoc. 2015;65(2):225–7.
21. Castro-Muñoz R, Correa-Delgado M, Córdova-Almeida R, Lara-Nava D, Chávez-Muñoz M, Velásquez-Chávez VF, et al. Natural sweeteners: Sources, extraction and current uses in foods and food industries. Food Chem. 2022 Feb;370:130991. DOI:10.1016/j.foodchem.2021.130991.
22. U.S. Food and Drug Administration. Aspartame and other sweeteners in food [Internet]. U.S. Food and Drug Administration. Available from: https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/aspartame-and-other-sweeteners-food
23. Czarnecka K, Pilarz A, Rogut A, Maj P, Szymańska J, Olejnik Ł, et al. Aspartame – True or False? Narrative Review of Safety Analysis

of General Use in Products. Nutrients. 2021 Jun 7;13(6):1957. DOI:10.3390/nu13061957.
24. Clauß K, Jensen H. Oxathiazinondioxide, eine neue Gruppe von Süßstoffen. Angew Chem. 1973 Nov;85(22):965–73. DOI:10.1002/ange.19730852202.
25. Riera CE, Vogel H, Simon SA, Coutre JL. Artificial sweeteners and salts producing a metallic taste sensation activate TRPV1 receptors. Am J Physiol-Regul Integr Comp Physiol. 2007 Aug;293(2):R626–34. DOI:10.1152/ajpregu.00286.2007.
26. Otabe A, Fujieda T, Masuyama T, Ubukata K, Lee C. Advantame – An overview of the toxicity data. Food Chem Toxicol. 2011 Nov;49:S2–7. DOI:10.1016/j.fct.2011.06.046.
27. Dragomir N, Grigore DM, Pogurschi EN. Beyond Sugar: A Holistic Review of Sweeteners and Their Role in Modern Nutrition. Foods. 2025 Sep 12;14(18):3182. DOI:10.3390/foods14183182.
28. International Sweeteners Association. Advantame. International Sweeteners Association. Available from: https://www.sweeteners.org/wp-content/uploads/2020/09/advantame-fact-sheet_feb17.pdf
29. World Health Organization. Neotame: Chemical and Technical Assessment (CTA) [Internet]. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). Available from: https://www.fao.org/fileadmin/templates/agns/pdf/jecfa/cta/61/Neotame.pdf
30. Nofre C. Neotame: discovery, properties, utility. Food Chem. 2000 May 15;69(3):245–57. DOI:10.1016/S0308-8146(99)00254-X.
31. Chi L, Bian X, Gao B, Tu P, Lai Y, Ru H, et al. Effects of the Artificial Sweetener Neotame on the Gut Microbiome and Fecal Metabolites in Mice. Molecules. 2018 Feb 9;23(2):367. DOI:10.3390/molecules23020367.
32. Jo JH, Kim S, Jeon TW, Jeong TC, Lee S. Investigation of the Regulatory Effects of Saccharin on Cytochrome P450s in Male ICR Mice. Toxicol Res. 2017 Jan 15;33(1):25–30. DOI:10.5487/TR.2017.33.1.025.
33. Yang Q. Gain weight by 'going diet?' Artificial sweeteners and the neurobiology of sugar cravings: Neuroscience. Yale J Biol Med. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2892765/
34. Magnuson BA, Carakostas MC, Moore NH, Poulos SP, Renwick AG. Biological fate of low-calorie sweeteners. Nutr Rev. 2016 Nov;74(11):670–89. DOI:10.1093/nutrit/nuw032
35. Zhao Y, Wang M, Zhang M, Yang X, Li Z, Vasylieva N, et al. Development of a direct competitive enzyme-linked immunosorbent assay for quantitation of sodium saccharin residue in food. J Food Sci. 2021 Aug;86(8):3720–9. DOI:10.1111/1750-3841.15767.
36. Debras C, Chazelas E, Srour B, Druesne-Pecollo N, Esseddik Y, Szabo De Edelenyi F, et al. Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study. Zheng W, editor. PLOS Med. 2022 Mar 24;19(3):e1003950. DOI:10.1371/journal.pmed.1003950.
37. AlDeeb OA, Mahgoub H, Foda NH. Sucralose. In: Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology. Elsevier; 2013; p. 423–62. DOI:10.1016/B978-0-12-407691-4.00010-1.
38. Schiffman SS, Rother KI. Sucralose, A Synthetic Organochlorine Sweetener: Overview Of Biological Issues. J Toxicol Environ Health Part B. 2013 Oct 3;16(7):399–451. DOI:10.1080/10937404.2013.842523.
39. Libik-Konieczny M, Capecka E, Tuleja M, Konieczny R. Synthesis and production of steviol glycosides: recent research trends and perspectives. Appl Microbiol Biotechnol. 2021 May;105(10):3883–900. DOI:10.1007/s00253-021-11306-x.
40. Oudbor L, Mokhtari Z, Dastghaib S, Mokarram P, Rajani HF, Barazesh M, et al. Aqueous extract of *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Bertoni abrogates death-related signaling pathways via boosting the expression profile of oxidative defense systems. J Food Biochem. 2022 Jul;46(7). DOI:10.1111/jfbc.14151.
41. Salehi B, López MD, Martínez-López S, Victoriano M, Sharifi-Rad J, Martorell M, et al. *Stevia rebaudiana* Bertoni bioactive effects: From in vivo to clinical trials towards future therapeutic approaches. Phytother Res. 2019 Nov;33(11):2904–17. DOI:10.1002/ptr.6478.
42. Muenprasitivej N, Tao R, Nardone SJ, Cho S. The Effect of Steviol Glycosides on Sensory Properties and Acceptability of Ice Cream. Foods. 2022 Jun 14;11(12):1745. DOI:10.3390/foods11121745.
43. Correction for Itkin et al. The biosynthetic pathway of the nonsugar, high-intensity sweetener mogroside V from *Siraitia grosvenorii*. Proc Natl Acad Sci. 2018 Apr 17;115(16). DOI:10.1073/pnas.1804875115.
44. Stanhope KL, Schwarz JM, Havel PJ. Adverse metabolic effects of dietary fructose: results from the recent epidemiological, clinical, and mechanistic studies. Curr Opin Lipidol. 2013 Jun;24(3):198–206. DOI:10.1097/MOL.0b013e3283613bca.
45. Yoshida M, McKeown NM, Rogers G, Meigs JB, Saltzman E, D'Agostino R, et al. Surrogate Markers of Insulin Resistance Are Associated with Consumption of Sugar-Sweetened Drinks and Fruit Juice in Middle and Older-Aged Adults. J Nutr. 2007 Sep;137(9):2121–7. DOI:10.1093/jn/137.9.2121.
46. Jensen T, Abdelmalek MF, Sullivan S, Nadeau KJ, Green M, Roncal C, et al. Fructose and sugar: A major mediator of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2018 May;68(5):1063–75. DOI:10.1016/j.jhep.2018.01.019.
47. World Health Organization. Noncommunicable diseases. World Health Organization. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
48. Corrigendum for „Revisiting the safety of aspartame" by Arbind Kumar Choudhary and Etheresia Pretorius Nutrition Reviews 2017;75:718–730. Nutr Rev. 2018 Apr;76(4):301. DOI:10.1093/nutrit/nuy041.
49. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Available from: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/cb789bad-1ee1-410e-bde0-27584c1225ff/content
50. EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF), Younes M, Aquilina G, Engel K, Fowler P, Frutos Fernandez MJ, et al. Safety of use of Monk fruit extract as a food additive in different food categories. EFSA J. 2019 Dec;17(12). DOI:10.2903/j.efsa.2019.5921.
51. World Health Organization. JECFA chemical: Advantame. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA); n.d.. Available from: https://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/Home/Chemical/6181
52. Commission Regulation (EU) No 497/2014 of 14 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of Advantame as a sweetener. Official Journal of the European Union. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0497
53. Doueihy NE, Ghaleb J, Kfoury K, Khouzami KK, Nassif N, Attieh P, et

al. Aspartame and Human Health: A Mini-Review of Carcinogenic and Systemic Effects. J Xenobiotics. 2025 Jul 7;15(4):114. DOI:10.3390/jox15040114.
54. Landrigan PJ, Straif K. Aspartame and cancer – new evidence for causation. Environ Health. 2021 Dec;20(1):42. DOI:10.1186/s12940-021-00725-y.
55. EFSA assesses new aspartame study and reconfirms its safety. European Food Safety Authority (EFSA). Available from: https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/060504
56. Aspartame hazard and risk assessment results released. World Health Organization (WHO). Available from: https://www.who.int/news/item/14-07-2023-aspartame-hazard-and-risk-assessment-results-released
57. Stiepan, D. Mayo Clinic Expert Weighs in on WHO Labeling Aspartame Sweetener as Low, but Possible, Cancer Risk [Internet]. Mayo Clinic News Network. Available from: https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-expert-weighs-in-on-who-label
58. Griebsch LV, Theiss EL, Janitschke D, Erhardt VKJ, Erhardt T, Haas EC, et al. Aspartame and Its Metabolites Cause Oxidative Stress and Mitochondrial and Lipid Alterations in SH-SY5Y Cells. Nutrients. 2023 Mar 18;15(6):1467. DOI:10.3390/nu15061467.
59. Debras C, Chazelas E, Sellem L, Porcher R, Druesne-Pecollo N, Esseddik Y, et al. Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort. BMJ. 2022 Sep 7;378:e071204. DOI:10.1136/bmj-2022-071204.
60. Iizuka K. Is the Use of Artificial Sweeteners Beneficial for Patients with Diabetes Mellitus? The Advantages and Disadvantages of Artificial Sweeteners. Nutrients. 2022 Oct 22;14(21):4446. DOI:10.3390/nu14214446.
61. Peteliuk V, Rybchuk L, Bayliak M, Storey KB, Lushchak O. Natural sweetener Stevia rebaudiana: functionalities, health benefits and potential risks. EXCLI J 20Doc1412 ISSN 1611-2156. 2021. DOI:10.17179/EXCLI2021-4211.
62. Rojas E, Bermúdez V, Motlaghzadeh Y, Mathew J, Fidilio E, Faria J, et al. Stevia rebaudiana Bertoni and Its Effects in Human Disease: Emphasizing Its Role in Inflammation, Atherosclerosis and Metabolic Syndrome. Curr Nutr Rep. 2018 Sep;7(3):161–70. DOI:10.1007/s13668-018-0228-z.
63. EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS). Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive [Internet]. European Food Safety Authority (EFSA); 2010. Located at: European Food Safety Authority (EFSA); Parma. Available from: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1537

SWEETENERS: CONSUMPTION TRENDS AND IMPACT ON HUMAN HEALTH. LITERATURE REVIEW

Justas Paršeliūnas[1], Laura Nedzinskienė[2], Ugnė Utkutė[1], Renata Giliun[3]
[1]Faculty of Medicine, Vilnius University
[2]Department of Anatomy, Histology and Anthropology, Faculty of Medicine, Vilnius University
[3]Department of Obstetric and Nursing, Faculty of Medicine, Vilnius University

SUMMARY

The aim. To review the prevalence of sweetener consumption, its trends, and its impact on human health.

Material and methods. Articles published between 2000 and 2025 and indexed in the *„PubMed“*, *„ScienceDirect“*, *„SpringerLink“*, and *„Google Scholar“* databases were analyzed. The study also used reports from international institutions such as EFSA, WHO, FAO/JECFA, U.S. FDA and for the national context, documents from the Research Unit of the Seimas of the Republic of Lithuania were used for the analysis. 63 publications were selected based on the inclusion criteria: language (English, Lithuanian), reliability, validity, and thematic relevance. Full-text articles were analyzed, including quantitative and qualitative studies, systematic reviews, meta-analyses, and literature reviews. Descriptive analysis was applied to examine the sources.

Results and conclusions. The consumption of substances that induce a sensation of sweetness has a significant positive and/or negative impact on human health: prolonged high sugar intake, especially of sucrose and fructose, can contribute to weight gain, fat accumulation, insulin resistance, and an increased risk of metabolic diseases. The consumption of aspartame and other artificial sweeteners, despite their low caloric content and recognition by major regulatory agencies (EFSA and FDA), may be associated with significant changes in gut microbiota composition, disturbances in glucose homeostasis regulation, and modulation of appetite control mechanisms. Their long-term associations with carcinogenicity (classified as Group B carcinogens), as well as the risk of cardiovascular, cerebrovascular, and neurodegenerative diseases, remain relevant topics for further scientific research and discussion. Natural sweeteners may be more favorable for consumption due to their antioxidant, anti-inflammatory, and antidiabetic properties; however, existing clinical data are insufficient to form definitive conclusions regarding their safety and potential benefits.

Key words: „artificial sweeteners“; „natural sweeteners“; „non-nutritive sweeteners“; „table sugar“, „sugar“.

Received 8 February 2026, accepted 7 May 2026

Correspondence to Laura Nedzinskienė
Vilnius University Faculty of Medicine
M. K. Čiurlionio str. 21/27
LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: laura.nedzinskiene@mf.vu.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-12

JUOKO IR HUMORO TERAPIJOS REIKŠMĖ SVEIKATINIME IR KLINIKINĖJE PRAKTIKOJE

***Titas Zabulionis*[1]*, Sigita Lesinskienė*[2]**
[1]*Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas*
[2]*Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinika*

SANTRAUKA

Tikslas – apžvelgti literatūrą apie juoko rūšis, fiziologiją, humoro taikymo galimybes ir raidą bei poveikį įvairaus amžiaus žmonių fizinei bei psichinei sveikatai.

Metodika. Šiame straipsnyje atlikta literatūros apžvalga, daugiausia remiantis *PubMed* duomenų baze bei papildomai naudojant EBSCO duomenų bazę. Literatūros paieškai naudoti reikšminiai žodžiai: *laughter therapy, humor, physiology of laughter, medical clowning, humor development, health promotion*. Į apžvalgą įtraukti 2006–2025 m. publikuoti moksliniai straipsniai anglų kalba, iš kurių dauguma publikuoti per pastaruosius 10 metų, taip pat įtraukti keli teoriškai reikšmingi ankstesni šaltiniai.

Rezultatai. Literatūros duomenimis, juokas gali būti skirstomas į kelias rūšis: spontanišką, simuliuotą, stimuliuotą, indukuotą ir patologinį. Juoko atsiradimas siejamas su koordinuotu įvairių smegenų struktūrų darbu, o juokiantis aktyvinamos neuroendokrininės reakcijos, susijusios su streso mažėjimu ir geresne emocine savijauta. Humoro supratimas formuojasi palaipsniui vaikystėje ir gali būti skirstomas į kelis raidos etapus. Tyrimai rodo, kad juokas ir humoro intervencijos gali mažinti nerimą, stresą bei skausmą, gerinti emocinę būklę ir stiprinti socialinius ryšius.

Išvados. Juokas aktyvina endokrininę ir nervų sistemas, skatina neuromediatorių bei hormonų išsiskyrimą ir gali mažinti stresą bei skausmo pojūtį, todėl gali būti taikomas kaip papildoma neinvazinė terapinė priemonė. Jis taip pat teigiamai veikia psichologinę būklę, gerina emocinę savijautą ir stiprina socialinius ryšius. Juokas turi skirtingas formas, kurias svarbu atskirti klinikiniame kontekste, o humoro supratimas formuojasi vaikystėje ir išlieka individualus visą gyvenimą.

Reikšminiai žodžiai: juokas, juoko rūšys, humoro raida, juoko fiziologinis poveikis.

ĮVADAS

Šiuolaikiniame pasaulyje dėl spartėjančio gyvenimo tempo ir didėjančio streso vis dažniau pastebima blogėjanti žmonių psichinė ir fizinė sveikata. Sveikatai gerinti vis dažniau taikomos humoro intervencijos, tokios kaip medicininiai klounai ir juoko terapija [1]. Humoras apibrėžiamas kaip psichologinis reiškinys, kuris yra susijęs su gebėjimu suvokti absurdiškumą arba nesuderinamumą įvairiose situacijose, įvykiuose ar idėjose [2].

Juokas gali būti suprantamas ne tik kaip fiziologinė ar emocinė reakcija, bet ir kaip socialinis reiškinys, kurio reikšmė priklauso nuo kultūrinio ir istorinio konteksto. N. Klumbytės monografijoje „Autoritarinis juokas“ pabrėžiama, kad humoras sovietmečio Lietuvoje galėjo būti naudojamas tiek visuomenės nuomonei formuoti, tiek ideologinei kontrolei palaikyti, tačiau kartu galėjo tapti ir netiesiogine pasipriešinimo forma. Autoritariniuose režimuose juokas ir satyra galėjo atspindėti oficialią politinę kryptį, tačiau skaitytojai juos galėjo interpretuoti ir kaip režimo kritiką [3]. Todėl juokas nėra vien tik pozityvi emocinė reakcija – jo poveikis ir reikšmė priklauso nuo situacijos, santykių tarp žmonių ir platesnio socialinio konteksto.

Klinikinėje praktikoje su humoru susijusios intervencijos gali apimti juoko terapiją, humoro terapiją, juoko jogą ir

Adresas susirašinėti: Sigita Lesinskienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
M. K. Čiurlionio g. 21/27, 03101 Vilnius
El. p. sigita.lesinskiene@mf.vu.lt

medicininę klounadą. Šios intervencijos skiriasi taikymo būdu: vienos remiasi aktyviu paciento dalyvavimu, pavyzdžiui, kvėpavimo pratimais ar dirbtinai sukeltu juoku, kitos – juoką sukeliančiomis priemonėmis, pavyzdžiui, juokingais vaizdo įrašais arba žaidybinėmis veiklomis [1, 4, 5].

Juoko terapija gali būti taikoma kaip papildoma terapinė priemonė, nes ji yra neinvazinė, nemedikamentinė, todėl nekyla pavojus, kad didės patogenų atsparumas vaistams, be to, šiai veiklai nereikia brangios medicininės įrangos [1, 6].

Juoko terapija gali apimti įvairias juoką skatinančias veiklas, pavyzdžiui, nuoširdų juokimąsi ar juokingų filmų žiūrėjimą. Šios veiklos gali padėti atsipalaiduoti, mažinti patiriamą stresą ir skausmą [4].

Tyrimų duomenys rodo, kad juoko terapija padeda visų amžiaus grupių žmonėms. Juoko terapijoje dalyvavusiems vyresnio amžiaus asmenims sumažėjo depresijos simptomai ir vienišumo jausmas [7].

Vaikams ir paaugliams, be juoko terapijos, ligoninėse dar pasitelkiami medicininiai klounai. Tyrimais pastebėta, kad vaikai ir paaugliai patirdavo mažiau baimės ir buvo labiau linkę bendrauti su gydytojais, jei jiems atliekamų procedūrų metu dalyvaudavo klounai [5].

Juoko taikymo terapiniams tikslams įvertinti skirtų mokslinių tyrimų atlikta mažai. Šioje apžvalgoje siekiama apžvelgti literatūrą apie juoko rūšis, jo fiziologiją bei poveikį fizinei bei psichinei sveikatai, taip pat išnagrinėti humoro taikymo galimybes klinikiniame kontekste ir humoro ypatumus skirtingais amžiaus tarpsniais, daugiau dėmesio skiriant vaikams.

MEDŽIAGA IR METODAI

Šiame straipsnyje atlikta literatūros apžvalga, daugiausia naudojant *PubMed* duomenų bazę, taip pat papildomai naudota EBSCO duomenų bazė. Ieškant literatūros naudoti šie reikšminiai žodžiai: *laughter therapy, humor, physiology of laughter, medical clowning, humor development, health promotion*. Į apžvalgą įtraukti moksliniai straipsniai anglų kalba, publikuoti 2006–2025 metais. Įvertinti ir lietuvių kalba publikuoti straipsniai, tačiau jų rasta labai mažai ir tik apžvalginio pobūdžio. Originalių tyrimų šia tema, atliktų Lietuvoje, nenustatyta. Dauguma analizuotų straipsnių buvo publikuoti per pastaruosius 10 metų, tačiau įtraukti ir keli senesni šaltiniai, kurie gali būti laikomi aktualiais dėl jų teorinės reikšmės nagrinėjamai temai.

REZULTATAI

Juoko rūšys

Juokas gali būti skirstomas į penkias kategorijas (1 lentelė). Svarbu ne tik suprasti, dėl ko kyla tam tikros juoko rūšys, bet ir gebėti jas atskirti.

Spontaniškas juokas yra susijęs su teigiamomis emocijomis, tokiomis kaip džiaugsmas, laimė ir pasitenkinimas. Kai žmogus spontaniškai juokiasi, jo raumenys aplink akis susitraukinėja. Simuliuotą juoką žmogus sukelia sau pats, o ne teigiamos emocijos ar kiti išoriniai dirgikliai.

Stimuliuotas juokas pasireiškia tada, kai žmogus reaguoja į tam tikrą fizinį dirgiklį, pavyzdžiui, kutenimą, arba kai asmeniui sukyla tam tikras refleksas, pavyzdžiui, prispaudus alkūninį nervą.

Indukuotą juoką sukelia tam tikros cheminės medžiagos, tokios kaip azoto suboksidas, kanapės, amfetaminai, lizerginės rūgšties dietilamidas (LSD). Indukuotą juoką galima atpažinti pagal neurocheminius pokyčius organizme.

Patologinis juokas atsiranda tada, kai pažeidžiama žmogaus nervinė sistema. Dėl to šio juoko dažniausiai negalima valdyti. Patologinis juokas nėra valingas ir gali neatitikti asmens emocinės būsenos. Be to, jis gali būti neurologinių sutrikimų požymis [1, 6].

1 lentelė. Juoko rūšys ir jas sukeliantys veiksniai

Juoko rūšys	Sukeliantys veiksniai
Spontaniškas juokas	Sukeliamas teigiamų emocijų ir išorinių stimulų; nepriklauso nuo asmens valios
Simuliuotas juokas	Sukeliamas sąmoningai, paties asmens valia
Stimuliuotas juokas	Sukeliamas fizinio kontakto ar reflekso
Indukuotas juokas	Sukeliamas cheminių medžiagų
Patologinis juokas	Sukeliamas neurologinių pažeidimų

Šaltinis: adaptuota pagal [6].

Patologinis juokas

Juokui sukelti reikalingas koordinuotas įvairių smegenų struktūrų darbas, todėl išoriškai labai sunku atskirti normalų juoką nuo patologinio. Skirtumai tarp šių juoko formų dažniausiai susiję su neurologiniais pakitimais, tačiau tam tikrus požymius galima atskirti vykdant klinikinį stebėjimą, netaikant sudėtingų diagnostinių priemonių (2 lentelė) [8, 9].

Patologinis juokas dažniausiai pasireiškia kaip pseudobulbarinio afekto (PBA) dalis. Šis neurologinis sutrikimas pasižymi situacijai nebūdingu ir nekontroliuojamu juoku ar verkimu. PBA dažniausiai siejamas su neurologinėmis ligomis, tokiomis kaip Parkinsono liga, Alzheimerio liga, išsėtinė sklerozė, amiotrofinė lateralinė sklerozė, taip pat su sudėtingais galvos smegenų pažeidimais ar insultu [10, 11, 12].

Atliekant tyrimus pastebėta lyčių skirtumų tarp amiotrofine lateraline skleroze sergančių asmenų. Nustatyta, kad 64,7 proc. moterų patirdavo nevaldomus verkimo epizodus, o 64,4 proc. vyrų – nekontroliuojamo juoko epizodus [9].

Taip pat tyrimuose aprašomas prodrominis patologinis juokas, kurio metu nekontroliuojamo juoko epizodai patiriami prieš sudėtingą neurologinį sutrikimą, dažniausiai insultą. Dėl šios priežasties klinikinėje praktikoje svarbu gebėti skirti patologinį juoką nuo normalus juoko [12, 13].

Juoko fiziologija

Žmogaus juoko koordinacijoje dalyvauja smegenų kamieno tinklinis darinys, vidurinių smegenų dangtyje esanti centrinė pilkoji medžiaga ir galinių smegenų sala. Šios sritys gauna signalus iš smilkininės bei kaktinės žievės ir limbinės sistemos [14, 15].

Juokiantis aktyvuojamas pagumburys, todėl išsiskiria daugiau endorfinų, kurie gali sumažinti skausmo pojūtį ir pagerinti emocinę būklę [1, 16]. Juokdamasis žmogus suaktyvina pagumburio–hipofizės–antinkščių (HPA) ašį, dėl to sumažėja streso hormonų kortizolio ir katecholaminų koncentracija organizme [1, 17, 18]. Taip pat nustatyta, kad juoko metu išsiskiria didesnis kiekis dopamino ir serotonino, kurie mažina depresijos simptomus, bei padidėja oksitocino kiekis, kuris mažina žmogaus patiriamą stresą [7, 17].

Juokas teigiamai veikia ir imuninę sistemą, stiprindamas organizmo aktyvųjį imunitetą. Tyrimų metu pastebėta, kad juokiantis padidėja antikūnų gamyba ir suaktyvėja natūralūs kileriai limfocitai (angl. *natural killer*, NK). Taip pat padidėja imunoglobulinų A, G, M, kurie stiprina žmogaus imuninį atsaką į patogenus, koncentracija [1, 18].

Juokas taip pat veikia autonominę nervų sistemą, padėdamas sumažinti kraujo spaudimą ir širdies ritmą, prisideda prie širdies ir kraujagyslių apsaugos bei gali padėti sumažinti miokardo infarkto riziką [1, 7]. Be to, juokas gali pagerinti kraujagyslių funkcijas, todėl daugiau deguonies prisotinto kraujo gali pasiekti smegenis ir širdį, o tai pagerina šių organų veiklą [19].

Humoro ypatumai pagal žmonių amžiaus grupes

Kaip ir vaiko brendimas, taip ir humoro supratimas vystosi palaipsniui ir gali būti skirstomas į atskirus raidos etapus. Dažniausiai išskiriamos 5 humoro raidos stadijos (3 lentelė) [20, 21].

Juokas atsiranda anksčiau negu humoro supratimas, kuris susijęs su gebėjimu kurti ir suvokti kitų juokus. Juokas pasireiškia tada, kai naujagimis geba palaikyti akių kontaktą bei šypsotis. Pirmąkart vaikas dažniausiai nusijuokia būdamas 4–5 mėnesių. Humoras atsiranda tada, kai vaikas pradeda reaguoti į kitų žmonių elgesį [2].

Pirmojoje stadijoje vaikų juokas susijęs su prieraišumu vienam iš tėvų ar globėjų – vaikas juokiasi iš netikėto ar

2 lentelė. Normalaus juoko ir patologinio juoko skirtumai

Normalus juokas	Patologinis juokas
Paprastai valdomas	Nevaldomas
Trumpalaikis	Ilgalaikis
Kartais nuspėjamas	Dažnai nenuspėjamas
Dažnai išprovokuojamas	Dažnai neišprovokuojamas
Atitinka situacijos kontekstą	Neatitinka situacijos konteksto
Neperdėtas	Dažnai būna perdėtas

neįprasto globėjų elgesio [20].

Antrojoje stadijoje atsiranda pirmosios humoro apraiškos, nes tada formuojasi vaiko vaizduotė [2]. Vaikas pradeda įvairiais būdais manipuliuoti jam pažįstamais daiktais ne pagal jų paskirtį [2, 20, 22]. Šioje stadijoje, vaikui esant maždaug 20 mėnesių amžiaus, pradeda ryškėti individualūs humoro skirtumai [2].

Trečiojoje stadijoje, maždaug nuo 2 metų, vaikai pradeda suprasti paprastą verbalinį humorą bei geba atpažinti apsimetinėjimą. Tai rodo vaiko aukštesnį kognityvinį funkcionavimą, nes jis geba abstrakčiai mąstyti ir pasitelkti ankstesnę patirtį bei atmintį apie jau žinomus dalykus, kad suprastų humorą [2, 22].

Ketvirtojoje stadijoje vaikams reikalingas labiau išreikštas vizualinis ir absurdiškas humoras, nes jie jau geriau pažįsta juos supantį pasaulį. Šiame amžiuje humorą dažniausiai sudaro įvairūs vizualiniai neatitikimai. Vaikai vis dar sunkiai supranta humorą, paremtą loginiais neatitikimais [2, 22], tačiau geba suprasti ne tik vizualinį humorą, bet gali bandyti kurti savo humorą, manipuliuodami įvairiais garsais, arba kurti naujas beprasmes sąvokas, kurios jiems pasirodo juokingos. Juoką gali sukelti ir neteisingas žmogaus lyties įvardijimas [20]. Šiame amžiuje vaikai humorą gali pradėti naudoti kaip būdą patraukti į save aplinkinių dėmesį, taip pat pastebėta, kad vaikai tris kartus labiau linkę juokauti tarpusavyje negu su suaugusiaisiais [2].

Penktojoje stadijoje, apie 6 gyvenimo metus, vaikai po truputį pradeda suprasti ironiją. Iš pradžių jie geriausiai supranta leksines dviprasmybės, kai vienas žodis gali turėti kelias reikšmes. Vėliau su amžiumi supranta vis daugiau ir apie 10–11 metus jau supranta idiomines dviprasmybes, kai žodžių junginys turi bendrą perkeltinę reikšmę, taip pat geba atpažinti perdėtą ironiją arba hiperbolizuotus teiginius [2, 21, 22].

Vaikų humoro supratimo tarp lyčių skirtumai pastebimi apie 6–8 metus. Pastebėta, kad berniukai dažniau inicijuoja humoristines situacijas ir palankiau vertina įvairias humoro formas negu mergaitės. Taip pat nustatyta, kad tos pačios lyties vaikai jaučia mažesnį socialinį atstumą tarpusavyje, todėl yra linkę labiau juokauti su tos pačios lyties bendraamžiais negu su priešingos lyties asmenimis [2].

Paauglystėje humoro pasirinkimas glaudžiai siejasi su psichosocialine savijauta. Geresnė savivertė ir emocinė būklė susijusi su labiau teigiamų humoro formų vartojimu, o depresyvios nuotaikos ir žemesnė savivertė susijusi su dažnesniu save menkinančio humoro naudojimu [23]. Be to, humoras glaudžiai siejasi su bendraamžių grupių dinamika. Draugų grupėse dažnai juokaujama panašiomis temomis, atspindinčiomis grupės normas. Nors dalis paauglių naudoja žiauresnį, pavyzdžiui, rasinį humorą, kiti paaugliai į tai nereaguoja arba prisitaiko prie situacijos dėl baimės patirti atskirtį, o ne dėl asmeninio pritarimo [24].

Suaugusiems žmonėms humoras išlieka individualus ir dažniausiai nebėra siejamas su aiškiomis raidos stadijomis, kaip vaikystėje. Šiame amžiuje humoras dažniau naudojamas kaip streso įveikos, emocinės savireguliacijos priemonė. Tyrimai rodo, kad juoko terapija ar trumpi humoristiniai stimulai suaugusiesiems gali mažinti neigiamas emocijas, tokias kaip nerimas, liūdesys ar pyktis, didinti džiaugsmą, taip pat gerinti dėmesio koncentraciją [25, 26].

Senyvo amžiaus asmenims humoras gali mažinti vienišumo ir depresijos pojūčius, stresą bei gerinti emocinę būklę, taip pat gali būti siejamas su nuotaikos gerėjimu, geresne miego kokybe ir bendra gyvenimo kokybe [27, 28].

3 lentelė. Humoro raidos stadijos ir kas sukelia juoką*

Stadija	Amžius	Dėl ko juokiamasi
0 stadija	Nuo 0 iki 6 mėnesių	Būdingas juokas be humoro
1 stadija	Nuo 6 iki 12–15 mėnesių	Juokas, nukreiptas į prieraišumo figūrą
2 stadija	Nuo 12–15 mėnesių iki 3–5 metų	Netikėti veiksmai su objektais
3 stadija	Nuo 2 iki 3–4 metų	Netinkamas objektų ar veiksmų įvardijimas
4 stadija	Nuo 3 iki 5 metų	Sąvokų neatitikimais paremtas humoras
Pereinamasis laikotarpis	Nuo 5 iki 6–7 metų	
5 stadija	Nuo 6–7 iki 10–11 metų	Mįslės ir juokeliai (dviprasmiškumas)

* Šaltinis: adaptuota pagal [21].

Juoko poveikis fizinei ir psichinei sveikatai

Juokas medicinoje vis dažniau naudojamas kaip terapinė priemonė. Analizuotuose šaltiniuose dažniausiai vertinami psichologiniai rodikliai, tokie kaip nerimas, stresas, nuotaika ir depresijos simptomai, o fiziniai rodikliai dažniau apima skausmą, miego kokybę ar bendrą savijautą [1, 5, 17, 29, 30].

CHIME – tai žmogaus psichikos sveikatos atsigavimo modelis, apimantis penkias pagrindines dimensijas: ryšius (*connectedness*), viltį (*hope*), tapatybę (*identity*), prasmę ir tikslą (*meaning and purpose*) bei įgalinimą (*empowerment*). Humoro intervencijos gali būti siejamos su teigiamais pokyčiais kai kuriais šio modelio psichikos sveikatos atsigavimo aspektais, pavyzdžiui, socialinių ryšių, vilties, tapatybės ir įgalinimo, tačiau įrodymų, kad humoro intervencijos veiktų CHIME modelio „prasmės ir tikslo“ komponentą, kol kas trūksta [31].

Be to, juokas gali sumažinti įvairius neigiamus psichologinius ir fizinius simptomus, tokius kaip nerimas, stresas, įtampa, depresija, pyktis, taip pat gerinti nuotaiką, bendrą savijautą, padidinti žmogaus kūrybingumą ir pagerinti atmintį [1, 32]. Humoras gali netiesiogiai padėti mokymosi procese, nes humoras, susietas su mokomąja medžiaga, gali pailginti žmogaus koncentracijos trukmę ir dėl to asmuo geba geriau įsisavinti didesnį kiekį mokymosi medžiagos [18].

Juokas taip pat gali prisidėti prie bendros fizinės savijautos gerinimo. Tyrimais įrodyta, kad juokas skatina energijos kiekio padidėjimą žmogaus organizme bei pagerina miego kokybę [1, 32, 33]. Be to, humoras sustiprina socialinius ryšius tarp individų ir skatina tarpusavio bendravimą, taip pagerindamas žmogaus psichologinę būseną [16, 32]. Didelio masto tyrimas parodė, kad geresnė vyresnio amžiaus žmonių regėjimo būklė siejama su dažnesniu juoku ir didesniu juoką sukeliančių situacijų skaičiumi, o prastesnė regėjimo būklė siejama su mažesniu juoko dažniu [34].

Humoro taikymas

Humoro suvokimas yra individualus, jis priklauso nuo asmens amžiaus, lyties, charakterio, todėl taikant humorą svarbu atsižvelgti į kiekvieno asmens individualumą. Taip pat humoro priimtinumas priklauso nuo situacijos ir aplinkos, todėl ne visose situacijose humoras tinkamas ar vienodai priimtinas [35, 36].

Tačiau ne visiems pacientams galima taikyti vienodas humoro intervencijas. Pavyzdžiui, asmenims, turintiems kulofobiją (klounų baimę), klounų intervencija gali sukelti baimės ir nerimo jausmą, todėl prastėtų gydymo efektyvumas [37].

Klinikiniame kontekste humoras gali būti taikomas įvairiais būdais – kaip priemonė sumažinti pacientų patiriamą įtampą ar nerimą, taip pat kaip būdas gerinti ryšį tarp medicinos personalo ir paciento. Dėl šių savybių humoras gali būti taikomas ne tik vaikams, bet ir vidutinio bei vyresnio amžiaus žmonėms [36]. Humoro formos gali būti įvairios – nuo lengvų pokalbių elementų iki struktūruotų intervencijų, tokių kaip medicininiai klounai ar terapinės veiklos [38].

Humoro intervencijos gali būti taikomos keliomis formomis: kaip humoro terapija, medicininiai klounai ir juoko terapija. Humoro terapija dažniausiai apima mažesnio įsitraukimo reikalaujančius metodus, tokius kaip komiškų vaizdo įrašų, filmų žiūrėjimas ar humoristinių tekstų skaitymas, siekiant sukelti teigiamas emocijas. Medicininiai klounai dažniausiai taikomi vaikams gydymo įstaigose, kur klounai naudoja žaidimus, improvizacijas, magiją, muziką ir pasakojimus. Šios veiklos padeda sumažinti baimę ir stresą medicininių procedūrų metu. Juoko terapija ir juoko joga apima aktyvų dalyvavimą – kvėpavimo pratimus, dirbtinį ar spontanišką juoką, fizinį aktyvumą bei grupines veiklas, kurios skatina emocinį atsipalaidavimą [35, 36].

Taikant humorą svarbu išlaikyti profesionalumo ribas ir vengti situacijų, kai humoras gali būti netinkamai suprastas. Kadangi pacientai dažnai būna emociškai jautresni, humorą gali suprasti dviprasmiškai ir patirti nepageidaujamą reakciją [5, 39]. Taip pat svarbu atsižvelgti į gydytojo bei paciento santykį ir vengti tokių humoro formų, kurios galėtų sustiprinti socialinį atstumą [39].

REZULTATŲ APTARIMAS

Šios literatūros apžvalgos rezultatai rodo, kad juokas nėra vienareikšmis reiškinys – jis gali pasireikšti dėl skirtingų priežasčių ir būti skirstomas pagal jį sukeliančius veiksnius [1, 6]. Klinikiniame kontekste svarbu atskirti skirtingas paciento juoko formas, nes ne visi juoko epizodai yra susiję su teigiamomis emocijomis. Kai kuriais atvejais nevaldomas ar situacijos neatitinkantis juokas gali būti susijęs su neurologiniais pakitimais [8, 9].

Literatūroje pabrėžiama, kad atskirti normalų juoką nuo

patologinio gali būti sudėtinga, nes abu procesai remiasi panašiais neurofiziologiniais mechanizmais. Vis dėlto patologinis juokas dažniausiai pasižymi nevaldomumu, situacijos neatitikimu ir gali būti siejamas su įvairiais neurologiniais pažeidimais. Dėl šios priežasties patologinis juokas klinikinėje praktikoje gali būti vertinamas kaip papildomas diagnostinis požymis, tačiau jis neturėtų būti laikomas vieninteliu ligos įrodymu. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai toks juokas atsiranda staiga arba pasireiškia kartu su kitais neurologiniais simptomais.

Humoras yra labai individualus reiškinys, kurį kiekvienas žmogus interpretuoja skirtingai. Humoro supratimas priklauso ir nuo asmens amžiaus, ypač vaikystėje. Literatūroje humoro raida dažnai išskiriama į penkias stadijas, kurių metu vaikų gebėjimas suprasti humorą didėja. Šio proceso metu vaikai pereina nuo paprasto juoko dėl netikėtų objektų ar veiksmų iki gebėjimo suprasti sudėtingesnes humoro formas, tokias kaip mįslės, dviprasmybės ir ironija. Todėl vaikams taikomos humoro intervencijos turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į jų amžių ir kognityvinės raidos etapą [20, 21].

Paauglystėje humoras tampa susijęs ne tik su individualiu humoro supratimu, bet ir su bendraamžių grupės normomis, saviverte bei psichosocialine savijauta [23, 24]. Dėl to šiame amžiaus tarpsnyje humoras gali veikti ir kaip teigiama emocijų reguliavimo priemonė, ir kaip socialinio prisitaikymo būdas. Suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus asmenims humoras dažniau siejamas su streso įveika, emocinės būklės gerėjimu, vienišumo ir depresijos simptomų mažėjimu. Tai rodo, kad humoro poveikis gali skirtis priklausomai nuo amžiaus grupės ir klinikinio konteksto [25–28].

Juokas pasižymi teigiamu fiziologiniu poveikiu organizmui, nes veikia įvairias organizmo sistemas. Vienas svarbiausių juoko veikiamų mechanizmų yra pagumburio–hipofizės–antinkščių (HPA) ašis, kuri padeda reguliuoti stresą, veikdama kortizolio kiekį organizme. Be to, juokas skatina su teigiamomis emocijomis susijusių hormonų ir neuromediatorių, tokių kaip dopaminas, oksitocinas ir serotoninas, išsiskyrimą. Tyrimai taip pat rodo, kad juokas teigiamai veikia imuninę sistemą, skatindamas išsiskirti didesnį imunoglobulinų kiekį ir stiprindamas organizmo atsparumą ligoms. Taip pat nustatyta, kad juokas gerina kraujagyslių funkciją, dėl to gali sumažėti kraujo spaudimas ir pagerėti kraujo apykaita organizme [1, 17, 19].

Juokas gali sumažinti įvairius neigiamus emocinius ir fizinius pojūčius, tokius kaip nerimas, skausmas ar stresas. Be to, jis turi ir teigiamą psichologinį poveikį – gali pagerinti nuotaiką ir atmintį. Juokas taip pat veikia ir fizinę asmens būklę, padidindamas energijos lygį, pagerindamas miego kokybę bei pailgindamas dėmesio koncentracijos trukmę [1, 18, 32]. Tačiau tyrimuose taikomos skirtingos intervencijos – medicininiai klounai, juoko terapija, juoko joga ar juoką sukeliantys vaizdo įrašai, todėl jų rezultatus sunku tiesiogiai palyginti. Be to, dažnai vertinami subjektyvūs rodikliai, tokie kaip nerimas, skausmas ar nuotaika, kurie gali priklausyti nuo individualaus humoro suvokimo ir tyrimo aplinkos.

Juoko terapija taikoma kaip nemedikamentinė intervencija, tačiau ji turėtų būti individualizuota, nes skiriasi žmonių humoro supratimas, todėl tos pačios juoko formos gali būti interpretuojamos nevienodai. Taikant humorą svarbu parinkti tokią jo formą, kuri būtų tinkama konkrečiam pacientui ir padėtų išlaikyti artimą ryšį tarp medicinos personalo ir paciento [36, 39]. Taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad ne visos humoro intervencijos yra tinkamos visiems pacientams, pavyzdžiui, medicininiai klounai gali būti netinkami asmenims, turintiems kulofobiją [37].

APIBENDRINIMAS

Juokas veikia žmogaus endokrininę ir nervų sistemas, skatindamas hormonų ir neuromediatorių išsiskyrimą, kurie skatina įvairius teigiamus fiziologinius pokyčius organizme. Tokie pokyčiai kaip streso ar skausmo pojūčio mažėjimas rodo, kad juokas gali būti taikomas kaip papildoma terapinė priemonė. Taip pat juokas teigiamai veikia ir žmogaus psichologinę būklę, gerindamas emocinę savijautą ir padėdamas sustiprinti socialinius ryšius. Juokas pasižymi skirtingomis rūšimis ir formomis, kurias galima klasifikuoti pagal jas sukeliančius veiksnius. Žinant šias rūšis galima geriau interpretuoti juoko kilmę klinikiniame kontekste.

Humoro supratimas formuojasi palaipsniui vaikystėje ir pagal raidą gali būti skirstomas į kelis etapus. Humoro interpretacija susiformuoja vaikystėje ir išlieka individuali. Dėl to, taikant juoko terapiją, svarbu atsižvelgti į humoro raidos ypatumus ir individualų asmens humoro supratimą.

Straipsnis gautas 2026-03-10, priimtas 2026-05-18

Literatūra

1. JongEun Y. Therapeutic Benefits of Laughter in Mental Health: A Theoretical Review. The Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2016;239(3):243–249. https://doi.org/10.1620/tjem.239.243
2. Venkatesan S. Developmental trajectory of humor and laughter in children. World Journal of Advanced Research and Reviews. 2022;15(02):217–224. https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.15.2.0810
3. Klumbytė N. Autoritarinis juokas: politinis humoras ir sovietinė distopija Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras; 2024.
4. Campbell, J. Laughter therapy and humor therapy. EBSCO Research Starters. 2023.
5. Lopes-Júnior LC, Bomfim E, Olson K, Neves ET, Silveira DSC, Nunes MDR, Nascimento LC, Pereira-da-Silva G, Lima RAG. Effectiveness of hospital clowns for symptom management in paediatrics: systematic review of randomised and non-randomised controlled trials. BMJ. 2020 Dec 16;371:m4290. https://doi.org/10.1136/bmj.m4290
6. Akimbekov NS, Razzaque MS. Laughter therapy: A humor-induced hormonal intervention to reduce stress and anxiety. Curr Res Physiol. 2021;4:135–138. https://doi.org/10.1016/j.crphys.2021.04.002
7. Zhou Z, Jia Y, Yan H, Wen J, Xu J, Wang S. Effects of humor therapy on negative emotions, quality of life and cognitive function in older adults: A systematic review and meta-analysis. Geriatr Nurs. 2025 Jan-Feb;61:20-26. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2024.10.054
8. Lanjewar PT, Tripathi M, Syal SK, Singh BK, Anjankar S, Gandhoke CS. Pathological laughter as an unusual first-presenting symptom of petroclival meningioma. Surg Neurol Int. 2024;15:420. https://doi.org/10.25259/SNI_673_2024
9. Tu S, Huang M, Caga J, Mahoney CJ, Kiernan MC. Brainstem Correlates of Pathological Laughter and Crying Frequency in ALS. Front Neurol. 2021;12:704059. https://doi.org/ 10.3389/fneur.2021.704059
10. Crumpacker DW. Enhancing approaches to the identification and management of pseudobulbar affect. J Clin Psychiatry. 2016;77(9):e1155. https://doi.org/10.4088/JCP.15136tx1cj
11. Demler TL. Introduction to pseudobulbar affect: setting the stage for recognition and familiarity with this challenging disorder. Am J Manag Care. 2017;23(18 Suppl):S339–S344. https://doi.org/10.4088/JCP.15136tx1cj.
12. Beth Urhoy M, House WJ. Pathological Laughter Prodromal to a Stroke of the Head of the Left Caudate Nucleus. Case Rep Neurol. 2022;14(1):1–4. https://doi.org/10.1159/000521304
13. Prentice D, Dharsono F, Martinet P. Pathological Laughter: The First Manifestation of Intracerebral Haemorrhage Linked to Phenylephrine Overuse. Cureus. 2024 Jun 29;16(6):e63461. https://doi.org/10.7759/cureus.63461
14. Scott S, Lavan N, Chen S, McGettigan C. The social life of laughter. Trends Cogn Sci. 2014 Oct 22;18(12):618–620. https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.09.002
15. Zarei SA, Yahyavi SS, Salehi I, Kazemiha M, Kamali AM, Nami M. Toward reanimating the laughter-involved large-scale brain networks to alleviate affective symptoms. Brain Behav. 2022 Jul;12(7):e2640. https://doi.org/10.1002/brb3.2640
16. Dunbar RIM. Laughter and its role in the evolution of human social bonding. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2022 Nov 7;377(1863):20210176. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0176
17. Sánchez JC, Porras GL, Torres MA, Olaya JC, García AM, Muñoz LV, Mesa HY, Ramírez AF. Effects of clowning on anxiety, stress, pain, and hormonal markers in paediatric patients. BMC Pediatr. 2024 Nov 13;24(1):728. https://doi.org/10.1186/s12887-024-05211-1
18. Savage BM, Lujan HL, Thipparthi RR, DiCarlo SE. Advances in Physiology Education. 2017;41(3):341–347. https://doi.org/10.1152/advan.00030.2017
19. Ring F. Should We Be Laughing More in Art Museums and Hospitals? AMA J Ethics. 2020;22(7):E624–627. https://doi.org/10.1001/amajethics.2020.624
20. Meral SE, Koçer H. Humor development in preschool and primary school children in Turkiye. Problems of education in the 21stcentury. 2023;81(3):374–387. https://doi.org/10.33225/pec/23.81.374
21. Baker G, Aldridge M. Children's humour development: A linguistic perspective. Journal of Child Language Acquisition and Development. 2022;10(3):572–600.
22. Lyon C. Humour and the young child A review of the research literature. Televizion. 2006;19:4–9.
23. Fox CL, Hunter SC, Jones SE. Longitudinal Associations Between Humor Styles and Psychosocial Adjustment in Adolescence. Eur J Psychol. 2016 Aug 19;12(3):377–89. https://doi.org/10.5964/ejop.v12i3.1065
24. Mulvey KL, Palmer SB, Abrams D. Race-Based Humor and Peer Group Dynamics in Adolescence: Bystander Intervention and Social Exclusion. Child Dev. 2016 Sep;87(5):1379–91. https://doi.org/10.1111/cdev.12600
25. Porras-Jiménez YM, Álvarez-Nieto C, Romero-Granados KL, Pinzón-Ordoñez CA, López-Medina IM. Effectiveness of laughter therapy with healthcare clowns on the mood of hospitalised adults. Rev Cuid. 2025 Mar 19;16(1):e4375. DOI: 10.15649/cuidarte.4375.
26. Yamakoshi T, Sakamoto R, Fukuda T, Kanatome A, Koyama A, Ano Y. Effects of laughter on focus and stress in middle-aged adults: a single-blind, randomized controlled trial. BMC Complement Med Ther. 2025 Apr 1;25(1):123. DOI: 10.1186/s12906-025-04863-5.
27. Gonot-Schoupinsky FN, Garip G. Laughter and humour interventions for well-being in older adults: A systematic review and intervention classification. Complement Ther Med. 2018 Jun;38:85–91. DOI: 10.1016/j.ctim.2018.04.009.
28. Kuru Alici N, Zorba Bahceli P. Effects of Laughter Therapy on Life Satisfaction and Loneliness in Older Adults Living in Nursing Homes in Turkey: A Parallel Group Randomized Controlled Trial. Rehabil Nurs. 2021 Mar-Apr 01;46(2):104–112. https://doi.org/10.1097/RNJ.0000000000000266
29. Xin G, Yingping F, Yue C, Jiaming W, Xue H. Application of clown care in hospitalized children: A scoping review. PLoS One. 2024 Dec 19;19(12):e0313841. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313841
30. Monin JK, Feeney BC, Tomlinson J, Levy B, Clark MS, Duker A, Gruber J. Laughter and short-term blood pressure reactivity in middle-aged and older adult spousal support interactions. Health Psychol. 2021 Nov;40(11):764–773. https://doi.org/10.1037/hea0001136
31. Kafle E, Papastavrou Brooks C, Chawner D, Foye U, Declercq D,

Brooks H. „Beyond laughter“: a systematic review to understand how interventions utilise comedy for individuals experiencing mental health problems. Front Psychol. 2023 Aug 7;14:1161703. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1161703

32. Spytska L. Effect of Laughter Therapy on the Psychological and Physiological State of a Person. Psichologija. 2024 Nov;71:118–132. https://doi.org/10.15388/Psichol.2024.71.7
33. Erbay Dalli Ö, Pehlïvan S. The effectiveness of laughter-based interventions on psychological, physiological and educational outcomes in nursing students: A systematic review and meta-analysis. Nurse Educ Pract. 2025 Aug;87:104509. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2025.104509
34. Inoue A, Hiratsuka Y, Takesue A, Aida J, Kondo K, Murakami A. Association between visual status and the frequency of laughter in older Japanese individuals: the JAGES cross-sectional study. BMJ Open Ophthalmol. 2022 Mar 23;7(1):e000908. DOI: 10.1136/bmjophth-2021-000908.
35. Sun X, Zhang J, Wang Y, Zhang X, Li S, Qu Z, et al. The impact of humor therapy on people suffering from depression or anxiety: An integrative literature review. Brain Behav. 2023;13(9):e3108. https://doi.org/10.1002/brb3.3108
36. Finlay F, Baverstock A, Lenton S. Therapeutic clowning in paediatric practice. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2013;19(4):596–605. https://doi.org/10.1177/1359104513492746
37. Planting T, Koopowitz SM, Stein DJ. Coulrophobia: An investigation of clinical features. S Afr J Psychiatr. 2022 Jan 19;28:1653. https://doi.org/10.4102/sajpsychiatry.v28i0.1653
38. Osincup P. How to Use Humor in Clinical Settings. AMA J Ethics. 2020;22(7):E5880–595. https://doi.org/10.1001/amajethics.2020.588
39. Hardy C. Humor and sympathy in medical practice. Med Health Care Philos. 2020 Jun;23(2):179–190. https://doi.org/10.1007/s11019-019-09928-0

THE ROLE OF LAUGHTER AND HUMOR THERAPY IN HEALTH PROMOTION AND CLINICAL PRACTICE

***Titas Zabulionis*[1], *Sigita Lesinskienė*[2]**
[1]*Vilnius University, Faculty of Medicine,*
[2]*Vilnius University, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine, Clinic of Psychiatry*

SUMMARY

Objective. To review the literature on types of laughter, its physiology, the possibilities of humor application, its development, and its effects on physical and mental health across different age groups.

Methods. This article presents a literature review primarily based on the PubMed database, with additional sources from EBSCO. The following keywords were used for the literature search: laughter therapy, humor, physiology of laughter, medical clowning, humor development, health promotion. English-language scientific articles published between 2006 and 2025 were included in the review. Most of the selected studies were published within the last 10 years, although several earlier theoretically significant sources were also included.

Results. According to the literature, laughter can be classified into several types: spontaneous, simulated, stimulated, induced, and pathological. The occurrence of laughter is associated with the coordinated activity of various brain structures, and laughter activates neuroendocrine responses related to reduced stress and improved emotional well-being. The understanding of humor develops gradually during childhood and can be divided into several developmental stages. Studies indicate that laughter and humor-based interventions may reduce anxiety, stress, and pain, improve emotional well-being, and strengthen social relationships.

Conclusions. Laughter activates the endocrine and nervous systems, stimulates the release of neurotransmitters and hormones, and may reduce stress and the perception of pain; therefore, it can be applied as a complementary, non-invasive therapeutic intervention. It also positively affects psychological well-being, improves emotional state, and may contribute to strengthening social relationships. Laughter has different forms that are important to distinguish in clinical contexts, and humor comprehension develops during childhood and remains individual.

Keywords: laughter, types of laughter, humor development, physiology of laughter

Received 10 March 2026, accepted 18 May 2026

Correspondence to Sigita Lesinskienė
Faculty of Medicine, Vilnius University
M. K. Čiurlionio str. 21/27,
LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: sigita.lesinskiene@mf.vu.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-1

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS PREVENCINĖSE SVEIKATOS TYRIMŲ PROGRAMOSE PAGAL SOCIOEKONOMINES CHARAKTERISTIKAS

Evelina Petraitytė, Daiva Skučienė, Eugenijus Dunajevas
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Socialinės politikos katedra

SANTRAUKA

Tikslas – įvertinti, kaip asmenų dalyvavimas prevencinėse sveikatos tyrimų programose (kraujospūdžio, mamografijos, gimdos kaklelio tepinėlio, cholesterolio) yra susijęs su asmens socioekonominėmis charakteristikomis (lytimi, išsilavinimu, ekonominio aktyvumo statusu, pajamomis).

Metodika. Tyrime analizuoti Valstybės duomenų agentūros 2019 m. Lietuvos gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys. Taikyti šie analizės metodai: aprašomoji statistika, vienfaktorinė ir daugiafaktorinė dispersinės analizės (ANOVA) bei aposteriorinis (*post hoc*) Bonferonio (Bonferroni) testas.

Rezultatai. Ekonominio aktyvumo statusas buvo svarbiausias veiksnys, diferencijuojantis dalyvavimą prevenciniuose tyrimuose: dirbantys asmenys tyrėsi vidutiniškai seniau nei senatvės pensininkai ar dėl negalios nedirbantys asmenys. Išsilavinimas turėjo sąsajų tik su cholesterolio tyrimo atlikimu. Pajamos bendrai nebuvo reikšmingas veiksnys, tačiau moterų grupėje nustatyta nedidelė tendencija, jog didesnes pajamas gaunančios moterys kraujospūdį tikrinosi seniau, palyginti su gaunančiomis mažesnes pajamas.

Išvados. Svarbiausias veiksnys, darantis įtaką prevencinių sveikatos tyrimų atlikimui, yra ekonominio aktyvumo statusas. Išsilavinimo įtaka ribota ir turėjo ryšį tik su cholesterolio tyrimo atlikimu. Pajamos neturėjo reikšmės prevencinių sveikatos tyrimų atlikimui. Nė viena iš tirtų socioekonominių charakteristikų neturėjo ryšio su gimdos kaklelio tepinėlio tyrimo atlikimu.

Reikšminiai žodžiai: prevenciniai sveikatos tyrimai, ekonominis aktyvumas, išsilavinimas, pajamos, lytis.

ĮVADAS

Pasaulio sveikatos organizacija sveikatą apibrėžia ne tik kaip ligos ar negalios nebuvimą, bet ir kaip visapusę fizinę, psichinę bei socialinę gerovę [1]. Sveikatos stiprinimas ir ligų prevencija taip pat yra svarbi tarptautinių įsipareigojimų dalis – Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų trečiasis tikslas orientuotas į gerą sveikatą ir gerovę, o 3.4 rodiklis numato iki 2030 m. reikšmingai sumažinti priešlaikinį mirtingumą nuo neinfekcinių ligų taikant prevenciją ir gydymą [2].

Mokslinėje literatūroje plačiai pabrėžiama prevencinių sveikatos tyrimų svarba siekiant ankstyvos ligų diagnostikos, geresnių gydymo rezultatų ir priešlaikinio mirtingumo mažinimo [3]. Prevenciniai sveikatos tyrimai laikomi viena svarbiausių sveikatos priežiūros strategijų, padedančių anksti nustatyti ligas, pagerinti gyvenimo kokybę ir sumažinti sveikatos priežiūros sistemos naštą. Ypatingas dėmesys literatūroje skiriamas onkologinių ligų prevencijai. Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžia, kad ankstyvosios diagnostikos programų tikslas – sumažinti vėlyvose stadijose diagnozuojamų atvejų dalį [4]. Jungtinėse Amerikos Valstijose vėžio prevencijos ir atrankinės patikros pastangos 1975–2020 m. padėjo išvengti milijonų mirčių [5]. Europos mastu vykdomos prevencinės programos sudaro sąlygas didesnei mamo-

Adresas susirašinėti: Evelina Petraitytė
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
Sociologijos ir socialinio darbo instituto
Socialinės politikos katedra
Universiteto g. 9, 01122 Vilnius
El. p. evelinapetraityte@inbox.lt

grafijos tyrimų aprėpčiai – tyrimai rodo, kad dalyvavimas patikros programose padidėja apie 25 proc. Taip pat nustatyta, kad tokios programos siejamos su maždaug 10 proc. mažesniu mirtingumu nuo krūties vėžio [6]. Šie rezultatai rodo, kad ankstyva krūties vėžio diagnostika gali prisidėti prie palankesnių ligos baigčių.

Lietuvoje vykdomos penkios ligų prevencijos programos, kurių kainą kompensuoja ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Nemokamai prevenciškai išsitirti galima dėl gimdos kaklelio vėžio, prostatos vėžio, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio bei kraujagyslių ir širdies ligų (ŠKL) [7]. Tačiau, nors šios paslaugos yra teikiamos, naudojimasis jomis yra gana netolygus. Pavyzdžiui, remiantis Kauno teritorinės ligonių kasos pateiktomis prevencinių priemonių finansavimo programos vykdymo ataskaitomis, 2025 m. I ketvirtį iš visų prie Kauno apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) prirašytų 25–34 m. (imtinai) moterų į prevencinę gimdos kaklelio vėžio programą įsitraukė apie dešimtadalis moterų [8]. Nors absoliučiais skaičiais dalyvavimo lygis išlieka žemas, lyginant su kitomis Lietuvoje vykdomomis prevencinėmis programomis, pagal gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą atliekamų tyrimų aprėptis yra santykinai didesnė. Tyrimą pagal storosios žarnos vėžio prevencinę programą tą patį 2025 m. ketvirtį atliko tik 556 gyventojai iš 242 601 tikslinės grupės gyventojo [9]. Dar mažesnis įsitraukimas buvo į priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą – joje dalyvavo tik apie 76 iš 93 886 tikslinės grupės vyrų [10]. Šie duomenys rodo, jog moterų įsitraukimas į gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą yra daug aktyvesnis nei vyrų į priešinės liaukos ar bendrai gyventojų į storosios žarnos vėžio prevencines programas.

Epidemiologiniai duomenys rodo, kad tiek onkologinės, tiek širdies ir kraujagyslių ligos išlieka viena pagrindinių sergamumo ir mirtingumo priežasčių Lietuvoje [11, 12]. Deja, daugelio programų prevencinių tyrimų atlikimo rodikliai tebėra žemi, o tai rodo, kad prevencijos potencialas galimai neišnaudojamas.

Tačiau prevenciniai tyrimai neapima vien vėžio prevencijos – didelis dėmesys skiriamas ir širdies bei kraujagyslių ligų diagnostikai. Remiantis Higienos instituto duomenimis, 2024 m. mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų siekė 658,7 atvejo 100 000 gyventojų, o nuo išeminės širdies ligos – 393,5 atvejo 100 000 gyventojų [11].

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija sudaro svarbią visuomenės sveikatos dalį, nes šiomis ligomis serga reikšminga Lietuvos gyventojų dalis [11]. Pagal prevencines programas atliekami tyrimai leidžia nustatyti pagrindinius rizikos veiksnius ir identifikuoti didelės susirgimo rizikos asmenis, tačiau gyventojų įsitraukimas į šias programas taip pat nėra pakankamas [13].

Išsamia prevencine ŠKL tikimybės įvertinimo ir prevencijos paslauga Kauno apskrityje, remiantis Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2025 m. I ketvirtį pasinaudojo 3 751 asmuo iš prie ASPĮ prisirašiusių 119 638 asmenų [13]. Tyrėjai nustatė, jog 2009–2019 m. 46,8 proc. vidutinio amžiaus vyrų Lietuvoje sirgo arterine hipertenzija, o 26,7 proc. šių vyrų arterinė hipertenzija buvo pirmą sykį diagnozuota prevencinės sveikatos apžiūros metu [14]. Tai rodo, kad didelė dalis programos dalyvių anksčiau nežinojo apie savo širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatos būklę.

Šiame straipsnyje prevencinės programos traktuojamos kaip aplinka, kurioje sudaromos galimybės atlikti prevencinius sveikatos tyrimus, o empirinėje analizėje nagrinėjamas gyventojų dalyvavimas konkrečiuose prevenciniuose tyrimuose.

Atsižvelgiant į prevencinių sveikatos tyrimų svarbą ir netolygų gyventojų dalyvavimą juose, kyla klausimas, kokie veiksniai lemia asmenų įsitraukimą į prevencines programas. Todėl šio tyrimo tikslas – išnagrinėti, kaip

1 lentelė. Mirtingumas nuo gimdos kaklelio, kolorektalinio, krūties vėžio ir kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje, tenkantis 100 000 gyventojų, 2021–2024 m.

	Gimdos kaklelio vėžys	Kolorektalinis vėžys	Krūties vėžys	Kraujotakos sistemos ligos
2024	8,5	8,5	29,7	636,0
2023	8,8	7,7	27,4	659,1
2022	9,6	7,9	30,4	785,2
2021	9,3	7,2	29,5	805,2

asmenų dalyvavimas prevencinėse sveikatos tyrimų programose yra susijęs su asmens socioekonominėmis charakteristikomis.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Tyrime naudoti Valstybės duomenų agentūros 2019 m. Gyventojų sveikatos statistinio tyrimo duomenys, viešai prieinami Lietuvos atvirų duomenų portale. Pasirinkti 2019 m. duomenys, nes tai naujausias viešai prieinamas nacionaliniu mastu reprezentatyvus duomenų rinkinys, apimantis informaciją apie gyventojų dalyvavimą prevenciniuose sveikatos tyrimuose ir pagrindines socioekonomines charakteristikas.

Bendrą tyrimo imtį sudarė 4 151 Lietuvos gyventojas. Atsižvelgiant į analizuojamą prevencinį tyrimą ir jam taikomą tikslinę populiaciją, analizės atliktos atskirose analitinėse imtyse. Tas pats respondentas galėjo patekti į daugiau nei vieną analizę, jei atitiko kelių prevencinių tyrimų įtraukimo kriterijus, nes kiekvienu atveju buvo analizuojamas skirtingas baigties kintamasis. Pirmajai imčiai priskirti 45–74 metų vyrai ir moterys (n = 2 377), jie analizuoti laikotarpiu nuo paskutinio kraujospūdžio ir cholesterolio kiekio tyrimo. Antrajai imčiai priskirtos 45–74 metų moterys (n = 1 456), analizuotos laikotarpiu nuo paskutinį kartą atliktos mamografijos. Trečiajai imčiai priskirtos 25–34 metų moterys (n = 318), analizuotos laikotarpiu nuo paskutinio gimdos kaklelio tepinėlio tyrimo.

Tyrime nagrinėti keturi priklausomi kintamieji: laikotarpis nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo, cholesterolio kiekio kraujyje matavimo, mamografijos ir gimdos kaklelio tepinėlio tyrimo. Šie kintamieji buvo vertinami pagal atsakymus į klausimą „Kada paskutinį kartą buvo atliktas atitinkamas tyrimas?“. Kintamieji interpretuoti kaip ranginės laikotarpio nuo paskutinio tyrimo atlikimo kategorijos: mažesnė reikšmė reiškė trumpesnį laikotarpį nuo paskutinįsyk atlikto tyrimo, didesnė – ilgesnį laikotarpį nuo paskutinio tyrimo arba tai, kad tyrimas niekada nebuvo atliktas.

Nepriklausomi kintamieji buvo lytis, amžius, išsilavinimo lygis, ekonominio aktyvumo statusas ir namų ūkio grynosios mėnesio ekvivalentinės pajamos. Išsilavinimas suskirstytas į tris kategorijas: vidurinis ir žemesnis, aukštesnysis bei aukštasis universitetinis. Ikimokyklinį išsilavinimą turintys respondentai nebuvo analizuojami dėl labai mažo jų skaičiaus imtyje. Pagal ekonominio aktyvumo statusą tiriamieji suskirstyti į užimtus, bedarbius, senatvės pensininkus, dėl negalios nedirbančius asmenis, namų šeimininkus ir kitus ekonomiškai neaktyvius asmenis. Mokinių ir privalomąją karo tarnybą atliekančių respondentų grupės neanalizuotos dėl mažų imčių. Namų ūkio grynųjų mėnesio ekvivalentinių pajamų kintamasis duomenų rinkinyje buvo pateiktas kvintilinėmis grupėmis: I kvintilis žymėjo mažiausias, o V kvintilis – didžiausias pajamas gaunančius respondentus. Tokia kvintilių interpretacija atitinka oficialiojoje statistikoje taikomą pajamų grupavimą pagal ekvivalentinių disponuojamųjų pajamų lygį.

Šiame tyrime buvo analizuojama, kada paskutinį kartą respondentams buvo atlikti prevenciniai sveikatos tyrimai (kraujospūdžio, cholesterolio kiekio, mamografijos ir gimdos kaklelio tepinėlio), o šis rodiklis analizuotas kaip ranginis kintamasis ir buvo koduotas 5 balų skale:

1 – per pastaruosius 12 mėn.;
2 – prieš 1–3 metus;
3 – prieš 3–5 metus;
4 – prieš 5 metus ir seniau;
5 – niekada.

Rezultatų skyriuje pateikiamos vidutinės kategorijų reikšmės, todėl didesnė vidutinė reikšmė reiškia, kad nuo vėliausio tyrimo buvo praėję daugiau laiko arba tyrimas niekada nebuvo atliktas.

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant *IBM SPSS Statistics* programą. Taikyta aprašomoji statistika: apskaičiuoti vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai. Siekiant įvertinti sąsajas tarp socioekonominių charakteristikų ir dalyvavimo prevenciniuose sveikatos tyrimuose, taikyta vienfaktorinė dispersinė analizė (ANOVA). Nustačius statistiškai reikšmingus skirtumus, grupių poriniams palyginimams naudotas aposteriorinis Bonferonio (Bonferroni) testas. Dispersijų vienodumas vertintas Livyno (Levene) testu. Statistinis reikšmingumas nustatytas, kai $p < 0,05$.

TYRIMO REZULTATAI

Išsilavinimas. Atlikti skaičiavimai parodė, jog įgytas išsilavinimo lygis darė reikšmingą poveikį tam, kada paskutinį sykį apklaustieji tyrė cholesterolio kiekį kraujyje ($F = 6,869$; $p = 0,001$), tačiau neturėjo įtakos kraujospūdžio matavimo tyrimui ($p = 0,67$).

Vyrai. Gauti vidurkiai rodo, kad aukštesnįjį išsilavinimą įgijusių vyrų grupėje nuo paskutinio cholesterolio tyrimo buvo praėję mažiausiai laiko ($M = 1,72$). Aukštąjį uni-

versitetinį išsilavinimą įgijusių vyrų vidurkis buvo didesnis (M = 1,91), o vidurinį ir žemesnį išsilavinimą turinčių vyrų – didžiausias (M = 2,10), šiose grupėse nuo paskutinio tyrimo buvo praėję daugiau laiko.

Moterys. Moterų grupėje mažiausias vidurkis nustatytas tarp aukštesnįjį išsilavinimą įgijusių respondenčių, o tai rodo, kad šioje grupėje nuo paskutinio cholesterolio tyrimo buvo praėję mažiausiai laiko. Aukštąjį bei vidurinį ir žemesnį išsilavinimą turinčių moterų vidurkiai buvo panašūs, šiose grupėse nuo paskutinio tyrimo buvo praėję daugiau laiko.

Ekonominio aktyvumo statusas. Ekonominio aktyvumo statusas buvo reikšmingai susijęs su laikotarpio nuo paskutinio prevencinio sveikatos tyrimo kategorija. Moterų grupėje statistiškai reikšmingi skirtumai pagal ekonominio aktyvumo statusą nustatyti vertinant laikotarpį nuo paskutinės mamografijos ($F = 6,808$; $p < 0,001$). Didžiausi skirtumai nustatyti tarp dėl negalios nedirbančių moterų ir dirbančių bei bedarbių moterų: pirmojoje grupėje nuo paskutinio mamografijos tyrimo buvo praėję mažiau laiko.

Gimdos kaklelio tepinėlio tyrimo atlikimui ekonominio aktyvumo statusas neturėjo statistiškai reikšmingo poveikio.

Vyrų grupėje ekonominio aktyvumo statusas buvo statistiškai reikšmingai susijęs su laikotarpio nuo paskutinio cholesterolio tyrimo kategorija ($F = 25,53$; $p < 0,001$). Dėl negalios nedirbančių vyrų ir senatvės pensininkų grupėse nuo paskutinio tyrimo buvo praėję mažiau laiko nei bedarbių, užimtų asmenų ir namų šeimininkų grupėse.


Moterų grupėje ekonominio aktyvumo statusas buvo statistiškai reikšmingai susijęs su laikotarpio nuo paskutinio cholesterolio tyrimo kategorija ($F = 34,05$; $p < 0,001$). Užimtų ir bedarbių moterų grupėse nuo paskutinio tyrimo buvo praėję daugiau laiko nei senatvės pensininkių ir dėl negalios nedirbančių moterų grupėse. Tačiau šiuos skirtumus reikėtų vertinti atsargiai, nes jie gali atspindėti amžiaus poveikį, kuris šioje analizėje nebuvo kontroliuojamas.

Vertinant kraujospūdžio matavimo tyrimus nustatyta, kad vyrų grupėje ekonominio aktyvumo statusas buvo statistiškai reikšmingai susijęs su laikotarpio nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo kategorija ($F = 26,25$; $p < 0,001$). Užimtų vyrų grupėje nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo buvo praėję mažiau laiko nei dėl negalios nedirbančių asmenų, namų šeimininkų ir kitų ekonomiškai neaktyvių vyrų grupėse. Tai rodo, kad darbo rinkoje nedalyvaujančių vyrų grupėse nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo buvo praėję daugiau laiko nei dirbančių vyrų grupėje.


Moterų grupėje ekonominio aktyvumo statusas taip pat buvo statistiškai reikšmingai susijęs su laikotarpio nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo kategorija ($F = 18,60$; $p < 0,001$). Dėl negalios nedirbančių, namų šeimininkių ir bedarbių moterų grupėse nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo buvo praėję daugiau laiko nei užimtų ir kitų ekonomiškai neaktyvių moterų grupėse.

Pajamos. Gaunamų mėnesio pajamų lygis nebuvo statistiškai reikšmingai susijęs su prevencinių tyrimų atlikimo rodikliais. Vyrų grupėje laikotarpio nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo kategorija tarp pajamų kvintilių statistiškai reikšmingai nesiskyrė, o vidurkiai kito tik nežymiai – nuo 1,68 pirmame kvintilyje iki 1,60–1,63 ketvirtame ir penktame kvintiliuose.

Moterų grupėje nustatyti nedideli, tačiau statistiškai reikšmingi skirtumai tarp pajamų kvintilių ($F = 3,90$; $p = 0,004$). Didėjant pajamoms, didėjo ir laikotarpio nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo kategorijos vi-



1 pav. Laikotarpio nuo paskutinio cholesterolio kiekio tyrimo vidurkiai pagal vyrų išsilavinimo lygį




2 pav. Laikotarpio nuo paskutinio cholesterolio kiekio tyrimo vidurkiai pagal moterų išsilavinimo lygį

durkis – nuo 1,54 pirmame kvintilyje iki 1,63 penktame kvintilyje, o tai rodo, kad aukštesnes pajamas gaunančių moterų grupėse nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo buvo praėję daugiau laiko.


REZULTATŲ APTARIMAS

Remdamiesi mokslinėje literatūroje pateiktais duomenimis, Lietuvos tyrėjai teigia, jog prevencinius veiksmus savo sveikatos atžvilgiu (tyrimai, skiepijimasis) nulemia tai, kaip asmuo vertina savo galimų prevencinių veiksmų rezultatus, t. y. jo įsitikinimai [15]. Taip pat teigiama, jog lytis turi įtakos širdies ir kraujagyslių ligų prevencinių tyrimų atlikimui – moterys labiau nei vyrai suvokia prevencinių ŠKL tyrimų naudą, taip pat joms didesnę įtaką turi kiti asmenys [16]. Atlikti prevencinius vėžio tyrimus skatina ir visuomenės informuotumas – ne tik medicinos darbuotojų teikiama informacija apie galimus tyrimus ir jų naudą, bet ir artimos socialinės aplinkos palaikymas bei paskatinimas.

Šiame darbe atliktas tyrimas parodė, kad kraujospūdžio ir cholesterolio matavimo prevenciniams sveikatos tyrimams didžiausią įtaką turėjo ekonominio aktyvumo statusas. Šis rezultatas gali būti aiškinamas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų naudojimosi ypatumais – dažnesni kontaktai su šeimos gydytoju siejami su didesniu naudojimusi profilaktinėmis paslaugomis [17]. Tyrime nustatytas didesnis senatvės pensininkų ir dėl negalios nedirbančių asmenų įsitraukimas į prevencines sveikatos programas gali būti aiškinamas didesniu šių asmenų naudojimusi sveikatos priežiūros paslaugomis – dažnesni apsilankymai pas gydytojus dėl sveikatos problemų, kurios kyla dėl senėjimo ar turimos negalios,



3 pav. Laikotarpio nuo paskutinės mamografijos vidurkiai pagal moterų ekonominio aktyvumo statusą




4 pav. Laikotarpio nuo paskutinio gimdos kaklelio tepinėlio tyrimo vidurkiai pagal moterų ekonominio aktyvumo statusą


gali būti stimulu dažniau prevenciškai tikrintis sveikatą (didesnė prieiga prie informacijos, galimybės laiko atžvilgiu). 2010–2014 m. Jungtinėje Karalystėje atliktas tyrimas, kuriuo buvo siekiama įvertinti NHS sveikatos patikrų prieinamumą ir rezultatus, taip pat neparodė reikšmingų skirtumų tarp dalyvaujančiųjų prevencinėse sveikatos programose pagal socioekonominius rodiklius, tačiau buvo matomas didesnis vyresnio amžiaus moterų įsitraukimas į patikras [18].

Šiuo tyrimu nustatyta, kad išsilavinimo veiksnys buvo reikšmingas tik vertinant cholesterolio tyrimo prevencinę programą, bet ne kitas analizuotas programas. Ir vyrai, ir moterys, turintys aukštesnįjį išsilavinimą, cholesterolį tikrinosi ne taip seniai, palyginti su aukštąjį universitetinį bei vidurinį ir žemesnį išsilavinimą įgijusiais asmenimis. Tačiau užsienio literatūroje pateikiami kiek kitokie rezultatai – Austrijoje atlikto tyrimo socioekonominių ir demografinių veiksnių įtakos vertinimas parodė, kad profilaktinius sveikatos tyrimus dažniau atliko moterys, turinčios vidurinį išsilavinimą, arba vyrai, įgiję aukštąjį išsilavinimą [19].

Šis tyrimas atskleidė, kad kraujospūdžio matavimas moterų grupėje priklausė nuo gaunamų pajamų. Užsienio literatūra rodo, kad metabolinių tyrimų atlikimą mažina arba skatina ligų rizikos suvokimas ir kasdieniai elgsenos įpročiai (rūkymas, fizinis aktyvumas) [20], kurie neturi tiesioginio nustatyto ryšio su pajamomis, tačiau pajamas galima vertinti kaip veiksnį, susijusį su, pavyzdžiui, geresne prieiga prie fizinio aktyvumo veiklų ar sveiką elgseną skatinančių išteklių. Todėl šiame tyrime nustatytą pajamų ir kraujospūdžio tyrimų ryšį tikslinga vertinti kaip labiau atspindintį elgsenos bei prieigos prie sveikatinimo išteklių sąveiką, o ne tiesioginį pajamų poveikį tyrimų atlikimui.




5 pav. Laikotarpio nuo paskutinio cholesterolio kiekio tyrimo vidurkiai pagal vyrų ekonominio aktyvumo statusą




6 pav. Laikotarpio nuo paskutinio cholesterolio kiekio tyrimo vidurkiai pagal moterų ekonominio aktyvumo statusą

Šis tyrimas parodė, kad tirtoje imtyje gimdos kaklelio tepinėlio atlikimas neturėjo reikšmingo ryšio su tirtais socioekonominiais veiksniais. Užsienio literatūroje randama žinių apie socioekonominių veiksnių (patiriamas nepriteklius, žemesnis socioekonominis statusas bei gyvenimas kaimo vietovėje) įtaką šio tyrimo atlikimui [21], tačiau svarbu įvertinti ir skirtingų šalių sveikatos apsaugos sistemas – Lietuvoje šie tyrimai yra nemokami, todėl, tikėtina, pajamos neturi tokios didelės reikšmės kaip tose šalyse, kur prevenciniai tyrimai yra mokami. Tačiau kaip didesnę reikšmę turintys veiksniai dažniau įvardijami gėda, diskriminacijos patirtys ir asmeninės nuostatos. 2024 m. septyniose Europos Sąjungos šalyse atliktas tyrimas parodė, jog visose tirtose šalyse kaip didžiausi barjerai pasitikrinti nuo gimdos kaklelio vėžio buvo įvardijami pažeidžiamų moterų baimė, gėda ir prevencinės sveikatos priežiūros prioriteto stoka. Be to, įvardijamos ir kultūrinės kliūtys, įskaitant stigmą, religinius įsitikinimus ir sutuoktinio paramos stoką, kurie daro įtaką nuostatoms dėl prevencinių tyrimų, ypač tarp imigrantų ir etninių mažumų moterų [22].


Mūsų atliktas tyrimas taip pat parodė, jog vieninteliu ekonominio aktyvumo statusas turėjo sąsają su mamografijos tyrimo atlikimu (užimtos moterys tikrinosi seniau, palyginti su kitomis tiriamųjų grupėmis). Šį rezultatą atliepia JAV 2015 m. atlikto tyrimo išvada, kad moterys, dirbančios ilgas valandas (>60 valandų per savaitę), žymiai rečiau atlikdavo mamografijos tyrimą (OR = 0,47; 95 proc. PI: 0,31–0,73). Nors šiame tyrime darbo valandų trukmė nebuvo analizuojama, tokia tyrimo išvada leidžia svarstyti, kad laiko trūkumas gali būti vienas iš veiksnių, ribojančių dirbančių moterų dalyvavimą prevenciniuose tyrimuose [23]. Ribotą tirtų socioekonominių charakteristikų įtaką mamografijos tyrimo atlikimui galima aiškinti kitų veiksnių svarba – užsienio literatūroje aprašoma, jog moterų dalyvavimą mamografijos programose




7 pav. Laikotarpio nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo vidurkiai pagal vyrų ekonominio aktyvumo statusą



8 pav. Laikotarpio nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo vidurkiai pagal moterų ekonominio aktyvumo statusą



9 pav. Laikotarpio nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo vidurkiai pagal vyrų pajamų kvintilius



10 pav. Laikotarpio nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo vidurkiai pagal moterų pajamų kvintilius

lėmė nuolatiniai įsitikinimai ir nepakankamos žinios apie krūties vėžį, įvairios psichologinės reakcijos ir neigiamas požiūris į krūties vėžio rizikos vertinimus [24].

Tyrimo ribotumu laikytinas tam tikrų išsilavinimo lygių sujungimas į bendresnes kategorijas dėl nepakankamo respondentų skaičiaus atskirose grupėse, o tai galėjo riboti analizės jautrumą silpnesniems ryšiams tarp kintamųjų nustatyti. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad naudoti 2019 m. duomenys neatspindi galimų trumpalaikių prevencinių patikrinimų apimčių svyravimų, susijusių su COVID-19 pandemijos laikotarpiu. Vis dėlto tyrimo tikslas buvo analizuoti struktūrines sąsajas tarp dalyvavimo prevenciniuose sveikatos tyrimuose ir socioekonominių charakteristikų, kurios paprastai kinta lėčiau ir išlieka aktualios ilgesniu laikotarpiu.

Taip pat svarbu pažymėti, kad šiame tyrime amžiaus įtaka nebuvo atskirai įtraukta į visus analizės modelius. Amžius yra reikšmingas veiksnys, galintis turėti įtakos tiek prevencinių tyrimų atlikimui, tiek socioekonominių rodiklių pasiskirstymui (pvz., užimtumo statusui ar pajamoms). Dėl šios priežasties amžius galėjo veikti kaip klaidinantis veiksnys, galintis iš dalies paaiškinti nustatytas sąsajas tarp socioekonominių charakteristikų ir dalyvavimo prevenciniuose sveikatos tyrimuose. Todėl gauti rezultatai turėtų būti interpretuojami atsargiai, o ateities tyrimuose tikslinga numatyti amžiaus kontrolę arba analizes atskirose amžiaus grupėse.

Rekomenduojama atlikti papildomus tyrimus, į modelį

įtraukiant papildomus socialinius ir psichologinius veiksnius bei amžiaus įtaką. Taip pat, remiantis gautais tyrimo rezultatais, atlikti išsamesnę analizę, kokiomis priemonėmis būtų galima labiau įtraukti užimtus dirbančius asmenis į prevencines sveikatos programas.

IŠVADOS

1. Ekonominio aktyvumo statusas buvo reikšmingiausias veiksnys, darantis įtaką prevencinių sveikatos tyrimų atlikimui. Ryškiausios sąsajos nustatytos moterų grupėje, kur ekonominio aktyvumo statusas buvo statistiškai reikšmingai susijęs su mamografijos, cholesterolio ir kraujospūdžio tyrimų atlikimu, o vyrų grupėje – su cholesterolio ir kraujospūdžio tyrimų atlikimu.
2. Pajamos bendrai nebuvo reikšmingai susijusios su prevencinių tyrimų atlikimu, tačiau moterų grupėje nustatyta reikšminga sąsaja tarp pajamų ir kraujospūdžio matavimo: didėjant pajamoms, nuo paskutinio kraujospūdžio matavimo buvo praėję daugiau laiko.
3. Išsilavinimas darė įtaką tik cholesterolio tyrimui: aukštesnį išsilavinimą turintys vyrai cholesterolį buvo tyrėsi ne taip seniai kaip žemesnio išsilavinimo grupė, o gaunamos mėnesio pajamos bendrai nebuvo reikšminga determinantė tarp vyrų, nors moterų grupėje pastebėta reikšminga tendencija: kuo aukštesnes pajamas gauna moterys, tuo seniau jos buvo matavusios kraujospūdį.
4. Statistiškai reikšmingų sąsajų tarp tirtų socioekonominių charakteristikų ir gimdos kaklelio tepinėlio tyrimo atlikimo nenustatyta.

Straipsnis gautas 2025-10-24, priimtas 2026-03-30

Literatūra

1. Constitution of the World Health Organization [Internet] [cited 2025 Sept 5]. Available from: https://www.who.int/about/governance/constitution
2. Goal 3 | Department of Economic and Social Affairs [Internet] [cited 2025 Sept 5]. Available from: https://sdgs.un.org/goals/goal3#targets_and_indicators
3. Bell NR, Grad R, Dickinson JA, Singh H, Moore AE, Kasperavicius D, et al. Better decision making in preventive health screening. Can Fam Physician. 2017 Jul;63(7):521–4. PMID: 28701435.
4. World Health Organization. Health promotion and disease prevention through population-based interventions, including action to address social determinants and health inequity [Internet]. World Health Organization – Regional Office for the Eastern Mediterranean [cited 2025 Sept 5]. Available from: http://www.emro.who.int/about-who/public-health-functions/health-promotion-disease-prevention.html
5. Goddard KAB, Feuer EJ, Mandelblatt JS, Meza R, Holford TR, Jeon J, et al. Estimation of cancer deaths averted from prevention, screening, and treatment efforts, 1975–2020. JAMA Oncol. 2025 Feb 1;11(2):162–7. DOI:10.1001/jamaoncol.2024.5381.
6. Guthmuller S, Carrieri V, Wübker A. Effects of organized screening programs on breast cancer screening, incidence, and mortality in Europe. J Health Econ. 2023 Dec;92:102803. DOI:10.1016/j.jhealeco.2023.102803.
7. Ligų prevencijos programos – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos [Internet] [cited 2025 Sept 5]. Available from: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/ligu-prevencijos-programos/
8. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos [Internet] [cited 2025 Sept 5]. Available from: https://ligoniukasa.lrv.lt/.../gimdos-kaklelio-piktybiniu-naviku-prevenciniu-priemoniu-programa/
9. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos [Internet] [cited 2025 Sept 5]. Available from: https://ligoniukasa.lrv.lt/.../storosios-zarnos-vezio-ankstyvosios-diagnostikos-programa/
10. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos [Internet] [cited 2025 Sept 5]. Available from: https://ligoniukasa.lrv.lt/.../priesines-liaukos-vezio-ankstyvosios-diagnostikos-programa/
11. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema [Internet] [cited 2025 Sept 5]. Available from: https://sveikstat.hi.lt/chart-summary-ctry.aspx
12. OECD, European Commission. Su vėžiu susijusios padėties šalyje apžvalga: Lietuva 2025. OECD Publishing; 2025 [cited 2025 Sept 5]. (EU Country Cancer Profiles). Available from: https://www.oecd.org/lt/publications/su-veziu-susijusios-padeties-salyje-apzvalga-lietuva-2025_72a821a7-lt.html
13. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos [Internet] [cited 2025 Sept 5]. Available from: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/ligu-prevencijos-programos/sirdies-ir-kraujagysliu-ligu-prevencija/
14. Šileikienė V, Dženkevičiūtė V, Čypienė A, Šlapikas T, Puronaitė R, Badarienė J, et al. Analysis of cardiovascular high-risk profile in middle-aged Lithuanian men with arterial hypertension from 2009 to 2019. Biomedicines. 2025 Feb;13(2):272. DOI:10.3390/biomedicines13020272.
15. Bulotaitė L, Vičaitė S. Su sveikata susijusį elgesį aiškinančios teorijos ir modeliai: kas skatina keisti elgesį. Visuomenės sveikata. 2016;1(72):36–47.
16. Blažauskaitė G. Pacientų nuomonės apie širdies ir kraujagyslių ligų sveikatos patikrinimą. In: Tarptautinė studentų konferencija „Teorija ir praktika: studentiškos įžvalgos". Kaunas: Kolpingo kolegija; 2021:14–8.
17. Ares-Blanco S, López-Rodríguez JA, Polentinos-Castro E, Del Cura-González I. Effect of GP visits in the compliance of preventive services: a cross-sectional study in Europe. BMC Prim Care. 2024 May 15;25(1):165. DOI:10.1186/s12875-024-02434-1.
18. Coghill N, Garside L, Montgomery AA, Feder G, Horwood J. NHS Health Checks: a cross-sectional observational study on equity of uptake and outcomes. BMC Health Serv Res. 2018 Apr 3;18:238. DOI:10.1186/s12913-018-3027-8.
19. Brunner-Ziegler S, Rieder A, Stein KV, Koppensteiner R, Hoffmann K, Dorner TE. Predictors of participation in preventive health examinations in Austria. BMC Public Health. 2013 Dec 5;13(1):1138. DOI:10.1186/1471-2458-13-1138.
20. de Waard AKM, Wändell PE, Holzmann MJ, Korevaar JC, Hollander M, Gornitzki C, et al. Barriers and facilitators to participation in a health check for cardiometabolic diseases in primary care: a systematic review. Eur J Prev Cardiol. 2018 Aug 1;25(12):1326–40. DOI:10.1177/2047487318780751.
21. Aguiar-Ibáñez R, Mbous Y, Sharma S, Chakali R, Chawla E. Barriers to cancer screening uptake and approaches to overcome them: a systematic literature review. Front Oncol. 2025;15:1575820. DOI:10.3389/fonc.2025.1575820.
22. Bøje RB, Bardou M, Mensah K, Berrocal RR, Rossi PG, Bonvicini L, et al. What are the barriers towards cervical cancer screening for vulnerable women? A qualitative comparative analysis of stakeholder perspectives in seven European countries. BMJ Open. 2024 May 1;14(5):e079921. DOI:10.1136/bmjopen-2023-079921.
23. Yao X, Dembe AE, Wickizer T, Lu B. Does time pressure create barriers for people to receive preventive health services? Prev Med. 2015 May;74:55–8. DOI:10.1016/j.ypmed.2015.02.009.
24. Laza C, Niño De Guzmán E, Gea M, Plazas M, Posso M, Rué M, et al. "For and against" factors influencing participation in personalized breast cancer screening programs: a qualitative systematic review until March 2022. Arch Public Health. 2024 Feb 22;82(1):23. DOI:10.1186/s13690-024-01248-x.

PREVENTIVE HEALTH EXAMINATIONS ACCORDING TO THE SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE POPULATION

Evelina Petraitytė, Daiva Skučienė, Eugenijus Dunajevas
Vilnius University, Faculty of Philosophy, Institute of Sociology and Social Work, Department of Social Policy

SUMMARY

Objective - to assess how individuals' participation in preventive health screening programs (blood pressure, mammography, cervical smear, cholesterol) is related to the individual's socioeconomic characteristics (gender, education, economic activity status, income).

Methodology - the study analyzed data from the 2019 Lithuanian Population Health Survey of the State Data Agency. The applied analysis methods were descriptive statistics, univariate and multivariate analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni post-hoc test.

Results - economic activity status was the most important factor differentiating participation in preventive screening: employed individuals were screened on average at an earlier age than old-age pensioners or persons not working due to disability. Education was associated only with cholesterol screening. Income was not a significant factor overall, but a slight trend was found in the female group that women with higher incomes had their blood pressure checked at an earlier age compared to those with lower incomes.

Conclusions - the most important factor influencing the performance of preventive health examinations is economic activity status. The influence of education is limited and was related only to the performance of cholesterol testing. Income was not significant for the performance of preventive health examinations. None of the studied socioeconomic characteristics was related to the performance of cervical smear testing.

Keywords: preventive health examinations; economic activity; education; income; gender.

Received 24 October 2025, accepted 30 March 2026

Correspondence to Evelina Petraitytė
Vilnius University, Faculty of Philosophy,
Institute of Sociology and Social Work,
Department of Social Policy
Universiteto g. 9, LT-01122 Vilnius, Lithuania
Email: evelinapetraityte@inbox.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-9

VAIKUS AUGINANČIŲ TĖVŲ POŽIŪRIS Į VAIKŲ SKIEPIJIMĄ: KOKYBINIS TYRIMAS

Algė Monika Karolytė, Ginreta Megelinskienė, Aušra Beržanskytė, Loreta Ašoklienė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

SANTRAUKA

Tikslas – atskleisti pagrindines priežastis, formuojančias Lietuvos tėvų požiūrį į vaikų skiepijimą.

Metodika. Atliktas kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruoto interviu metodą. Tyrime dalyvavo 20 skirtingą požiūrį į vakcinaciją turinčių tėvų iš įvairių Lietuvos miestų. Analizei atlikti taikyta kokybinė turinio analizė, išskiriant kategorijas ir subkategorijas pagal 5C modelį, t. y. siekiant įvertinti pasitikėjimą, nusiraminimą, kliūtis, išsamų vertinimą ir kolektyvinę atsakomybę.

Rezultatai ir apibendrinimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog tėvų požiūris į vakcinaciją nėra paprastas pasirinkimas „už" ar „prieš" – tai psichologinių, socialinių ir elgsenos veiksnių visuma. Vertinant tėvų atsakymus pagal 5C modelį pastebėta, jog pasitikėjimas yra viena svarbiausių priežasčių renkantis vakcinaciją: teigiamu požiūriu į vakcinaciją pasižymintys tėvai pasitiki vakcinų veiksmingumu, saugumu, sveikatos sistema, suvokia kolektyvinę atsakomybę. Abejojantys skiepų veiksmingumu tėvai ligų riziką suvokia kaip mažą, todėl vakcinaciją laiko nebūtina arba ją sieja su kai kurių ligų atsiradimu. Pastebėta, kad daliai tėvų kyla sunkumų norint paskiepyti vaikus – trūksta informacijos apie vakcinaciją iš gydytojų, kyla sunkumų nuvykti į gydymo įstaigą, suderinti vakcinacijos laiką su darbu. Ieškodami informacijos apie vakcinas tiek savarankiškai, tiek kalbėdamiesi su pažįstamais, tėvai dažniau atsirenka tik jų nuostatas patvirtinančią informaciją, o priešingą jų požiūriui informaciją stengiasi ignoruoti. Kadangi tėvų požiūris į vakcinaciją nėra paremtas vien tik žiniomis, būtina nuosekliai gerinti sveikatos specialistų kompetencijas bei komunikacinius gebėjimus: kiekvieną tėvą matyti kaip atskirą individą, suprasti jo asmenines patirtis, baimes ir informacijos poreikius.

Reikšminiai žodžiai: vaikų skiepijimas, požiūris į skiepijimą, vakcinacija.

ĮVADAS

Vakcinacija yra viena efektyviausių visuomenės sveikatos intervencijų, dėl kurios pasaulyje kasmet išvengiama nuo 3,5 iki 5 milijonų mirčių. Vienu ryškiausių vakcinacijos pasiekimų pasaulyje yra laikomas raupų išnaikinimas, tačiau įvairių šalių duomenys atskleidžia ir kitus reikšmingus rezultatus. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose XX a. pradžioje buvo suskaičiuojama apie 1000–200 tūkst. difterijos atvejų per metus, o įvedus vakcinaciją vietinių susirgimų nebenustatoma jau kelis dešimtmečius. Dėl nuoseklių vakcinacijos programų pasaulyje reikšmingai sumažėjo tymų, kokliušo, stabligės ir kitų užkrečiamųjų ligų paplitimas, o poliomielitą šiuo metu baigiama išnaikinti. Taigi vakcinacija iki šiol yra laikoma vienu efektyviausių ir veiksmingiausių būdų suvaldyti užkrečiamąsias ligas [1, 2].

Tarptautinės sveikatos organizacijos pabrėžia, jog aukštos skiepijimo aprėptys yra būtina užkrečiamųjų ligų kontrolės sąlyga. Pavyzdžiui, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – ECDC) duomenimis, norint pašalinti tymus, 95 proc. visuomenės turėtų būti pasiskiepiję dviem tymų, epideminio parotito ir raudonukės vakcinos (toliau – MMR vakcina) dozėmis. Dėl šios priežasties Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Pasaulinėje imunizacijos darbotvarkėje iki 2030 m.

Adresas susirašinėti: Algė Monika Karolytė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Sveikatos mokslų instituto
Visuomenės sveikatos katedra
M. K. Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius
El. p. monika.karolyte@mf.stud.vu.lt

numatyta siekti, kad visų šalių gyventojai turėtų lygias galimybes gauti nacionalinėse imunizacijos programose numatytus skiepus, o imunizacijos paslaugos pasiektų ir labiausiai pažeidžiamas visuomenes grupes [3, 4].

Lietuvoje vaikų skiepijimas organizuojamas pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių. Valstybės lėšomis vaikai nemokamai skiepijami nuo 14 užkrečiamųjų ligų: tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos, pneumokokinės infekcijos, žmogaus papilomos viruso, rotavirusinės bei B tipo meningokokinės infekcijos [5].

Lietuvos Nacionalinėje imunoprofilaktikos 2024–2028 m. programoje iškeltas tikslas „Didinti skiepijimo aprėptis ir užtikrinti ne mažesnes kaip 90 proc. vaikų skiepijimo aprėptis visoje šalyje ir kiekvienoje savivaldybėje, o nuo tymų ir raudonukės – ne mažesnes kaip 95 proc.“. Pastebima, jog skiepijant pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių iki 2009 m. buvo pasiekiamos gana aukštos skiepijimų aprėptys – nuo 94 iki 99 proc. įvairiose amžiaus grupėse, tačiau nuo 2010 m. stebimas vakcinacijos aprėpčių mažėjimas, kuris kelia vis didesnį iššūkį – užtikrinti gyventojų apsaugą nuo vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų, didinant skiepijimosi aprėptis [6].

Remiantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro naujausios vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų skiepijimo aprėpčių apžvalgos duomenimis, Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį vaikų vakcinacijos aprėptys nuosekliai mažėja. Pavyzdžiui, naujagimių skiepijimas nuo difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito ir B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos, lyginant 2011 ir 2024 m., sumažėjo apie 4 proc., MMR vakcinos antros dozės skepijimo aprėptys sumažėjo apie 8 proc. Taigi apsauga nuo vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų vaikų populiacijoje silpnėja [7].

Įvairiose šalyse atlikta nemažai tyrimų, siekiant išsiaiškinti skiepijimo aprėpčių mažėjimo priežastis. Kaip nurodoma Elawad ir kt. atliktoje sisteminėje apžvalgoje, tėvų apsisprendimą dėl vaikų imunizacijos lemia jų asmeninės nuostatos ir aplinkos veiksnių įtaka. Abejonės dėl vakcinacijos dažniausiai siejamos su tam tikromis visuomenėje pasitaikančiomis nuostatomis, nepasitikėjimu sveikatos priežiūros specialistais ir abejonėmis dėl vakcinų saugumo [8].

ECDC atkreipia dėmesį, kad visuomenės sveikatos institucijos dažniausiai analizuoja epidemiologines vaikų vakcinacijos tendencijas, tačiau kur kas rečiau siekia suprasti socialinius ir elgsenos veiksnius, kurie lemia tėvų apsisprendimą priimti arba atsisakyti skiepų. Sėkmingos vakcinacijos programos turėtų būti grindžiamos ne tik vakcinacijos aprėpčių stebėsena, bet ir žmonių požiūrio analize [9].

Šio tyrimo tikslas – atskleisti pagrindines priežastis, formuojančias Lietuvos tėvų požiūrį į vaikų skiepijimą.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Atliktas kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruoto interviu metodą.

Duomenims rinkti buvo parengtos interviu gairės pagal ECDC ir PSO rekomenduojamus klausimus, skirtus vakcinacijos pasirinkimo priežastims nustatyti. Remiantis 5C modeliu, interviu klausimai buvo suskirstyti į penkias pagrindines temas: pasitikėjimas, nusiraminimas, kliūtys, išsamus vertinimas ir kolektyvinė atsakomybė (angl. *Confidence, Complacency, Constraints, Calculation, Collective responsibility*). Pasitikėjimas apibrėžiamas kaip pasitikėjimas vakcinų saugumu, veiksmingumu ir sveikatos sistema; nusiraminimas – realios grėsmės užsikrėsti infekcine liga, nuo kurios galima pasiskiepyti, suvokimas; kliūtys – fiziniai ir psichologiniai sunkumai pasiskiepyti; išsamus vertinimas – procesas, kurio metu žmonės ieško informacijos ir ja remdamiesi įvertina rizikos ir naudos santykį, kad nuspręstų, ar jiems reikalinga vakcinacija; kolektyvinė atsakomybė – noras skiepytis siekiant apsaugoti ir kitus žmones. Šis tyrimas taip pat buvo papildytas temomis, susijusiomis su bendru tėvų požiūriu ir požiūrio kaita laikui bėgant, asmeninėmis ir artimųjų skiepijimo patirtimis, aplinkos įtaka pasirinkimui skiepyti [9].

Dalyvių buvo ieškoma elektroniniu paštu kreipiantis į bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas, taip pat socialiniuose tinkluose. Pagrindinis atrankos kriterijus – kviečiami tėvai, auginantys bent vieną vaiką iki 18 metų. Kvietime tėvų buvo prašoma nurodyti savo požiūrį į vakcinaciją bei palikti kontaktinius duomenis susisiekti. Vėliau taikyta tikslinė atranka, siekiant užtikrinti skirtingų požiūrių pasiskirstymą ir įtraukti tiek neigiamą, tiek teigiamą požiūrį turinčius tėvus.

Iš viso įvyko 20 interviu, per kuriuos 9 dalyviai nurodė turintys teigiamą požiūrį į vakcinaciją, 7 – neigiamą, 4

tėvai nurodė turintys abejonių dėl tam tikrų vakcinų. Tėvų amžius svyravo nuo 24 iki 51 metų, amžiaus vidurkis 38,0 ± 7,7 m. Tyrime dalyvavo 16 moterų ir 4 vyrai. 11 tėvų gyvena Vilniuje, likusieji Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje, Tauragėje, Skuode, Biržuose, Pabradėje, Kybartuose. Interviu trukmė svyravo nuo 17 iki 58 minučių, vidutinė trukmė – 31 minutė. 4 pokalbiai įvyko gyvai, likusieji – telefonu ir *Microsoft Teams* pokalbių platformoje.

Kiekvieno interviu pradžioje gautas informuotas žodinis asmens sutikimas dalyvauti ir sutikimas dėl pokalbio įrašymo, laikantis konfidencialumo principo. Vėliau interviu buvo transkribuoti pažodžiui ir analizuoti, taikant dedukcinę kokybinę turinio analizę – duomenis išskiriant į kategorijas ir subkategorijas pagal 5C modelio struktūrą. Analizės metu atrinktos mintys, atspindinčios tiriamųjų požiūrį ir jį lemiančias priežastis. Tyrimo patikimumui užtikrinti buvo laikomasi nuoseklaus duomenų rinkimo ir analizės principo, visi interviu atlikti vadojovaujantis ECDC ir PSO rekomenduojamų klausimų gairėmis. Duomenų rinkimas ir analizė vyko lygiagrečiai – po kiekvieno interviu atlikta transkripcija ir pirminė analizė, o tyrimas tęstas iki duomenų prisotinimo. Patikimumą didino informantų įvairovė: tyrime dalyvavo tėvai, turintys tiek teigiamą, tiek neigiamą požiūrį į vakcinaciją, besiskiriantys pagal amžių, lytį ir gyvenamąją vietą.

REZULTATAI

Vertinant tėvų patirtis ir išsakytas mintis apie vaikų vakcinaciją paaiškėjo, kad sprendimą skiepyti vaikus labiausiai lemia pasitikėjimas vakcinų veiksmingumu – būtent tai tėvai dažniausiai minėjo kaip pagrindinį argumentą, išreikšdami savo požiūrį. Svarbų vaidmenį tėvų pasirinkimui turėjo ir asmeninės bei artimųjų patirtys, informacijos prieinamumas ir atsirinkimas bei pasitikėjimas sveikatos sistema. Toliau pateikiami tyrimo rezultatai, susisteminti pagal 5C modelio komponentus.

Pasitikėjimas. Vaikus skiepijantys tėvai išreiškė pasitikėjimą vakcinų veiksmingumu: jų nuomone, net jei vakcinos neapsaugo nuo užsikrėtimo ligomis, tai tikrai sumažina patiriamų simptomų sunkumus ir apsaugo nuo komplikacijų: „Manau, apsaugo ir veiksmingos. Aišku, yra kažkokia tikimybė, kad užsikrėsi, bet nuo komplikacijų tikrai apsaugos“ (nr. 12). Tėvai paminėjo, kad jeigu vakcinos nebūtų veiksmingos, jos nebūtų taip plačiai taikomos visuomenėje ir kai kurios ligos nebūtų išnykusios būtent vakcinacijos dėka.

Kiti tėvai abejojo vakcinų veiksmingumu, remdamiesi tuo, kad paskiepyti asmenys vis tiek serga: „*Nu*, tai matom, kad neišnyksta, tymai tai bujoja. O visi paskiepyti. *Nu*, yra ir skarlatina, pavyzdžiui, tokia milžiniškai, *nu,* be proto sena liga. Ir ja serga paskiepyti vaikai. Tai niekas neapsaugo, niekas čia neišnyksta“ (nr. 3).

Toliau klausiant tėvų apie jų požiūrį į vakcinų saugumą, teigiamą požiūrį turintys tėvai atsakė, jog pasitiki mokslo pažanga ir tiki kontrolės procesu, t. y. tuo, kad vakcinos yra griežtai reguliuojamos, vertinamos ir užtikrinama apsauga galutiniam vartotojui: „Manau, kad saugios. Manau, kad mokslininkai ir medicinos specialistai tuo klausimu dirba daug laiko, atrasdami vakcinas, ir kai kurios yra jau seniai naudojamos ir nuolat tobulinamos. Manau, kad tai yra saugu“ (nr. 1). Taip pat tėvai nurodė, jog domėjosi vakcinų kūrimo procesu, ir tai tik dar labiau sustiprino jų pasitikėjimą vakcinų saugumu: „Saugu vakcinos. Domėjaus. Ten griežtai viskas vertinama, per visus etapus – gyvūnai, žmonės, prieš tai molekulinės sandaros, genetiniai visokie tyrimai. Nėra ko abejoti saugumu“ (nr. 10).

Abejojantys vakcinų saugumu tėvai jas siejo su nepageidaujamomis reakcijomis, daroma žala organizmui bei asmeniniais išgyvenimais: „Mano vaikai, kaip bebūtų, kad ir pusėtinai, bet skiepyti. Ir iš tikrųjų turi nuo gimimo ir atopinį dermatitą abi, ir alergiją turi viena dukra, ir itin jautrumą turi kita dukra… tai tas saugumas… nėra jos saugios. Nėra saugios“ (nr. 6).

Dalyvių buvo prašoma išsakyti nuomonę ir apie naujas vakcinas – šiame interviu dauguma tėvų atkreipė dėmesį į COVID-19 vakcinas, nes tai buvo jų pirmoji patirtis su visiškai naujomis, iki tol negirdėtomis vakcinomis. Teigiamai vertinantys vakcinaciją dalyviai buvo linkę pasitikėti ir naujomis vakcinomis, įvertindami ir tai, kad svarbu skirti laiko jomis pasidomėti: „Jei nauja, reiškia, reikia pasidomėti daugiau“ (nr. 20). Pavyzdžiui, teigiamą požiūrį dėl COVID-19 vakcinacijos turintys tėvai jautė tiek nerimą, tiek abejones, tačiau daugiau jomis pasidomėję nusiramino ir priėmė sprendimą skiepytis: „Na, tikrai visokių pasvarstymų būna apie tai, nes pavyzdžiui kovido, atrodo, greitai atsirado. Buvo abejonių, aišku, bet pasidomėjau ir nusiraminau“ (nr. 17).

Kitiems tėvams naujos vakcinos sukėlė abejonių dėl

skubos ir nepakankamo laiko jas tiriant: „*Nu*, nėra to laiko tarpo, kaip jos reaguoja organizme, kaip tie šalutiniai poveikiai. Nėra atsakymo, jas sukuria ir iškart visus bado“ (nr. 2). Taip pat buvo manoma, kad būtent COVID-19 vakcinos sukėlė įvairių sveikatos sutrikimų, apie kuriuos nėra kalbama visuomenėje: „Čia iš viso yra totali nesąmonė. Kovido vakcinos yra totali nesąmonė. Dabar pažiūrim, kiek yra su širdies ligom dabar, po kovido vakcinos, kiek infarktų, kiek insultų… kardiologai kai kurie šneka, bet jie negali garsiai šnekėti… mirties liudijime net įrašoma būna kartais kita diagnozė… vienu metu buvo mada rašyti, kad kovidas, visi mirė nuo kovido“ (nr. 4). Dalyvių nuomone, naujiems skiepams išbandyti reikia daugiau laiko, taip pat jiems atrodo, jog duomenų apie naujas vakcinas trūksta arba jie yra slepiami.

Kadangi sveikatos specialistai yra ne tik atsakingi už sklandų vakcinacijos procesą, bet ir atlieka svarbų vaidmenį formuojant tėvų nuostatas ir sprendimus dėl vaikų vakcinacijos, dalyvių buvo prašoma išsakyti savo mintis apie sveikatos priežiūros specialistus. Vaikus skiepijantys tėvai akcentavo, jog pasitiki gydytojais ir yra jiems dėkingi už sveikatos išsaugojimą: „Labai pasitikiu. Mano šeimos gydytoja išgelbėjo man gyvybę… Vaikų gydytoja labai faina… paaiškina viską apie skiepus paprastai“ (nr. 12). Dalis tėvų nurodė, jog nors ir pasitiki gydytojais, jų teikiamą informaciją vertina kritiškai ir skiria laiko pasidomėti ir patys, nes tai ne tik gydytojų, bet ir tėvų atsakomybė: „Bendrai – pasitikiu… Bet ne aklai… Skiepijimas – ne tik gydytojų atsakomybė, bet ir tėvų“ (nr. 13).

Vaikų neskiepijantys asmenys pasidalijo savo asmeninėmis patirtimis su sveikatos specialistais, dėl kurių kilo nepasitikėjimas vakcinacija: „Mediko požiūris buvo, kad nesvarbu, jog skiepytas, tai sirgt gali. Tai galvoju, tai kam tie skiepai tada. Norisi vis tiek apsaugos, didelės apsaugos“ (nr. 2). Taip pat nepasitikėjimą vakcinomis kėlė ir pačių gydytojų abejojimas, negalėjimas pagrįsti vakcinų saugumo: „Tegul jie padaro dokumentą ir patys prisiima atsakomybę, kad jeigu tu vakcinuosi, jokių šalutinių poveikių nebus ir vaikas nesirgs… tada pažiūrėsim, ar bent vienas pasirašys“ (nr. 5).

Dar viena svarbi nepasitikėjimo vakcinomis priežastis – sveikatos specialistai, kurie įtikino tėvus neskiepyti savo vaikų. Tėvai teigė, kad kai kurie gydytojai juos „apšvietė ir sustabdė pačiu laiku nuo klaidos“. Be to, dalyviai įvardijo supratę, jog dauguma gydytojų yra nekvalifikuoti, patys nežinantys, kaip atlikti paprasčiausius tyrimus, pavyzdžiui, viena dalyvė įsitikinusi, jog vitamino D tyrimas Lietuvoje atliekamas neteisingai.

Tėvai išreiškė ir nepasitikėjimą sveikatos sistema: „Šiandien skiepas yra tiesiog marketingas, pinigų kažkoks kapšelis ir sintetikos dozė. Kai tu paskiepiji, tu užtikrini gydytojams ir visai medicinos sistemai, kad tu ateityje sirgsi, eisi pas juos, neši pinigus“ (nr. 3). Tėvų nuomone, vakcinos yra sukurtos sukelti ligas ir skatinti žmones kreiptis dėl sveikatos paslaugų, iš kurių tie patys gydytojai ir sistema uždirba. Tikėjimas, kad visa sveikatos sistema yra nukreipta prieš žmogų, skatina juos nesinaudoti sveikatos paslaugomis (įskaitant vakcinaciją) ir taip apsaugoti save.

Nusiraminimas. Toliau, remiantis 5C modeliu, tėvų buvo klausiama apie nusiraminimą, kuris reiškė ligų keliamos rizikos vertinimą bei ligų rizikos ir vakcinacijos naudos lyginimą, kylančias abejones, natūralų imunitetą, protrūkių ir grėsmės vertinimą.

Paklausus tėvų, kaip jie vertina visuomenėje plintančių ligų grėsmę sveikatai, dalis jų nurodė, jog infekcinės ligos kelia didelę grėsmę sveikatai ir vakcinacija suvaldo šią grėsmę: „Didelė. Man būtų savigrauža, jeigu nebūčiau skiepijusi ir vaikas susirgtų“ (nr. 12). Tėvų nuomone, grėsmė ypač padidėja, kai vaikas lanko darželį ir kontaktuoja su kitais vaikais. Be to, atkreiptas dėmesys ir į tai, jog šalyse, kuriose skiepijama mažiau, ligos nėra suvaldomos ir infekcijos kyla daug dažniau: „Jeigu pažiūrėtume kitas šalis, kur mažiau išvystytas skiepijimas, tų ligų nemažai“ (nr. 13). Papildomai paklausus tėvų, ar vakcinacijos nepageidaujamų reakcijų rizika atsveria ligos komplikacijų riziką, teigiamą požiūrį į vakcinaciją turintys tėvai atsakė, jog kiekviena medicininė intervencija turi riziką, tačiau daug mažesnę nei ligų komplikacijų rizika, ypač turint omeny vaikus, kurių imunitetas nėra pakankamai stiprus apsiginti nuo visuomenėje plintančių infekcijų.

Tačiau kiti tėvai buvo linkę ligų grėsmę vertinti kaip mažą ar neturinčią didelės reikšmės, tikint, jog ligos yra įprastas reiškinys, su kuriuo sveikas žmogus susitvarkys ir be vakcinacijos: „Dažniausiai jos nėra mirtinos. Jeigu tu esi sveikas žmogus, vaikas, nesuterštas imunitetas, stiprus, paprasčiausiai persergi ta liga… geriau rinksiuosi prisiimti tą riziką ir susirgti ta liga“

(nr. 6). Viena dalyvė rėmėsi savo tikėjimu ir teigė, kad mirtinos ligos yra Dievo valia: „Pas musulmonus yra tikėjimas, kad Dievas lemia viską mūsų gyvenime. Be Dievo valios mes nesusirgtume mirtina liga“ (nr. 5). Taip pat dalis tėvų išsakė nuomonę, kad nors vakcinos gali apsaugoti, ši apsauga neatsveria vakcinų sunkių nepageidaujamų reakcijų tikimybės, todėl geriau pasitikėti natūraliu imunitetu.

Kalbant su tėvais apie ligų protrūkių grėsmę, teigiamai vakcinaciją vertinantys tėvai atsakė, jog visuomenė priprato gyventi be tam tikrų ligų ir nebejaučia atsakomybės skiepytis, todėl reikėtų griežtesnės reguliacijos dėl vakcinų: „Mes per gerai gyvenam… O kas nutiks, kai per mažai bus paskiepytų ir tavo vaikas sirgs?“; „Baisu… manau, griežtesnės reguliacijos reiktų“ (nr. 11). Kiti tėvai patvirtino šį teiginį, atsakydami, jog ligų protrūkiai jų negąsdina, nes su tuo asmeniškai nesusiduria: „Kol pati nesusidūriau, negalvoju apie tai… Kai pajausčiau savo kailiu – tada gal keltų baimę“ (nr. 14). Dalis tėvų teigė, jog Lietuvoje ligų atvejai labai reti ir nekelia grėsmės net ir mažėjant vakcinacijos aprėptims: „Realūs atvejai Lietuvoje labai reti; nemanau, kad neskiepijančių procentas atsvers tiek, kad kiltų epidemija“ (nr. 7). Be to, kai kurių dalyvių nuomone, protrūkiai yra sukuriami dirbtiniu būdu: „Pandemijos kas šimtmetį kartojasi, dirbtiniu būdu paleidžiama… Jei mažėja skiepijančių skaičius, tai mažėja pinigai… Čia negalim tiksliai pasakyti, kodėl tam tikros ligos grįžta“ (nr. 6).

Besirenkantys skiepyti savo vaikus tėvai teigė, jog imunitetą stiprinti reikia, tačiau kliautis vien natūraliu imunitetu būtų per daug rizikinga: „Aš manau, kad specialiai rinktis susirgti ir ieškoti būdų, kaip užsikrėsti liga, *nu*, tai nėra normalu turbūt“ (nr. 1). Dalyviai tikina suprantantys, kad natūraliai liga persirgus susiformavęs imunitetas yra gerai, bet nemato prasmės rizikuoti, kai yra saugesnis pasirinkimas – vakcinacija.

Neigiamai vakcinaciją vertinantys tėvai mano, kad pasitikėti turėtume būtent savo organizmu, o vakcinacija jį silpnina: „*Nu*, gal primityvu, bet man atrodo, kad taip: jeigu mes tiesiog skiepysim, tas imunitetas toks ilsėsis“ (nr. 2). Be to, jie yra tikri, kad natūralų imunitetą įgyji visam gyvenimui, o nuo vakcinacijos laikinai. Geriausia apsauga yra ligų prevencija, sveikatinimasis, gyvenimas gamtoje, o ir vaikai, kurie vaikšto ant šaltų grindų ir žiemą leidžia lauke, yra atsparūs ligoms, nuo kurių skiepijama. Tėvų teigimu, organizmas yra protinga sistema, galinti viską įveikti pati.

Kliūtys. Paklausus tėvų apie patį vakcinacijos procesą ir kokius sunkumus jis kelia, vieni atsakė, kad jokių kliūčių nėra, vakcinacijos procesas per pastaruosius 20 metų stipriai pažengė. Kiti turėjo pastebėjimų dėl sunkumų keliaujant iki poliklinikos („Kamščiai, parkingas… važiuojame toli pas savo gydytoją“; nr. 10) ar skiepijimo galimybės namuose: „Galėtų gal, pavyzdžiui, į namus atvykti paskiepyti, gal ne visi gali nuvykti į gydymo įstaigą“ (nr. 11).

Tėvai pasidalijo, kad, be atstumo, kyla sunkumų derinant vaiko vakcinaciją su savo darbu – tiek tariantis išvykti iš darbo, tiek stengiantis vakcinaciją atlikti prieš savaitgalį, kad tai netrukdytų darbo laiko. Viena mama pastebėjo, jog kildavo sunkumų ir derinant vakcinaciją su vaiko gyvenimo ritmu, pavyzdžiui, vykstant vakcinuoti vaiką, tekdavo jį pažadinti, dėl ko sutrikdavo visas dienos ritmas. Taigi tėvams vakcinacijos procese norisi kuo daugiau lankstumo ne tik iš gydymo įstaigų, bet ir darboviečių.

Taip pat dalyviai pastebėjo, kad kai kurie gydytojai nepasidalija informacija dėl skiepijimo – tėvai turi imtis iniciatyvos ir klausti patys.

Išsamus vertinimas. Paklausus dalyvių, kur ir kokios jie ieško informacijos apie vaikų vakcinaciją, dalis atsakė, kad neieško visai, nes sprendimą priėmė seniai ir neketina jo keisti, taip pat kad ši tema jų visai nedomina arba visą reikiamą informaciją susirinko per gyvenimo patirtį. Kiti nurodė, jog dažniausiai informacijos ieško internete, pavyzdžiui, naudodamiesi *Google* paieška, socialiniuose tinkluose (pvz.: *Facebook*, *Instagram*), įvairiuose tėvų forumuose arba pasitelkia dirbtinio intelekto pokalbių platformas, tokias kaip *ChatGPT*. Minimi ir tokie informacijos šaltiniai kaip gydytojų pateikiama informacija ar mokslinėse bazėse rasti nešališki straipsniai, įvairių sveikatos organizacijų ar asociacijų skelbiama informacija. Vienas asmuo nurodė, kad yra perskaitęs rusų kilmės rašytojo knygą, kuri prieš daug metų ir lėmė sprendimą neskiepyti savo vaikų. Internete paieška dažniausiai vyksta įrašant vakcinos pavadinimą bei jos nepageidaujamas reakcijas.

Paklausus, kokios informacijos trūksta, buvo nurodyta, kad galėtų egzistuoti valstybinė platforma, kurioje būtų sukaupta visa reikiama informacija su specialistų komentarais, vaizdine medžiaga, pavyzdžiui, videoformatu. Taip pat tėvams trūksta daugiau informacijos apie nepagei-

daujamas reakcijas, norėtųsi specifinės vietos su galimybe užduoti klausimus, rasti įrodymais grįstą informaciją, paneigiančią visuomenėje gyvuojančius mitus. Be to, norėtųsi ir paprastai pateiktos informacijos, pavyzdžiui, poliklinikose rasti knygelių ar lankstinukų, kuriuose būtų pateikiama visa informacija apie kiekvieną vaiko skiepą.

Patikimais buvo laikomi tokie šaltiniai, kuriuose nėra reklamų, informacija parašyta remiantis moksliniais tyrimais su nuorodomis į juos, informacija nešališka, parengta sveikatos specialistų bei mokslininkų: „Trūksta tiesiog nuoširdžios informacijos… Tie patys medikų straipsniai, jie visada nueina link skiepo reklamos… *Ant galo*… vėl užsakytas“ (nr. 2).

Paklausus, su kuo tėvai aptaria vaikų vakcinaciją, dažniausiai buvo minimi šeimos nariai bei kiti tėvai, turintys vaikų: „Su tuo, kas turi tokio panašaus amžiaus vaikus… Daugiau gal draugai, giminės“ (nr. 2). Tėvai atkreipė dėmesį ir į tai, jog renkasi kalbėtis apie vakcinaciją tik tuo atveju, jei kito žmogaus požiūris yra toks pat: „Aš kalbu tik su pavieniais, kurie turi tokį patį požiūrį… Su kitais nematau prasmės, kad mane durnintų ir kritikuotų… nesiveliu“ (nr. 6).

Kalbant su tėvais apie jų reakciją į priešingą jų požiūriui informaciją paaiškėjo, kad didžioji dauguma yra linkę ignoruoti kitokį požiūrį ir mano, jog jų nuostatų jau nebepakeisi: „Stengiuosi neigiamos neskaityti… ji nebūtinai moksliškai įrodyta“; „Būna, susimąstai pamatęs tą neigiamą, bet neturi įtakos požiūriui“ (nr. 6). Vienas tėvas atsakė, jog stengiasi būti atviras ir kitokiam požiūriui: „Stengiuosi laikyti atvirą nuostatą, kad mano žinios gali būti neteisingos, bet bendrai tai požiūris nesikeičia“ (nr. 19).

Kolektyvinė atsakomybė. Interviu pabaigoje tėvų buvo klausiama apie požiūrį į vakcinaciją kaip kolektyvinę atsakomybę. Vieni tėvai nurodė, kad tai laiko moraline pareiga ir solidarumo išraiška, suprasdami, kad taip apsaugo ne tik savo vaikus, bet ir kitus visuomenės narius: „Toks ir tikslas, kolektyviškai padaryti ir suvaldyti ligą. Kito kelio nėra“ (nr. 11). Tėvai išreiškė nusivylimą, kad kiti žmonės, priimdami sprendimą nesiskiepyti, kelia iššūkių suvaldant ligas ir neapsaugo pažeidžiamiausių visuomenės grupių.

Kiti tėvai galvoja, kad geriausia apsauga yra ligų prevencija, pavyzdžiui, nevaikščioti su vaikais po prekybos centrus. Be to, jų nuomone, net jei visi pasiskiepija, ligos nėra suvaldomos, o paskiepyti vaikai, atėję į darželį, kaip tik yra užkrečiami: „Vaiką paskiepija, jis ateina į darželį ir tos gyvos vakcinos, jos kaip tik yra užkrečiamos… Kodėl tėvai bijo, jei jų vaikas yra skiepytas… Taigi jūs pasiskiepiję esat, kaip gali apkrėsti neskiepytas vaikas skiepytą vaiką?“ (nr. 4).

Neigiamą požiūrį išsakantys tėvai teigia, kad visuomenėje yra per daug gąsdinimo ir kaltinimų pasirenkantiems nesiskiepyti, o pasiskiepiję turėtų nebijoti kelių procentų nesiskiepijančių žmonių. Teigiamą požiūrį turintys tėvai kaip tik baiminosi, kad dėl vakcinacijos aprėpčių mažėjimo ligos grįš, ir išreiškė norą, kad nesiskiepijantys suprastų, jog ligų komplikacijų pasitaiko dažniau nei skiepų komplikacijų.

REZULTATŲ APTARIMAS

Kaip nurodo Hammer ir kt., tikėjimas, kad vakcinos yra veiksmingos ir apsaugo žmones nuo ligų, yra viena svarbiausių priežasčių priimant sprendimą skiepytis [10]. Šis tyrimas patvirtino, kad pasitikintys vakcinomis tėvai neabejoja jų veiksmingumu, ypač turint omeny ligų komplikacijas. Tikėjimas, jog vakcinos apsaugos jų vaikus nuo ligų, yra pagrindinis motyvas skiepyti. Neskiepijantys vaikų tėvai veiksmingumu netiki – jie mano, kad skiepyti žmonės vis tiek serga, todėl nėra prasmės skiepytis. Taip pat vakcinos gali būti tiesioginė kai kurių ligų priežastis, todėl, jų nuomone, nesiskiepijimas ir yra savęs apsaugojimas. Tokius įsitikinimus gali formuoti ir klaidingos prielaidos, pavyzdžiui, manymas, kad nors vaikai yra skiepijami, jie vis tiek serga skarlatina, nors skarlatinos vakcinos apskritai nėra.

Pasitikintys vakcinomis tėvai pasitiki mokslo pažanga ir kontrolės procesu, jiems nekyla abejonių dėl vakcinų saugumo, o nepasitikintys vakcinų saugumu tėvai sieja tai su savo ar artimųjų asmeninėmis patirtimis – po vakcinacijos pastebėtomis ligomis ar sutrikimais, pvz.: atopiniu dermatitu, autizmo spektro sutrikimu ir pan. Čeponytės ir kt. atliktame tyrime nurodoma, jog apsisprendimui dėl vakcinacijos didžiausią įtaką turi būtent baimė dėl jau patirtų ar galimų nepageidaujamų reakcijų, tai buvo dažniausiai nurodoma vaikų neskiepijimo priežastis [11]. Pastaraisiais metais tėvų susirūpinimas dėl vakcinų saugumo kyla iš viešų diskusijų apie vakcinų ir autizmo ryšį, vakcinų sudėtį bei didelį injekcijų kiekį, o prie šių nuogąstavimų ženkliai prisidėjo COVID-19 pandemija, kuri paskatino visuomenės įsitraukimą ir susidomėjimą skiepais [12].

Teigiamą požiūrį turintiems tėvams tiek COVID-19 vakcinos, tiek kitos naujos vakcinos kelia tam tikrą nerimą ir abejonių, bet labiau pasidomėję ir pasikonsultavę su sveikatos priežiūros specialistais jie ramiau priima sprendimą skiepytis. Visgi kitiems tėvams naujos vakcinos asocijuojasi su nepakankamu jų ištyrimu, duomenų trūkumu ar net slėpimu. Jų nuomone, COVID-19 vakcinos sukėlė daugybę ligų ar sutrikimų, kurie visuomenėje nėra viešinami. Tokie įsitikinimai atitinka Lin ir kt. sisteminėje apžvalgoje minimus rezultatus: tik trečdalis respondentų pasitikėjo, jog vakcina bus patvirtinta tik įrodžius jos saugumą, o 41 proc. manė, kad vakcinos gali būti išleistos dar nepakankamai įvertinus jų saugumą. ECDC teigimu, įrodymai apie naujas vakcinas bei jų naudą ir riziką žmonių sveikatai kinta labai greitai, o tai kelia iššūkių visuomenės sveikatos institucijoms laiku įvertinti ir tinkamai informuoti visuomenę apie naujas vakcinas. Dėl šios priežasties rekomenduojama aiškiai informuoti apie vakcinų rizikos ir naudos santykį bei aktyviai reaguoti į žmonių baimes ir plintančią dezinformaciją [13, 14].

Tėvų pasitikėjimas sveikatos priežiūros specialistais yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių sprendimą dėl vaikų skiepijimo. Daugumai žmonių gydytojai ir slaugytojai yra patikimiausi informacijos teikėjai, o pasitikėjimas sveikatos specialistais lemia ir pasitikėjimą vakcinacija. Visgi dėl netinkamos gydytojų komunikacijos ar neužmegzto ryšio su pacientu tėvai dažniau yra linkę ieškoti alternatyvių informacijos šaltinių ir specialistų, o tai prisideda prie neigiamo požiūrio į vakcinaciją formavimo. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad pasitikėjimas sveikatos specialistais nebūtinai reiškia žmogaus pasitikėjimą vakcinomis, nes ir tarp sveikatos specialistų yra žmonių, turinčių neigiamą požiūrį į vakcinaciją bei skatinančių savo pacientus nesivakcinuoti ar nevakcinuoti vaikų [15]. Svarbu paminėti, kad šio tyrimo metu taip pat pastebėtas ir kai kurių tėvų nepasitikėjimas sveikatos priežiūros sistema – jie mano, kad vakcinos yra specialiai sukurtos tam, kad sukeltų ligas, skatintų žmones kreiptis dėl gydymo paslaugų, o iš to uždirba tiek sveikatos sistema, tiek sveikatos specialistai.

Remiantis Brewer ir kt., ligų rizikos vertinimas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių žmogaus apsisprendimą dėl vakcinacijos [16]. Autoriai išskiria 3 rizikos suvokimo formas: deliberatyvią riziką (užsikrėtimo tikimybės vertinimas), patirtinę riziką (ar grėsmė jaučiama, atrodo reali) ir afektinę riziką (nerimas, baimė ir kitos emocijos dėl ligos) bei pastebi, kad nerimas dėl užsikrėtimo motyvuoja žmones skiepytis ir taip apsisaugoti. Jei infekcinių ligų rizika atrodo nereikšminga, vakcinacija gali būti vertinama kaip perteklinis procesas. Šio tyrimo dalyviai sakė, kad jaustų kaltę, jei neskiepytų savo vaikų, ypač kai vaikai lanko darželį, kontaktuoja su kitais vaikais ir nuolat patiria grėsmę užsikrėsti infekcinėmis ligomis. Kiti tėvai mano, kad jų vaikų organizmai yra pakankamai stiprūs, todėl ir be vakcinacijos gali įveikti infekcines ligas, o vakcinacija nereikalinga. Taigi tėvų požiūris į ligų keliamas grėsmes tiesiogiai formuoja jų požiūrį į vakcinaciją.

Be to, vieni tėvai teigė, kad ligų protrūkius supranta kaip grėsmę, todėl vakcinacija yra būdas nuo to apsaugoti save ir visuomenę, kiti tėvai galvoja atvirkščiai – jokios grėsmės nėra, o realūs atvejai Lietuvoje yra ypač reti, todėl poreikio vakcinuotis nėra.

Išsakydami nuomonę apie natūralų imunitetą visi tėvai pritarė, kad imunitetą stiprinti reikia ir būtina, tačiau vakcinaciją palaikantys tėvai mano, jog vien natūraliu imunitetu pasitikėti nereikėtų, o vakcinacijos nepalaikantys tėvai mano, kad reikėtų pasitikėti vien savo organizmu, nes vakcinacija imunitetą silpnina. Įdomu tai, jog pasirinkimas tarp vakcinomis suformuoto imuniteto ir natūralaus imuniteto persirgus ligomis gali priklausyti ir nuo tėvų įsitikinimo, jog tai, kas „natūralu“, yra neabejotinai gerai, o kas „nenatūralu“, visada yra blogai. Tokie žodžiai kaip „natūralus“, „organinis“, „iš gamtos“ sukuria įsitikinimą, kad žmogaus sveikatai natūralesnis pasirinkimas yra visais atvejais geriau [17].

Paprašius įvardyti kliūtis, su kuriomis susiduria tėvai, vakcinuojantys savo vaikus, dažniausiai buvo paminėtas atstumas ir sunkumai keliaujant iki gydymo įstaigos. ECDC taip pat pastebi, kad gyvenimas atokiose vietovėse bei didelis atstumas iki gydymo įstaigos gali tapti nesiskiepijimo priežastimi. Šią problemą būtų galima spręsti pasinaudojant Slovakijos gerąja praktika – čia 2021 m. įkurtos mobiliosios vakcinacijos komandos, kurios vyko pas žmones, negalinčius atvykti skiepytis [9]. Taip pat buvo paminėta problema – per mažas gydytojų ir slaugytojų įsitraukimas konsultuojant dėl vakcinacijos: tėvai tikisi specialistų iniciatyvumo ir daugiau laiko šiai temai, atsakant į visus rūpimus klausimus.

Analizuojant dalyvių atsakymus apie vakcinacijos vertinimo procesą ir informacijos paieškos būdus pastebėta, jog dažniausiai tėvai informacijos ieško internete, pavyzdžiui, naudodamiesi *Google* paieška, socialiniais tin-

klais ar naudoja naujas priemones, tokias kaip dirbtinio intelekto pokalbių platformos. Tėvai išreiškė informacinės sistemos poreikį, kurioje galėtų rasti visą reikiamą moksliniais šaltiniais pagrįstą informaciją apie vaikų vakcinas. Jones ir kt. autorių teigimu, tėvai remiasi įvairiais šaltiniais: sveikatos priežiūros specialistais, žiniasklaida, artimųjų išsakyta informacija bei internetu. Visgi internetui prioritetą teikiantys tėvai rečiau nei kiti pasitiki oficialių sveikatos institucijų teikiama informacija ir dažniau pritaria teiginiams, kad skiepai sukelia daugiau žalos nei naudos. Wang ir kt. duomenimis, internetas sudaro sąlygas žmonėms greitai rasti reikiamą informaciją, bet lygiai taip pat tampa puikiu įrankiu plisti tikrovės neatitinkančiai informacijai. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas socialiniams tinklams, nes juose klaidinga informacija dažnai sulaukia daugiau susidomėjimo ir pasiekia daugiau vartotojų [18, 19].

Kadangi tėvai vakcinaciją dažniausiai aptaria uždarame socialiniame rate, kuriame vyrauja panašios nuostatos, o diskusijų su kitokį požiūrį turinčiais asmenimis vengia, tampa sudėtinga pateikti jiems jų požiūriui priešingą informaciją. Vengimas įsitraukti į konfliktines situacijas rodo, kad komunikacijos forma ir dialogo kūrimo būdas gali būti esminiai veiksniai siekiant efektyviai aptarti vakcinacijos klausimus su tėvais.

Kolektyvinį imunitetą palaikantys tėvai išreiškė nusivylimą, kad žmonės, priimdami sprendimą nesiskiepyti, kelia grėsmę visuomenei ir ypač pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Kiti tėvai atkreipė dėmesį į tai, jog visuomenėje yra per daug gąsdinimo ir kaltinimų tiems, kurie renkasi nesiskiepyti. Anot jų, pasiskiepijusieji neturėtų bijoti tų, kurie nesiskiepija, nes tada prieštarauja patys sau tikėdami, kad vakcinos juos apsaugo. Taigi kolektyvinė atsakomybė nėra universali – vieniems tėvams tai moralinė pareiga, kitiems – nereikalingas spaudimas ir gąsdinimo taktika. Ypač didelė atskirtis ir padidėjusi įtampa tarp pasiskiepijusiųjų ir nepasiskiepijusiųjų pastebėta COVID-19 pandemijos metu [20].

APIBENDRINIMAS

Šis tyrimas atskleidė, jog tėvų požiūris į vaikų vakcinaciją nėra paprastas pasirinkimas „už“ ar „prieš“, tai psichologinių, socialinių ir elgsenos veiksnių visuma. Remiantis 5C modeliu išryškėjo, kad vienas svarbiausių sprendimą lemiančių veiksnių yra pasitikėjimas, apimantis ne tik vakcinų veiksmingumo vertinimą, bet ir platesnį santykį su sveikatos sistema bei institucijomis.

Rezultatai rodo, kad tėvai nėra linkę priimti kitokio požiūrio – jie linkę kalbėtis tik su panašiai kaip jie manančiais žmonėmis, o pamatę ar išgirdę prieštaraujančią jų požiūriui informaciją ją ignoruoja arba pradeda ginčyti. Nors vieni tėvai palaiko vakcinaciją ir teigia, kad svarbiausia remtis mokslu, kitiems neigiamos asmeninės patirtys tampa nenuginčijamu įrodymu nusprendžiant nesiskiepyti. Visuomenėje diskusija apie vakcinaciją yra tapusi emociniu ginču, kuriame kiekviena pusė gina savo patirtį. Kadangi tėvai remiasi savo asmenine patirtimi ir atsirenka jų požiūrį patvirtinančią informaciją, pateikti vien faktinę informaciją nepakanka – kartu būtina stiprinti pasitikėjimą bei kurti konstruktyvų dialogą.

Pastebėta, jog tėvų sprendimą lemia ne tik požiūris, bet ir praktinės kliūtys. Dalies tėvų vakcinacijos procesą apsunkina ir informacijos trūkumas iš sveikatos priežiūros specialistų, laiko stoka, sunkumai derinant vakcinacijos laiką su darbu ar pasiekiant gydymo įstaigas. Šios kliūtys gali prisidėti prie vakcinacijos atidėjimo ar atsisakymo.

Atsižvelgiant į tai, jog tėvų požiūris į vakcinaciją nėra susijęs vien su žiniomis, būtina nuosekliai gerinti sveikatos specialistų kompetencijas ir komunikacinius gebėjimus: kiekvieną tėvą matyti kaip atskirą individą, suprasti jo asmenines patirtis, baimes ir informacijos poreikius. Tik įsiklausant į individualias istorijas ir jas gerbiant galima sukurti dialogą, kuris būtų ne priešiškas, o paremtas pasitikėjimu ir bendru tikslu – vaiko ir visuomenės apsauga.

Straipsnis gautas 2026-03-10, priimtas 2026-05-08

Literatūra

1. World Health Organization. Vaccines and immunization. Prieiga per internetą: https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization [žiūrėta 2025 m. gruodžio 4 d.].
2. Amanna IJ, Slifka MK. Successful Vaccines. Curr Top Microbiol Immunol. 2020;428:1–30. DOI:10.1007/82_2018_102.
3. European Centre for Disease Prevention and Control. Measles on the rise again in Europe: time to check your vaccination status. 2025. Prieiga per internetą: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/measles-rise-again-europe-time-check-your-vaccination-status [žiūrėta 2025 m. gruodžio 4 d.].
4. World Health Organization. Immunization Agenda 2030. Prieiga per internetą: https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030 [žiūrėta 2025 m. lapkričio 23 d.].
5. V-955 Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c7bf0da1ab8f11e8aa33fe8f0fea665f/asr [žiūrėta 2025 m. gruodžio 4 d.].
6. V-192 Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2024–2028 metų programos patvirtinimo. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f827fd31c9e811ee9269b566387cfecb?jfwid=-yvz4v411b [žiūrėta 2025 m. lapkričio 23 d.].
7. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų skiepijimo aprėpčių apžvalga 2024 m. Prieiga per internetą: https://nvsc.lrv.lt/public/canonical/1756808764/8263/Vakcinomis%20valdom%C5%B3%20u%C5%BEkre%C4%8Diam%C5%B3j%C5%B3%20lig%C5%B3%20skiepijimo%20apr%C4%97p%C4%8Di%C5%B3%20ap%C5%BEvalga%202024%20m_.pdf [žiūrėta 2025 m. lapkričio 24 d.].
8. Mohamed Elawad SAO, Yagoub Mohammed AA, Ali Karar SA, Hassan Farah AA, Mubarak Osman AME. Vaccination Hesitancy and Its Impact on Immunization Coverage in Pediatrics: A Systematic Review. Cureus. 2024 Dec;16(12):e76472. DOI:10.7759/cureus.76472.
9. European Centre for Disease Prevention and Control, European Food Safety Authority. Tools and methods for promoting vaccination acceptance and uptake: a social and behavioural science approach. LU: Publications Office; 2025. Prieiga per internetą: https://data.europa.eu/DOI/10.2900/7701140 [žiūrėta 2025 m. lapkričio 24 d.].
10. 1Hammer CC, Cristea V, Dub T, Sivelä J. High but slightly declining COVID-19 vaccine acceptance and reasons for vaccine acceptance, Finland April to December 2020. Epidemiol Infect. 2021 May 11;149:e123. DOI:10.1017/S0950268821001114.
11. Čeponytė K, Narkevičiūtė E, Beržanskytė A, Burokienė S. Determinants of Parental Attitudes towards Children's Vaccination in Lithuania: An Online Survey. Acta Med Litu. 2024;31(1):23–34. DOI:10.15388/Amed.2024.31.1.7.
12. Obohwemu K, Christie-de Jong F, Ling J. Parental childhood vaccine hesitancy and predicting uptake of vaccinations: a systematic review. Prim Health Care Res Dev. 2022 Nov 4;23:e68. DOI:10.1017/S1463423622000512.
13. Lin C, Tu P, Beitsch LM. Confidence and Receptivity for COVID-19 Vaccines: A Rapid Systematic Review. Vaccines (Basel). 2020 Dec 30;9(1):16. DOI:10.3390/vaccines9010016.
14. European Centre for Disease Prevention and Control (EU body or agency). Effective communication around the benefit and risk balance of vaccination in the EU/EEA. Publications Office of the European Union; 2024. Prieiga per internetą: https://data.europa.eu/DOI/10.2900/274174 [žiūrėta 2025 m. gruodžio 8 d.].
15. Dubé È, Ward JK, Verger P, Macdonald NE. Vaccine Hesitancy, Acceptance, and Anti-Vaccination: Trends and Future Prospects for Public Health. Annu Rev Public Health. 2021 Apr 1;42:175–191. DOI:10.1146/annurev-publhealth-090419-102240.
16. Brewer NT, Chapman GB, Rothman AJ, Leask J, Kempe A. Increasing Vaccination: Putting Psychological Science Into Action. Psychol Sci Public Interest. 2017 Dec;18(3):149–207. DOI:10.1177/1529100618760521.
17. Dudley MZ, Privor-Dumm L, Dubé È, MacDonald NE. Words matter: Vaccine hesitancy, vaccine demand, vaccine confidence, herd immunity and mandatory vaccination. Vaccine. 2020 Jan 22;38(4):709–711. DOI:10.1016/j.vaccine.2019.11.056.
18. Jones AM, Omer SB, Bednarczyk RA, Halsey NA, Moulton LH, Salmon DA. Parents' Source of Vaccine Information and Impact on Vaccine Attitudes, Beliefs, and Nonmedical Exemptions. Adv Prev Med. 2012;2012:932741. DOI:10.1155/2012/932741.
19. Wang Y, McKee M, Torbica A, Stuckler D. Systematic Literature Review on the Spread of Health-related Misinformation on Social Media. Soc Sci Med. 2019 Nov;240:112552. DOI:10.1016/j.socscimed.2019.112552.
20. Willemsen L, Serafini C, Butler J, Ergün S, van Prooijen JW. Polarization in the COVID-19 pandemic: The impact of vaccination status and conspiracy theories. Ann N Y Acad Sci. 2025 Sep;1551(1):270–279. DOI:10.1111/nyas.15408.

ATTITUDES OF PARENTS RAISING CHILDREN TOWARD CHILD VACCINATION: A QUALITATIVE STUDY

Algė Monika Karolytė, Ginreta Megelinskienė, Aušra Beržanskytė, Loreta Ašoklienė
Vilnius University, Faculty of Medicine, Institute of Health Sciences, Department of Public Health

SUMMARY

Objective - to identify the main reasons shaping Lithuanian parents' attitudes towards childhood vaccinations.

Methodology. A qualitative study was conducted using a semi-structured interview method. Twenty parents from different cities in Lithuania with different attitudes towards vaccination participated in the study (9 - positive, 7 - negative, 4 - uncertain). The questions were prepared based on the 5C model recommended by the ECDC to assess confidence, complacency, constraints, risk calculation, and collective responsibility. Content analysis was used to perform a qualitative content analysis, with data divided into categories and subcategories.

Results and summary. The results of the study revealed that parents' attitudes toward vaccination are not simply a matter of being "for" or "against" it – they are influenced by a combination of psychological, social, and behavioral factors. When evaluating parents' responses according to the 5C model, it was observed that trust is one of the most important reasons for choosing vaccination: parents with a positive attitude trust the effectiveness and safety of vaccines and the healthcare system, and demonstrate a sense of collective responsibility. Parents who doubt the effectiveness of vaccines perceive the risk of disease as low, therefore they consider vaccination unnecessary or associate it with the onset of certain diseases. It has been observed that some parents encounter obstacles in the vaccination process – they lack information about vaccination from doctors, have difficulty getting to the healthcare facilities, or have trouble coordinating vaccination times with work. When looking for information about vaccines, both independently and through conversations with acquaintances, parents tend to select only information that confirms their views and ignore information that contradicts them. Since parents' attitudes toward vaccination are not solely a matter of knowledge, it is necessary to consistently improve competencies and communication practices among health professionals: by viewing each parent as an individual, to understand their personal experiences, fears, and information needs.

Key words: childhood vaccination, attitudes towards vaccination, vaccination.

Received 10 March 2026, accepted 8 May 2026

Correspondence to Algė Monika Karolytė
Vilnius University, Faculty of Medicine
Institute of Health Sciences,
Department of Public Health
M. K. Čiurlionio str. 21/27, LT-03101 Vilnius,
Lithuania
E-mail: monika.karolyte@mf.stud.vu.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-6

PACIENTŲ ŽINIOS APIE PERIODONTO LIGAS

Gintarė Donata Kubiliūtė, Greta Aidukaitė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institutas

SANTRAUKA

Darbo tikslas – ištirti pacientų, besikreipiančių į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institutą (VU MF OI), žinias apie periodontą bei jo ligas, palyginti žinių sąsajas su sociodemografiniais ir klinikiniais rodikliais.

Metodika. Nuo 2025 m. vasario 20 iki spalio 10 d. vykdytame skrespjūvio tyrime buvo kviečiami dalyvauti visi pilnamečiai asmenys, besikreipiantys į VU MF OI dėl periodontologinio gydymo, kurie žodžiu ir raštu patvirtino sutinkantys dalyvauti tyrime. Apskaičiuota reikalinga tyrimo imtis – 385 respondentai. Tyrimo metu buvo renkamos pacientų užpildytos anoniminės anketos, kurias sudarė 30 klausimų. Taip pat apžiūros metu buvo surinkti klinikiniai duomenys apie respondentus ir pažymėti apklausoje. Informacija analizuota statistinėmis programomis *IBM SPSS*, *Microsoft Excel*. Rezultatai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p reikšmė <0,05.

Rezultatai. Tyrime dalyvavo 385 respondentai, iš jų 175 (45,5 proc.) buvo moterys ir 210 (54,5 proc.) vyrų. Surinktos 305 (79,2 proc.) anketos lietuvių kalba ir 80 (20,8 proc.) anketų anglų kalba. Rezultatai parodė, jog tiriamųjų žinios apie periodontą ir jo ligas yra nepakankamos. Žemo žinių lygio grupėje buvo statistiškai reikšmingai daugiau 60+ m. amžiaus grupės respondentų ($p < 0,001$), ekonomiškai neaktyvių asmenų ($p < 0,001$), žemo ir vidutinio išsilavinimo asmenų ($p < 0,01$), miestelių ir kaimų gyventojų ($p < 0,001$). Taip pat žemo žinių lygio grupėje buvo statistiškai reikšmingai daugiau tų asmenų, kurių burnos higiena buvo bloga ($p < 0,001$) ir kuriems buvo diagnozuotas išplitęs periodontitas ($p < 0,001$).

Išvados. Pacientai, besikreipiantys į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos institutą (VU MF OI), pasižymėjo nepakankamomis periodonto sveikatos žiniomis. Švietimo programos turėtų būti orientuotos į periodonto sveikatos žinių didinimą bei efektyvių burnos higienos įpročių formavimą. Tokios prevencinės iniciatyvos ypač tikslingos vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, ekonomiškai neaktyviems ir miesteliuose ar kaimo vietovėse gyvenantiems pacientams.

Reikšminiai žodžiai: periodonto ligos, periodontitas, žinios, mitai, burnos sveikata.

ĮVADAS

Periodonto ligos – tai plačiai paplitusios sveikatos būklės, turinčios reikšmingą neigiamą poveikį žmogaus gyvenimo kokybei [1, 2]. 2019 m. nustatyta, jog sunkiu periodontitu sirgo apie 1,1 mlrd. žmonių [3]. Periodontitas gali sukelti minkštųjų audinių ir kaulo irimą, dantų netekimą bei sutrikdyti kramtymo funkciją, bloginti estetiką [4, 5, 6, 7]. Moksliniai įrodymai patvirtina dvipusį ryšį tarp periodonto ligų ir bendrosios sveikatos – periodonto ligos gali turėti neigiamą poveikį sisteminėms organizmo būklėms, o tam tikros sisteminės ligos gali prisidėti prie periodonto ligų išsivystymo [8]. Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžia, kad periodonto ligos dėl sąsajų su kitomis lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, onkologiniai susirgimai, yra reikšminga visuomenės sveikatos problema [9].

Nors periodonto ligų prevencija pirmiausia grindžiama tinkama burnos higiena, pacientų žinios, požiūris ir elgsena yra esminiai veiksniai, turintys įtakos gydymo sėkmei [10]. Nepaisant augančio dėmesio burnos sveikatai, visuomenės sveikatos raštingumas vis dar nepakankamas, o dėl klaidingų įsitikinimų apie periodonto

Adresas susirašinėti: Gintarė Donata Kubiliūtė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Odontologijos institutas
Žalgirio g. 117, 08215 Vilnius
El. p. gintare.kubiliute@mf.stud.vu.lt

ligas dažnai pavėluotai kreipiamasi į specialistus, prastai laikomasi gydymo rekomendacijų ir nepakankamai naudojamos profilaktikos priemonės [11, 12, 13].

Šiuo tyrimu siekiama įvertinti VU MF OI pacientų žinias apie periodontą ir jo ligas. Gauti rezultatai leistų nustatyti reikšmingiausias žinių spragas, rengti kryptingas edukacines programas rizikos grupėms, galinčias pagerinti gydymo rekomendacijų laikymąsi ir periodonto gydymo sėkmę.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Skerspjūvio tyrimas buvo atliekamas nuo 2025 m. vasario 20 iki spalio 10 d. Į tyrimą įtraukti visi pilnamečiai pacientai, kurie žodžiu ir raštu patvirtino sutinkantys dalyvauti tyrime ir kreipėsi į VU MF OI tiek lietuvių, tiek tarptautinių grupių studentus dėl periodontologinio gydymo. Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas tyrimui nebuvo reikalingas, remiantis rekomendacijomis ir galiojančiomis etikos gairėmis [14]. VU MF OI duomenimis, per 2024 metus jame apsilankė apie 10 100 pacientų. Tyrimui reikalinga imtis apskaičiuota remiantis Paniotto formule [15, 16]:

$n = 1 / (\Delta 2 + 1/N)$, kai

n = imties dydis; Δ = paklaidos dydis; N = generalinė aibė.

Gauta, jog tyrimo imtį turėtų sudaryti 385 respondentai, kai paklaida 0,05 su 95 proc. tikimybe. Tyrime buvo taikytas tyrėjos sudarytas anoniminis popierinis klausimynas, parengtas remiantis tyrimo tikslu, uždaviniais bei panašių mokslinių tyrimų apklausomis. Prieš parengiant galutines anketas, siekiant užtikrinti apklausų patikimumą ir aiškumą, 30 pilnamečių asmenų grupei buvo padalytos bandomosios apklausos lietuvių bei anglų kalbomis. Atsižvelgiant į tiriamųjų pastabas, atliktas klausimynų koregavimas. Tyrimo metu apklausos buvo pateikiamos dviem kalbomis: Lietuvos Respublikos piliečiai apklausas pildė lietuvių kalba, o užsieniečiai – anglų kalba.

Anketą sudarė:

1. 5 sociodemografiniai klausimai: lytis; amžius (siekiant užtikrinti *chi* kvadrato testo prielaidų atitiktį, dalis kintamųjų buvo pergrupuoti – vyresnio amžiaus (60–69, 70–79 ir 80+ m.) respondentų grupės buvo sujungtos į vieną 60+ m. amžiaus kategoriją); socialinė padėtis (studijuojantys (moksleiviai ir studentai), ekonomiškai aktyvūs (dirbantys asmenys), ekonomiškai neaktyvūs (bedarbiai, neįgalieji ir pensininkai); išsilavinimas (žemas ar vidutinis (pagrindinis, vidurinis ir aukštesnysis), aukštas (aukštasis koleginis ir aukštasis universitetinis); gyvenamoji vieta (buvo fiksuojama pagal respondentų atsakymus į klausimą, kuriame reikėjo pažymėti vieną iš trijų kategorijų: miestas; miestelis; kaimas. Siekiant užtikrinti *chi* kvadrato testo prielaidų atitiktį, miestelio ir kaimo vietovės buvo sujungtos į vieną kategoriją).
2. 10 klausimų, skirtų įvertinti tiriamųjų burnos sveikatos žinias. Žinios analizuotos naudojant 5 balų Likerto skalę: 1 – „Visiškai sutinku“, 2 – „Sutinku“, 3 – „Nežinau“, 4 – „Nesutinku“, 5 – „Visiškai nesutinku“. Rezultatai buvo interpretuojami kaip bendra visų atsakymų balų suma – mažesnis balas indikavo geresnes burnos sveikatos žinias, o didesnis – prastesnes. Dauguma atvejų teisingiausiu atsakymu laikytas variantas 1 – „Visiškai sutinku“. Išimtį sudarė anketos klausimas, susijęs su skalavimo skysčių nuo dantenų kraujavimo naudojimo saugumu, teisingiausiu atsakymu į jį laikytas variantas 1 – „Visiškai nesutinku“. Šio klausimo atsakymai buvo įvertinti inversine tvarka pagal Likerto skalę: 5 – „Visiškai sutinku“, 4 – „Sutinku“, 3 – „Nežinau“, 2 – „Nesutinku“, 1 – „Visiškai nesutinku“.
3. 10 klausimų, skirtų įvertinti tiriamųjų tikėjimą burnos sveikatos mitais. Atsakymai analizuoti pagal 5 balų Likerto skalę: 5 – „Visiškai sutinku“, 4 – „Sutinku“, 3 – „Nežinau“, 2 – „Nesutinku“, 1 – „Visiškai nesutinku“. Teisingiausiu atsakymu laikytas variantas 1 – „Visiškai nesutinku“.
4. 3 klinikiniai duomenys – individualiai kiekvienam respondentui studentų pildoma dalis: apnašų kontrolės įgūdžių indeksas (O'Leary) (geri įgūdžiai, kai O'Leary ≤10 proc.; reikalingos papildomos specialios burnos higienos instrukcijos, kai O'Leary >10 proc.), supaprastintas burnos higienos indeksas (OHI-s) (suskirstytas į kategorijas: puiki; gera; patenkinama; bloga) bei diagnozė (sveiki periodonto audiniai; gingivitas; vietinis periodontitas; išplitęs periodontitas; kita (vieta įrašyti nepaminėtai periodontologinei diagnozei).

Siekiant klasifikuoti respondentų burnos sveikatos žinių lygį buvo taikyta tercilių metodika. Visi klausimai vertinti pagal penkiabalę Likerto skalę, o kiekvieno respondento atsakymai buvo susumuoti, siekiant gauti bendrą balų skaičių. Bendri balai suskirstyti į tris apytikriai vienodo dydžio grupes (tercilius), atspindinčias skirtingą žinių lygį.

Duomenys analizuoti statistinės programos *IBM SPSS* 31.0 versija (IBM, NY, US). Grafinei duomenų vizualizacijai naudota *Microsoft Excel* „Microsoft 365“ MSO (2401 versijos komponavimo versija 16.0.17231.20236) programa. Duomenų pasiskirstymo normalumui įvertinti taikytas Šapiro-Vilko testas. Kokybiniams duomenims buvo apskaičiuoti dažniai (proc. ir vnt.). Siekiant nustatyti statistiškai reikšmingus rezultatų skirtumus, buvo taikytas neparametrinis *chi* kvadrato testas. Nustačius reikšmingą *chi* kvadrato rezultatą, papildomai atlikta analizė, taikant koreguotas standartizuotas liekanas (angl. *adjusted standardized residuals*), siekiant identifikuoti konkrečias reikšmingas grupių kombinacijas. Rezultatai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p reikšmė <0,05.

1 lentelė. Tiriamųjų sociodemografinių ir klinikinių rodiklių pasiskirstymas

Kategorija	Kategorijos reikšmės	N	%
Lytis	Moteris	175	45,5
	Vyras	210	54,5
Amžiaus grupė (metais)	18–29	136	35,3
	30–39	85	22,1
	40–49	61	15,8
	50–59	58	15,1
	60–69	31	8,1
	70–79	12	3,1
	80+	2	0,5
Išsilavinimas	Pagrindinis	3	0,8
	Vidurinis	101	26,2
	Aukštesnysis	63	16,4
	Koleginis	74	19,2
	Universitetinis	144	37,4
Socialinė padėtis	Bedarbiai	28	7,3
	Dirbantieji	253	65,7
	Moksleiviai	3	0,8
	Neįgalieji	9	2,3
	Pensininkai	28	7,3
	Studentai	64	16,6
Gyvenamoji vieta	Miestas	335	87
	Miestelis	19	4,9
	Kaimas	31	8,1
Apnašų kontrolės indeksas (O'Leary)	Apnašų kontrolės įgūdžiai geri	15	3,9
	Reikalingos papildomos specialios burnos higienos instrukcijos	370	96,1
Supaprastintas burnos higienos indeksas (OHI-s)	Puiki burnos higiena	1	0,3
	Gera burnos higiena	96	24,9
	Patenkinama burnos higiena	198	51,4
	Bloga burnos higiena	90	23,4
Klinikinės diagnozės	Išplitęs periodontitas	171	44,4
	Gingivitas	154	40
	Vietinis periodontitas	34	8,8
	Sveiki periodonto audiniai	25	6,5
	Kliniškai sveikos dantenos su ankstesniu periodonto jungties netekimu	1	0,3

REZULTATAI

Tiriamųjų aprašymas

Tyrimo metu surinkta 418 anketų, iš kurių 33 neįtrauktos dėl nepilnai atsakytų klausimų. Galutinis surinktų apklausų skaičius buvo 385 ir atitiko tyrimo imtį. Gautos 305 (79,2 proc.) anketos lietuvių kalba ir 80 (20,8 proc.) anketų anglų kalba. Tyrime dalyvavo 175 (45,5 proc.) moterys ir 210 (54,5 proc.) vyrų. Pagal amžių respondentai suskirstyti į grupes, daugiausia (136; 35,3 proc.) respondentų buvo 18–29 m. amžiaus grupėje. Analizuojant apklaustųjų pasiskirstymą pagal išsilavinimą nustatyta, kad daugiausia (144; 37,4 proc.) respondentų turėjo universitetinį išsilavinimą. Pagal socialinę padėtį dauguma (253; 65,7 proc.) apklaustųjų buvo ekonomiškai aktyvūs. Vertinant pagal gyvenamąją vietą nustatyta, kad dauguma (335; 87 proc.) respondentų gyveno mieste. Vertinant apnašų kontrolės įgūdžių indeksą (O'Leary) nustatyta, kad geri įgūdžiai būdingi tik 15 (3,9 proc.) tiriamųjų, o papildomos specialios burnos higienos instrukcijos reikalingos 370 (96,1 proc.) pacientų. Remiantis supaprastintu burnos higienos indeksu (OHI-s) nustatyta, kad puiki burnos higiena būdinga 1 (0,3 proc.) respondentui, gera higiena – 96 (24,9 proc.) respondentams, patenkinama higiena – 198 (51,4 proc.) respondentams, o bloga higiena – 90 (23,4 proc.) tiriamųjų. Vertinant klinikinių diagnozių pasiskirstymą nustatyta, kad išplitęs periodontitas diagnozuotas net 171 (44,4 proc.) pacientui, o gingivitas 154 (40 proc.) pacientams. Vietinis periodontitas nustatytas 34 (8,8 proc.) tiriamiesiems, sveiki periodonto audiniai – 25 (6,5 proc.) asmenims, kliniškai sveikos dantenos su ankstesniu periodonto jungties netekimu – 1 (0,3 proc.) pacientui (1 lentelė).

Respondentų burnos sveikatos žinios

Vertinant respondentų žinias apie burnos ir periodonto sveikatą buvo pateikti teiginiai, su kuriais tiriamieji galėjo sutikti arba nesutikti. Klausimai ir gauti atsakymai pateikiami 2 lentelėje. Klausimai surikiuoti nuo dažniausiai iki rečiausiai pasitaikančių klaidingų žinių apie periodonto ligas, remiantis neteisingų atsakymų ir atsakymo

2 lentelė. Respondentų burnos sveikatos žinios

	Visiškai sutinku	Sutinku	Nežinau	Nesutinku	Visiškai nesutinku
Ar ilgalaikis skalavimo skysčių nuo dantenų kraujavimo (su chlorheksidinu) naudojimas yra saugus? N (%)	6 (1,6 %)	115 (29,9 %)	173 (44,9 %)	76 (19,7 %)	15 (3,9 %)
Ar manote, kad nutukę žmonės turi didesnę riziką sirgti periodontitu? N (%)	17 (4,4 %)	93 (24,2 %)	168 (43,6 %)	93 (24,2 %)	14 (3,6 %)
Ar galima visiškai sustabdyti vyresnio amžiaus pacientų periodontito progresavimą? N (%)	12 (3,1 %)	113 (29,4 %)	173 (44,9 %)	78 (20,3 %)	9 (2,3 %)
Ar manote, kad cukrinis diabetas didina periodontito atsiradimo riziką? N (%)	31 (8,1 %)	114 (29,6 %)	173 (44,9 %)	61 (15,8 %)	6 (1,6 %)
Ar į periodontitą panašūs procesai gali atsirasti ir aplink dantų implantus? N (%)	17 (4,4 %)	144 (37,4 %)	175 (45,5 %)	49 (12,7 %)	0 (0 %)
Ar manote, kad stresas turi įtakos periodonto ligų atsiradimui? N (%)	22 (5,7 %)	151 (39,2 %)	144 (37,4 %)	62 (16,1 %)	6 (1,6 %)
Ar manote, kad periodontitas turi įtakos kitų sisteminių ligų atsiradimui? N (%)	35 (9,1 %)	144 (37,4 %)	146 (37,9 %)	58 (15,1 %)	2 (0,5 %)
Ar manote, kad geriausia tarpdančių valymo priemonė sergant periodontitu – tarpdančių šepetėliai? N (%)	39 (10,1 %)	158 (41 %)	118 (30,6 %)	69 (17,9 %)	1 (0,4 %)
Ar manote, kad rūkymas sukelia periodontitą? N (%)	47 (12,2 %)	169 (43,9 %)	132 (34,3 %)	37 (9,6 %)	0 (0 %)
Ar manote, kad netinkama individuali burnos higiena yra pagrindinis periodontito ligos rizikos veiksnys? N (%)	69 (17,9 %)	219 (56,9 %)	83 (21,6 %)	14 (3,6 %)	0 (0 %)

3 lentelė. Respondentų tikėjimas burnos sveikatos mitais

	Visiškai sutinku	Sutinku	Nežinau	Nesutinku	Visiškai nesutinku
Vienas pagrindinių periodontito požymių – dantenų skausmas, N (%)	57 (14,8 %)	212 (55 %)	88 (22,9 %)	28 (7,3 %)	0 (0 %)
Irigatorius yra geriausia tarpdančių valymo priemonė sergant periodontitu, nes vandens srove išvalomos giliau esančios dantenų kišenės, N (%)	68 (17,7 %)	175 (45,4 %)	101 (26,2 %)	40 (10,4 %)	1 (0,3 %)
Ant dantų susikaupę akmenys yra periodontito sunkumo rodiklis, N (%)	58 (15,1 %)	182 (47,3 %)	102 (26,5 %)	39 (10,1 %)	4 (1 %)
Nėštumo metu reikia vengti gydyti periodonto ligas, N (%)	10 (2,6 %)	112 (29,1 %)	196 (50,9 %)	59 (15,3 %)	8 (2,1 %)
Diagnozuotas periodontitas reiškia, kad tam tikras dantų netekimas ateityje bus neišvengiamas, N (%)	22 (5,7 %)	158 (41,1 %)	124 (32,2 %)	72 (18,7 %)	9 (2,3 %)
Pastebėjus dantenų kraujavimą pirmiausia reikia pradėti valyti dantis su dantų pasta nuo dantenų kraujavimo, N (%)	48 (12,5 %)	187 (48,6 %)	66 (17,1 %)	77 (20 %)	7 (1,8 %)
Tinkamas burnos skalavimo skystis gydo periodonto ligas, N (%)	27 (7 %)	181(47 %)	92 (23,9 %)	77 (20 %)	8 (2,1 %)
Periodonto ligos dažnai gydomos antibiotikais, N (%)	8 (2,1 %)	95 (24,7 %)	196 (50,9 %)	76 (19,7 %)	10 (2,6 %)
Periodontito atsiradimą gali paskatinti peršalimas, N (%)	11 (2,9 %)	111 (28,8 %)	162 (42 %)	95 (24,7 %)	6 (1,6 %)
Dantenų pažeidimas yra negrįžtamas sergant dantenų uždegimu, N (%)	6 (1,6 %)	123 (32 %)	148 (38,4 %)	91 (23,6 %)	17 (4,4 %)

„Nežinau“ dažniu.

Analizuojat respondentų nuomonę dėl individualios burnos higienos įtakos periodontito išsivystymui, nustatyta, kad dauguma (288; 74,8 proc.) apklaustųjų šiam teiginiui pritarė. Vertinant tiriamųjų žinias apie rūkymo įtaką periodonto ligoms, nustatyta, kad 216 (56,1 proc.) apklaustųjų pripažino šio veiksnio reikšmę. Dauguma (197; 51,1 proc.) apklaustųjų pritarė, jog geriausia tarpdančių valymo priemonė sergant periodontitu yra tarpdančių šepetėliai.

Tačiau apklausos rezultatai atskleidė, kad 173 (44,9 proc.) respondentai nežinojo, jog cukrinis diabetas didina periodontito atsiradimo riziką. Beveik pusė (175 asmenys; 45,5 proc.) tiriamųjų teigė nežinantys, kad į periodontitą panašūs procesai gali vystytis aplink dantų implantus. Analizuojant respondentų nuomonę dėl galimo visiško periodontito progresavimo sustabdymo vyresnio amžiaus pacientams, nustatyta, kad teisingam teiginiui nepritarė arba pasirinko variantą „Nežinau“ 260 (67,5 proc.) respondentų. Vertinant žinias apie ilgalaikį burnos skalavimo skysčių su chlorheksidinu naudojimą, dauguma (294 asmenys; 76,4 proc.) apklaustųjų nurodė nežinantys arba pritariantys klaidingam teiginiui. 275 (71,4 proc.) respondentai nurodė, jog nežinojo arba nepritarė teisingam teiginiui, kad nutukimas didina riziką sirgti periodontitu.

Respondentų tikėjimas burnos sveikatos mitais

Vertinant respondentų tikėjimą burnos sveikatos mitais buvo pateikti teiginiai, su kuriais tiriamieji galėjo sutikti arba nesutikti. Klausimai ir gauti atsakymai pateikiami 3 lentelėje (tikėjimas mitais pateiktas mažėjančia tvarka: nuo mitų, kuriais tikėta dažniausiai, iki mitų, kuriais tikėta rečiausiai, remiantis neteisingų atsakymų ir atsakymo „Nežinau“ dažniu).

Nustatyta, kad 299 (77,7 proc.) respondentai nežinojo arba pritarė klaidingam teiginiui, kad periodonto ligos dažnai gydomos antibiotikais. Vertinant respondentų nuomonę apie periodonto ligų gydymą nėštumo metu rasta, kad 318 (82,6 proc.) asmenų nežinojo arba pritarė, kad šiuo laikotarpiu reikėtų vengti gydymo. Dau-

guma (269; 69,8 proc.) apklaustųjų pritarė klaidingam teiginiui, kad vienas pagrindinių periodontito požymių yra dantenų skausmas. Apklausos rezultatai parodė, kad 240 (62, 4 proc.) asmenų pritarė, jog ant dantų susikaupę akmenys gali būti periodontito sunkumo rodiklis. Didžioji dalis (180 asmenų; 46,8 proc.) respondentų pritarė, jog periodontito diagnozė reiškia neišvengiamą dantų netekimą ateityje. Vertinant, kaip pacientai elgtųsi pastebėję dantenų kraujavimą, nustatyta, jog 235 (61,1 proc.) respondentai pritarė, kad tokiu atveju reikėtų pradėti naudoti dantų pastą nuo dantenų kraujavimo. Dauguma (208; 54 proc.) apklaustųjų pritarė klaidingam teiginiui, kad tinkamas burnos skalavimo skystis gali gydyti periodonto ligas. Apklausos duomenys parodė, kad 243 (63,1 proc.) respondentai pritarė, jog sergant periodontitu geriausia tarpdančių valymo priemonė yra irigatorius.

Respondentų žinių skirtumai pagal sociodemografinius rodiklius

Atlikta *chi* kvadrato testo analizė neatskleidė statistiškai reikšmingo ryšio tarp respondentų žinių lygio ir lyties (p = 0,991). Tačiau analizė parodė statistiškai reikšmingą ryšį tarp respondentų žinių lygio ir amžiaus grupių (p < 0,001), socialinės padėties (p < 0,001), išsilavinimo (p = 0,006), gyvenamosios vietos (p < 0,001). Detalesnė analizė taikant koreguotas standartizuotas liekanas (angl. *adjusted standardized residuals*) atskleidė, kad žemo žinių lygio grupėje buvo statistiškai reikšmingai daugiau 60+ m. amžiaus grupės respondentų (p < 0,001), o aukšto žinių lygio grupėje šios amžiaus grupės respondentų buvo reikšmingai mažiau (p < 0,01). Vidutinio žinių lygio grupėje buvo reikšmingai daugiau 18–29 m. amžiaus grupės respondentų (p < 0,001). Rezultatai atskleidė, jog ekonomiškai aktyvių asmenų grupėje statistiškai reikšmingai dažniau buvo nustatytas aukštas žinių lygis (p < 0,05), o ekonomiškai neaktyvių asmenų grupėje reikšmingai dažniau pasitaikė žemas žinių lygis (p < 0,001). Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, statistiškai reikšmingai dažniau priklausė aukšto žinių lygio grupei (p < 0,01), o žemo ir vidutinio išsilavinimo asmenys – žemo žinių lygio grupei (p < 0,01). Nors visose žinių grupėse dominavo miesto gyventojai, jų proporcija statistiškai reikšmingai skyrėsi. Aukšto žinių

4 lentelė. Respondentų žinių sąsajos su sociodemografiniais duomenimis

Sociodemografiniai duomenys		Aukšto žinių lygio grupė N = 131	Vidutinio žinių lygio grupė N = 122	Žemo žinių lygio grupė N = 132	p vertė[1]
Lytis	Moterys, N (%)	59 (45)	56 (45,9)	60 (45,5)	p = 0,991
	Vyrai, N (%)	72 (55)	66 (54,1)	72 (54,5)	
Amžiaus grupės	18–29, N (%)	50 (38,1)	59 (48,4)***	27 (20,5)***	p < 0,001
	30–39, N (%)	34 (26)	24 (19,7)	27 (20,5)	
	40–49, N (%)	20 (15,3)	16 (13)	25 (18,9)	
	50–59, N (%)	20 (15,3)	14 (11,5)	24 (18,1)	
	60+, N (%)	7 (5,3)**	9 (7,4)	29 (22)***	
Socialinė padėtis	Studijuojantys, N (%)	29 (22,2)	28 (23)*	10 (7,6)***	p < 0,001
	Ekonomiškai aktyvūs, N (%)	95 (72,5)*	79 (64,7)	79 (59,8)	
	Ekonomiškai neaktyvūs, N (%)	7 (5,3)***	15 (12,3)	43 (32,6)***	
Išsilavinimas	Žemas ar vidutinis, N (%)	44 (33,6)**	53 (43,4)	70 (53)**	p = 0,006
	Aukštas, N (%)	87 (66,4)**	69 (56,6)	62 (47)**	
Gyvenamoji vieta	Miestas, N (%)	125 (95,4)***	109 (89,3)	101 (76,5)***	p < 0,001
	Miestelis ar kaimas, N (%)	6 (4,6)***	13 (10,7)	31 (23,5)***	

[1] *chi* kvadrato kriterijus.
Koreguotos standartizuotos liekanos (angl. *adjusted standardized residuals*):
* p < 0,05;
** p < 0,01;
*** p < 0,001.

5 lentelė. Respondentų žinių sąsajos su klinikiniais duomenimis

	Klinikiniai duomenys	Aukšto žinių lygio grupė N = 131	Vidutinio žinių lygio grupė N = 122	Žemo žinių lygio grupė N = 132	p vertė[1]
O'Leary	Apnašų kontrolės įgūdžiai geri, N (%)	13 (9,9)***	1 (0,8)	1 (0,8)	p < 0,001
	Reikalingos papildomos specialios burnos higienos instrukcijos, N (%)	118 (90,1)	121 (99,2)*	131 (99,2)*	
OHI-s	Puiki burnos higiena, N (%)	0 (0)	1 (0,8)	0 (0)	p < 0,001
	Gera burnos higiena, N (%)	56 (42,8)***	34 (27,9)	6 (4,6)	
	Patenkinama burnos higiena, N (%)	65 (49,6)	77 (63,1)**	56 (42,4)	
	Bloga burnos higiena, N (%)	10 (7,6)	10 (8,2)	70 (53)***	
Diagnozė	Sveiki periodonto audiniai arba kliniškai sveikos dantenos su ankstesniu periodonto jungties netekimu, N (%)	19 (14,5)***	6 (4,9)	1 (0,8)	p < 0,001
	Gingivitas, N (%)	66 (50,4)**	73 (59,8)***	15 (11,4)	
	Vietinis periodontitas, N (%)	9 (6,9)	9 (7,4)	16 (12,1)	
	Išplitęs periodontitas, N (%)	37 (28,2)	34 (27,9)	100 (75,7)***	

[1] *chi* kvadrato kriterijus.
Koreguotos standartizuotos liekanos (angl. *adjusted standardized residuals*):
* p < 0,05;
** p < 0,01;
*** p < 0,001.

lygio grupėje miesto gyventojų dalis pagal bendrą pasiskirstymą buvo didesnė (p < 0,001), o miestelių ir kaimų gyventojų – mažesnė (p < 0,001). Priešingai, žemo žinių lygio grupėje miestelių ir kaimų gyventojų dalis buvo statistiškai reikšmingai didesnė (p < 0,001) (4 lentelė).

Respondentų žinių skirtumai pagal klinikinius rodiklius

Atlikus *chi* kvadrato testo analizę nustatyta, kad tarp žinių lygio ir apnašų kontrolės įgūdžių indekso (O'Leary) (p < 0,001), supaprastinto burnos higienos indekso (OHI-s) (p < 0,001) ir periodonto diagnozės (p < 0,001) yra statistiškai reikšminga sąsaja. Nors papildomos burnos higienos instrukcijos buvo reikalingos beveik visiems tiriamiesiems, tačiau detalesnė analizė, taikant koreguotas standartizuotas liekanas (angl. *adjusted standardized residuals*) parodė, kad aukšto žinių lygio grupėje reikšmingai dažniau pasitaikė geri apnašų kontrolės (pagal O'Leary indeksą) įgūdžiai (p < 0,001). Respondentai, priklausantys aukšto žinių lygio grupei, statistiškai reikšmingai dažniau pasižymėjo gera burnos higiena, įvertinta pagal OHI-s indeksą (p < 0,001), vidutinio žinių lygio – patenkinama (p < 0,001), o žemo žinių lygio – bloga (p < 0,001). Aukšto žinių lygio grupėje buvo statistiškai reikšmingai daugiau respondentų, kuriems diagnozuoti sveiki periodonto audiniai arba kliniškai sveikos dantenos su ankstesniu periodonto jungties netekimu ir gingivitas (atitinkamai p < 0,001; p < 0,01), vidutinio žinių lygio grupėje dažniausiai nustatyta gingivito diagnozė (p < 0,001), o žemo žinių lygio grupėje reikšmingai dažniausia buvo išplitusio periodontito diagnozė (p < 0,001) (5 lentelė).

REZULTATŲ APTARIMAS

Šio mokslinio darbo tikslas buvo ištirti pacientų, besikreipiančių į VU MF OI, žinias apie periodontą, jo ligas bei palyginti žinias su pacientų sociodemografiniais ir klinikiniais rodikliais. Išanalizavus tyrimo rezultatus galima teigti, jog pacientų tikėjimas mitais yra paplitęs, o žinios – nepakankamos ir dažniausiai apsiriboja bendromis periodontologijos žiniomis. Taip pat respondentai, priklausantys žemo žinių lygio grupei, pasižymėjo prastesniais klinikiniais duomenimis ir skyrėsi sociodemografinėmis charakteristikomis.

Vertinant sociodemografinių veiksnių įtaką žinių pasiskirstymui nustatyta, jog vyresnio amžiaus respondentai dažniau buvo priskiriami žemo žinių lygio grupei, o aukšto žinių lygio grupėje buvo daugiau jaunesnių asmenų.

Panašias tendencijas aprašo A. M. M. Hofmann ir kt., kurie nustatė, kad burnos sveikatos žinių lygis skiriasi tarp amžiaus grupių. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad tik vyriausieji (nuo 75 m.) dalyviai išsiskyrė žemiausiais žinių balais [17]. Skirtumai tarp tyrimų rezultatų gali būti paaiškinami dėl mūsų tyrime esančio netolygaus respondentų skaičiaus pasiskirstymo tarp amžiaus grupių, ypač priklausančių 70–79, 80+ m. grupėms, kuriose dalyvavo mažiausiai pacientų. Tyrimo metu nustatytas ryšys tarp socialinės padėties ir žinių grupių. Aukšto žinių lygio grupėje buvo daugiau dirbančiųjų (ekonomiškai aktyvių), o žemo žinių lygio grupėje reikšminga respondentų dalis pasiskirstė tarp bedarbių, neįgaliųjų ir pensininkų socialinių grupių (ekonomiškai neaktyvių). Panašius rezultatus pateikia ir E. Henderson ir kt., kurie nustatė, kad žemas burnos sveikatos raštingumas buvo dažnesnis darbo neturinčių asmenų grupėje [18]. M. R. McQuistan ir kt. atlikto tyrimo rezultatai patvirtina, jog pensinio amžiaus (≥65 m.) pacientų žinios apie periodonto ligas buvo nepakankamos [19]. Išsilavinimas taip pat buvo reikšmingas veiksnys: aukšto išsilavinimo respondentai dažniausiai priklausė aukšto žinių lygio grupei, o žemą ir vidutinį išsilavinimą turintys – žemo žinių lygio grupei. Remiantis J. K. Baskaradoss atliktu tyrimu gauti rezultatai, jog tiriamųjų, turinčių žemą išsilavinimą, sveikatos raštingumo lygis buvo ribotas [20]. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad periodontitas dažniau pasitaiko tarp vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, žemesnės socialinės klasės bei ne miestuose gyvenančių asmenų [21, 22, 23, 24]. Mūsų tyrimo rezultatai papildo duomenis, kad būtent šių grupių pacientai pasižymi žemo lygio periodonto sveikatos žiniomis. Ši sąsaja pabrėžia, kad, siekiant efektyvios periodontito prevencijos, pažeidžiamoms grupėms yra būtina tikslinė edukacija.

Pacientų žinių apie burnos sveikatą lygis literatūroje dažnai siejamas su burnos higienos įpročiais ir periodonto audinių būkle [20]. Mūsų tyrimo duomenys rodo, kad aukštesnis žinių lygis yra susijęs su geresne apnašų kontrole, palankesniais burnos higienos rodikliais bei geresne periodonto audinių būkle, o ribotos žinios siejasi su prastesniais burnos higienos įpročiais ir dažnesniu pažengusių periodonto ligų nustatymu. Panašias tendencijas pateikia J. K. Baskaradoss, kurio atliktame tyrime nustatyta, jog tiriamiesiems, pasižymintiems ribotu sveikatos raštingumu, buvo dažniau diagnozuota sunki periodontito ligos forma, palyginti su tais, kurių sveikatos raštingumas buvo aukštas. Analizė parodė, jog periodonto būklė buvo reikšmingai susijusi su burnos sveikatos raštingumo įvertinimu [20]. Šie rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad žemas sveikatos raštingumo lygis gali būti reikšmingas rizikos veiksnys, lemiantis prastesnius klinikinius rezultatus.

Tyrimo metu gauti duomenys rodo, kad pacientai gana gerai supranta individualios burnos higienos svarbą periodontito prevencijai, netinkamos higienos vaidmenį ligos išsivystymui bei rūkymo poveikį periodonto sveikatai. Šie rezultatai atitinka E. Dolinska ir kt. atlikto tyrimo išvadas, jog pacientų žinios apie burnos higienos svarbą ligų prevencijai bei rūkymo poveikį periodonto sveikatai yra gana geros [25]. Tačiau kai kuriose srityse pacientų informuotumas išlieka ribotas. Didesnis neapibrėžtumas pastebėtas vertinant ilgalaikio skalavimo skysčio su chlorheksidinu naudojimo saugumą, periodontito progresavimo galimybes vyresniame amžiuje bei periodonto uždegiminių procesų atsiradimą aplink dantų implantus. Literatūroje nepavyko rasti tyrimų, tiesiogiai vertinančių pacientų supratimą apie ilgalaikio skalavimo skysčių su chlorheksidinu vartojimo saugumą ar periodontito sustabdymą vyresnio amžiaus asmenims. Tačiau tai, kad žinios periimplantito tema yra nepakankamos, atspindi A. Insua bei kt. atliktas tyrimas, kuriame taip pat gautos išvados, jog pacientų supratimas ir suvokimas apie periimplantitą yra ribotas. Tyrimo duomenimis, 74,1 proc. pacientų neturėjo žinių apie periimplantitą, o 34,4 proc. respondentų teigė, kad prieš implantacijos procedūrą jiems nebuvo suteikta arba buvo suteikta nepakankamai informacijos apie periimplantitą [26]. Ribotos pacientų žinios pastebimos vertinant rizikos veiksnių, tokių kaip stresas, cukrinis diabetas, nutukimas ar kitos sisteminės ligos, sąsajas su periodonto sveikata. Šiuos duomenis pagrindžia ir kitų autorių atlikti tyrimai, kuriuose taip pat minima, jog didesnis žinių trūkumas buvo fiksuotas nagrinėjant periodontito sąsajas su stresu, cukriniu diabetu ir nutukimu [25]. Mūsų tyrimo duomenys rodo, kad dalis pacientų linkę pervertinti antibiotikų svarbą, manydami, kad šie vaistai dažnai skiriami gydant periodonto ligas. Panašius klaidingus įsitikinimus nustatė ir S. R. Alharbi ir kt., kurių atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad dalis respondentų turėjo klaidingų įsitikinimų, ypač susijusių su antibiotikų vartojimo būtinybe po odontologinio gydymo [27]. Galima teigti, kad pacientai dažnai linkę pervertinti antibiotikų svarbą gydant burnos ligas.

Klaidingi įsitikinimai taip pat siejami su odontologinių procedūrų saugumu nėštumo metu. Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad dalis pacientų nėra tikri dėl periodonto gydymo saugumo nėštumo laikotarpiu arba pritaria klaidingoms nuostatoms. Panašios tendencijos aprašomos ir Y. M. Kamalabadi ir kt. sisteminėje apžvalgoje, kurioje nustatyta, kad dažnai vyrauja klaidingos nuomonės apie odontologinių procedūrų saugumą nėštumo metu [28]. Apibendrinant galima teigti, kad pacientų žinios apie periodonto ligas yra nevienodos. Nors pagrindiniai prevencijos principai yra gerai suprantami, žinios apie periodonto ligų eigą ir gydymą išlieka ribotos, todėl būtina sisteminga ir kryptinga pacientų edukacija.

Tyrimo apribojimai. Nors taikytas skerspjūvio tyrimas leidžia nustatyti sąsajas tarp žinių lygio ir klinikinių bei sociodemografinių rodiklių, tačiau priežastinio ryšio nustatyti negalima. Skerspjūvio tyrimui duomenys buvo renkami vienu metu, todėl jie atspindi tik vieną laikotarpį ir negalima stebėti žinių pokyčių laikui bėgant. Be to, buvo pastebėtas netolygus respondentų pasiskirstymas pagal amžių, socialinę padėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą. Tyrimo rezultatai atspindi tik VU MF OI pacientų žinias, todėl šių rezultatų negalima tiesiogiai pritaikyti visai Lietuvos gyventojų populiacijai. Tyrime dalyvavo tik tie pacientai, kurie patys sutiko dalyvauti apklausoje, todėl jų charakteristikos gali skirtis nuo tų, kurie atsisakė dalyvauti tyrime. Dėl šių priežasčių rekomenduojama vykdyti ilgalaikius tyrimus, kad būtų galima stebėti žinių pokyčius laikui bėgant, taip pat užtikrinti tolygesnį dalyvių pasiskirstymą pagal amžių, socialinę padėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, įtraukti platesnę ir įvairesnę populiaciją, kad rezultatus būtų galima pritaikyti visai Lietuvos gyventojų populiacijai.

APIBENDRINIMAS

Tyrimo rezultatai parodė, kad daugumai pacientų, besikreipiančių į VU MF OI, būdingas nepakankamas periodonto sveikatos žinių lygis, reikšmingai susijęs su sociodemografiniais veiksniais ir klinikine burnos būkle. Žemas žinių lygis dažniau nustatytas vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, ekonomiškai neaktyviems, mažesnėse gyvenvietėse gyvenantiems pacientams ir buvo susijęs su prastesniais burnos higienos rodikliais bei sunkesnėmis periodonto ligos diagnozėmis. Kadangi tinkamai organizuotos edukacinės programos tiesiogiai prisideda prie individualios burnos higienos užtikrinimo ir periodontito paplitimo mažinimo, švietimo programos turėtų būti orientuotos į periodonto sveikatos žinių didinimą bei efektyvių burnos higienos įpročių formavimą. Tokios prevencinės iniciatyvos ypač tikslingos vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, ekonomiškai neaktyviems ir miesteliuose ar kaimo vietovėse gyvenantiems pacientams.

Straipsnis gautas 2026-03-04, priimtas 2026-04-24

Literatūra

1. Ide M, Karimova M, Setterfield J. Oral Health, Antimicrobials and Care for Patients With Chronic Oral Diseases - A Review of Knowledge and Treatment Strategies. Front Oral Health. 2022;3:866695. DOI: 10.3389/froh.2022.866695.
2. Dumitrescu AL. Editorial: Periodontal Disease - A Public Health Problem. Front Public Health. 2015;3:278. DOI: 10.3389/fpubh.2015.00278.
3. Chen MX, Zhong YJ, Dong QQ, Wong HM, Wen YF. Global, regional, and national burden of severe periodontitis, 1990–2019: An analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. J Clin Periodontol. 2021;48(9):1165–88. DOI: 10.1111/jcpe.13506.
4. Albandar JM. Epidemiology and risk factors of periodontal diseases. Dent Clin North Am. 2005 Jul;49(3):517–32, v–vi. DOI: 10.1016/j.cden.2005.03.003.
5. Papapanou PN, Susin C. Periodontitis epidemiology: is periodontitis under-recognized, over-diagnosed, or both? Periodontol 2000. 2017 Oct;75(1):45–51. DOI: 10.1111/prd.12200.
6. Graziani F, Tsakos G. Patient-based outcomes and quality of life. Periodontol 2000. 2020 Jun;83(1):277–94. DOI: 10.1111/prd.12305.
7. Machado V, Lobo S, Proença L, Mendes JJ, Botelho J. Vitamin D and Periodontitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2020 Jul 22;12(8):2177. DOI: 10.3390/nu12082177.
8. Hegde R, Awan KH. Effects of periodontal disease on systemic health. Dis--Mon DM. 2019 Jun;65(6):185–92. DOI: 10.1016/j.disamonth.2018.09.011.
9. Fisher J, Selikowitz HS, Mathur M, Varenne B. Strengthening oral health for universal health coverage. Lancet. 2018 Sep 15;392(10151):899–901. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31707-0.
10. Kumar S. Evidence-Based Update on Diagnosis and Management of Gingivitis and Periodontitis. Dent Clin North Am. 2019 Jan;63(1):69–81. DOI: 10.1016/j.cden.2018.08.005.
11. Wehmeyer MMH, Corwin CL, Guthmiller JM, Lee JY. The impact of oral health literacy on periodontal health status. J Public Health Dent. 2014;74(1):80–7. DOI: 10.1111/j.1752-7325.2012.00375.x.
12. Assiri KI, Ajmal M, Al-Ahmari BM, Abumelha HS, Almobty RA, Almobty RA, et al. Oral Hygiene Myths and its Association with Gingival Health Status among Patients in Aseer Region of Saudi Arabia: A Cross-sectional Study. J Contemp Dent Pract. 2021 May 1;22(5):506–10.
13. Dickson-Swift V, Kenny A, Farmer J, Gussy M, Larkins S. Measuring oral health literacy: a scoping review of existing tools. BMC Oral Health. 2014 Dec 4;14(1):148. DOI: 10.1186/1472-6831-14-148.
14. Dažniausiai užduodami klausimai. Lietuvos bioetikos komitetas [Internet]. [cited 2026 Feb 9]. Available from: https://bioetika.lrv.lt/lt/duk/.
15. Paniotto VI, Maksimenko VS. [Паниотто ВИ, Максименко ВС.] Количественные методы в социологических исследованиях. Киев: Наукова думка. [Qualitative Methods in Sociological Research.]; 1982. p. 272 [in Russian].
16. Žukauskas P, Vveinhardt J, Andriukaitienė R, Žukauskas P, Vveinhardt J, Andriukaitienė R. Methodological and Psychometric Characteristics of the Research Instrument: Retest. In: Management Culture and Corporate Social Responsibility [Internet]. IntechOpen; 2018. DOI: 10.5772/intechopen.70634.
17. Meyer-Hofmann AM, Barbe AG, von Kohout M, Aarabi G, Deeg I, Wicht MJ, et al. Assessment of Oral Health Literacy and Influencing Factors: Retrospective Analysis of Patients Treated by Dental Students. Eur J Dent Educ. 2025 May 21. DOI: 10.1111/eje.13122.
18. Henderson E, Dalawari P, Fitzgerald J, Hinyard L. Association of Oral Health Literacy and Dental Visitation in an Inner-City Emergency Department Population. Int J Environ Res Public Health. 2018 Aug;15(8):1748. DOI: 10.3390/ijerph15081748.
19. McQuistan MR, Qasim A, Shao C, Straub-Morarend CL, Macek MD. Oral health knowledge among elderly patients. J Am Dent Assoc. 2015 Jan;146(1):17–26. DOI: 10.1016/j.adaj.2014.10.002.
20. Baskaradoss JK. Relationship between oral health literacy and oral health status. BMC Oral Health. 2018 Oct 24;18(1):172. DOI: 10.1186/s12903-018-0640-1.
21. Eke PI, Thornton-Evans GO, Wei L, Borgnakke WS, Dye BA, Genco RJ. Periodontitis in US Adults: National Health and Nutrition Examination Survey 2009-2014. J Am Dent Assoc. 2018 Jul;149(7):576–588.e6. DOI: 10.1016/j.adaj.2018.04.023.
22. Almerich-Silla JM, Almiñana-Pastor PJ, Boronat-Catalá M, Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM. Socioeconomic factors and severity of periodontal disease in adults (35-44 years). A cross sectional study. J Clin Exp Dent. 2017 Aug;9(8):e988–94. DOI: 10.4317/jced.54033.
23. Cianetti S, Valenti C, Orso M, Lomurno G, Nardone M, Lomurno AP, et al. Systematic Review of the Literature on Dental Caries and Periodontal Disease in Socio-Economically Disadvantaged Individuals. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jan;18(23):12360. DOI: 10.3390/ijerph182312360.
24. Petersen PE, Ogawa H. The global burden of periodontal disease: towards integration with chronic disease prevention and control. Periodontol 2000. 2012;60(1):15–39. DOI: 10.1111/j.1600-0757.2011.00425.x.
25. Dolińska E, Milewski R, Pietruska MJ, Gumińska K, Prysak N, Tarasewicz T, et al. Periodontitis-Related Knowledge and Its Relationship with Oral Health Behavior among Adult Patients Seeking Professional Periodontal Care. J Clin Med. 2022 Jan;11(6):1517. DOI: 10.3390/jcm11061517.
26. Insua A, Monje A, Wang HL, Inglehart M. Patient-Centered Perspectives and Understanding of Peri-Implantitis. J Periodontol. 2017;88(11):1153–62. DOI: 10.1902/jop.2017.160796.
27. Alharbi SR, Alzamil L, Alkudmani ZS, Alhani A, Faqih L, Aldawood E. Knowledge and Misconceptions About Antibiotic Use and Resistance Among Dental Clinic Visitors in Saudi Arabia—A Cross-Sectional Study. Healthcare. 2025 Jan;13(16):1971. DOI: 10.3390/healthcare13161971.
28. Kamalabadi YM, Campbell MK, Zitoun NM, Jessani A. Unfavourable beliefs about oral health and safety of dental care during pregnancy: a systematic review. BMC Oral Health. 2023 Oct 15;23(1):762. DOI: 10.1186/s12903-023-03439-4.

PATIENTS' KNOWLEDGE ABOUT PERIODONTAL DISEASES

Gintarė Donata Kubiliūtė, Greta Aidukaitė
Vilnius University Faculty of Medicine Institute of Dentistry

SUMMARY

Aim. The aim of this study is to investigate patients' knowledge of the periodontium and its diseases at the Vilnius University Faculty of Medicine Institute of Dentistry and to compare these data with sociodemographic and clinical indicators.

Methods. From February 20 to October 10, 2025, a cross-sectional study was conducted among adults receiving periodontal treatment at the Institute of Dentistry. Participation was confirmed by verbal and written informed consent. The sample comprised 385 respondents who completed anonymous questionnaires consisting of 30 questions. Clinical data were collected during the examination. The data were analyzed using statistical software IBM SPSS, Microsoft Excel, with significance set at $p<0.05$.

Results. The study included 385 respondents, of whom 175 (45.5proc.) were women and 210 (54.5proc.) were men. Questionnaires were completed in Lithuanian by 305 participants (79.2proc.) and in English by 80 (20.8proc.). The results showed that patients' knowledge about the periodontium and periodontal diseases is insufficient. Participants with low knowledge were significantly more likely to be aged 60+ ($p<0.001$), economically inactive ($p<0.001$), and have low–medium education ($p<0.01$). The proportion of respondents from small towns and rural areas was also significantly higher in low knowledge group ($p<0.001$). They also had poor oral hygiene ($p<0.001$), and were diagnosed with generalized periodontitis ($p<0.001$).

Conclusions. Patients attending the Vilnius University Faculty of Medicine Institute of Dentistry demonstrated insufficient knowledge of periodontal health. Educational programs should focus on improving periodontal health literacy and promoting effective oral hygiene habits. Such preventive initiatives are particularly relevant for older adults, individuals with lower education levels, economically inactive patients, and those living in towns or rural areas.

Keywords: periodontal diseases, periodontitis, knowledge, myths, oral health.

Received 4 March 2026, accepted 24 April 2026

Correspondence to Gintarė Donata Kubiliūtė
Institute of Dentistry, Faculty of Medicine,
Vilnius University
Žalgirio str. 117, LT-08215 Vilnius, Lithuania
E-mail: gintare.kubiliute@mf.stud.vu.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-3

POLINKIO Į PRIKLAUSOMYBĘ NUO DARBO SĄSAJA SU ROMANTINIŲ SANTYKIŲ VERTINIMU: EMPIRINĖ ANALIZĖ

***Gabrielė Jackevič*[1], *Modesta Morkevičiūtė*[1,2]**
[1] *Vytauto Didžiojo universiteto Psichologijos katedra*
[2] *Vytauto Didžiojo universiteto Vytauto Kavolio transdisciplininių tyrimų institutas*

SANTRAUKA

Tikslas. Empiriniu tyrimu siekta nustatyti ryšį tarp darbuotojų polinkio į priklausomybę nuo darbo ir jų romantinių santykių vertinimo.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 215 darbuotojų (74 proc. moterų, 26 proc. vyrų), dirbančių įvairiose Lietuvoje veikiančiose įstaigose. Polinkiui į priklausomybę nuo darbo vertinti naudota Bergeno priklausomybės nuo darbo skalė (BWAS) [1]. Romantinių santykių vertinimas atliktas naudojant Santykių vertinimo skalę (RAS) [2]. Papildomai rinkti duomenys apie sociodemografines dalyvių charakteristikas. Statistinei analizei naudoti Stjudento t (*Student*), ANOVA testai ir koreliacinė analizė.

Rezultatai. Nustatyta, kad susižadėję asmenys savo romantinius santykius vertina palankiausiai, o susituokę asmenys – mažiausiai palankiai. Asmenys, gyvenantys kartu su partneriu, savo romantinius santykius vertina palankiau, palyginti su gyvenančiaisiais atskirai. Galiausiai, rasta, kad polinkis į priklausomybę nuo darbo statistiškai reikšmingai susijęs su prastesniu romantinių santykių vertinimu. Kontroliuojant sociodemografinius kintamuosius, ši sąsaja išlieka statistiškai reikšminga.

Išvados. Tyrimu patvirtinta, kad polinkis į priklausomybę nuo darbo yra susijęs su tarpasmeninio lygmens žala. Gauti rezultatai papildo mokslinę literatūrą nagrinėjama tema ir suteikia svarbių empiriniais įrodymais grįstų žinių, kurios rodo polinkio į priklausomybę nuo darbo prevencijos bei įveikos svarbą. Tyrimo išvados gali būti naudingos polinkį į priklausomybę nuo darbo patiriantiems asmenims, sveikatos priežiūros specialistams ir organizacijų atstovams, besirūpinantiems darbuotojų gerove.

Reikšminiai žodžiai: polinkis į priklausomybę nuo darbo, romantiniai santykiai, darbuotojai, empirinis tyrimas.

ĮVADAS

Daugumai žmonių darbas yra būdas patenkinti socialinius ir psichologinius poreikius, nes suteikia prasmės jausmą, leidžia užmegzti socialinius ryšius, užtikrina finansinę gerovę, padeda siekti statuso [3]. Vis dėlto stebima tendencija, kad kai kurių asmenų darbinis elgesys tampa nevaldomas ir perteklinis, pasireiškiantis kitų gyvenimo sričių ignoravimu [4]. Tai laikoma polinkiu į priklausomybę nuo darbo.

Nors mokslininkai vis daugiau dėmesio skiria polinkiui į priklausomybę nuo darbo nagrinėti, kai kurios sritys nepakankamai ištirtos. Viena tokių sričių – darbuotojų, pasižyminčių polinkiu į priklausomybę nuo darbo, romantinių santykių vertinimas. Pasitenkinimas romantiniais santykiais ir jų vertinimas turi reikšmės tiek norui palaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir šeimos, tiek bendram socialiniam funkcionavimui. Taigi reiškinių sąsajos nagrinėjimas svarbus darbuotojų gerovės stiprinimui. Vis dėlto tyrimų šia tema atlikta mažai, negana to, jų rezultatai prieštaringi. Nesant galutinių išvadų apie reiškinių sąsają, polinkis į priklausomybę nuo darbo dažnai vertinamas dviprasmiškai, jo žala lieka nepakankamai pagrįsta. Visa tai rodo poreikį toliau tyrinėti šią tematiką. Todėl šio tyrimo ***tikslas*** – nustatyti ryšį tarp darbuotojų polinkio į priklausomybę nuo darbo ir jų romantinių santykių vertinimo.

Adresas susirašinėti: Gabrielė Jackevič
Vytauto Didžiojo universitetas
Jonavos g. 66, 44191 Kaunas
El. p. gabriele.jackevic@vdu.lt

Nors polinkis į priklausomybę nuo darbo pradėtas tirti prieš beveik 60 metų [5], iki šiol trūksta bendro sutarimo, kaip šis konstruktas turėtų būti apibrėžtas. Reiškiniui apibūdinti naudojamos kelios sąvokos, pvz., priklausomybė nuo darbo (angl. *work addiction*), darboholizmas (angl. *workaholism*), potraukis darbui (angl. *work craving*), perteklinis darbas (angl. ex*cessive work*), intensyvus įsitraukimas į darbą (angl. *heavy work investment*), o pats reiškinys skirtingų autorių suvokiamas kaip priklausomybė, asmenybės savybė, nepatologinio elgesio modelis ir pan. [6]. Dažniausiai tapatinami priklausomybės nuo darbo ir darboholizmo terminai, suprantami kaip to paties reiškinio sinonimai. Vis dėlto toks terminų tapatinimas kelia diskusijų. Manoma, kad reikėtų atskirti šiuos reiškinius dėl konceptualių skirtumų, nes priklausomybė nuo darbo – patologinis reiškinys, o darboholizmas suvokiamas kaip kasdienis su darbu susijęs elgesys, turintis tiek neigiamų, tiek teigiamų padarinių [7]. Kadangi priklausomybė nuo darbo koncepciniu ir operacionalizaciniu požiūriais aiškesnė, šiame tyrime nagrinėtas pastarasis reiškinys. Vartotas dažniausiai sutinkamas apibrėžimas – tai pernelyg didelis susirūpinimas darbu, nekontroliuojama darbo motyvacija ir perteklinis energijos bei laiko skyrimas darbui, dėl ko nukenčia asmens santykiai, laisvalaikis ir / ar sveikata [1, 8]. Išskiriami šie reiškinio komponentai: 1) svarba (darbo dominavimas mintyse ir elgesyje), 2) tolerancija (didėjanti darbo veiklos apimtis norimam poveikiui pasiekti), 3) nuotaikos pokyčiai (darbo veiklos arba jos trūkumo paskatinti nuotaikos pasikeitimai), 4) atkrytis (grįžimas prie ydingo su darbu susijusio elgesio po pagerėjimo periodo), 5) abstinencijos simptomai (nemalonūs pojūčiai negalint dirbti), 6) konfliktas (darbo veiklos paskatinti konfliktai tarpasmeniniuose santykiuose ir kasdienėje veikloje) ir 7) problemos (neigiamos ydingo su darbu susijusio elgesio pasekmės) [1]. Vadovaujantis tuo, kad reiškinys oficialiai nepripažintas priklausomybe ir neįtrauktas į tarptautinius ligų klasifikatorius, šiame darbe vartojama „polinkio į priklausomybę nuo darbo“ sąvoka.

Tyrimų, susijusių su polinkiu į priklausomybę nuo darbo, aktualumas grindžiamas reikšmingu reiškinio paplitimu ir potencialia žala. Kai kuriose šalyse polinkio į priklausomybę nuo darbo mastas viršija 20 proc., o bendras paplitimas įvertintas ~15 proc. [3]. Be to, šis reiškinys siejamas su neigiamais padariniais asmeniniu lygmeniu: emociniu išsekimu [9], padidėjusiu stresu, didesne psichikos sutrikimų (pvz., depresijos) rizika [10], sveikatai rizikingu elgesiu (pvz., priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimu, nepakankamu fiziniu aktyvumu, prastesne mityba) [11, 12], prastesne fizine sveikata (pvz., miego sutrikimais, širdies ir kraujagyslių sistemos problemomis) [13] ir kt. Taip pat nustatyta, kad šis reiškinys žalingas organizaciniu požiūriu, nes linkę į priklausomybę nuo darbo asmenys neretai pasižymi sumažėjusiu produktyvumu [14], dažnesniu organizacijos taisyklių pažeidimu ir agresyviu elgesiu darbovietėje [15], o tai gali neigiamai atsiliepti organizacijos veiklai. Taigi ankstesnių tyrimų rezultatai rodo perteklinio darbo žalą asmeniui ir organizacijai. Vis dėlto polinkio į priklausomybę nuo darbo sąsaja su tam tikrais socialinio / tarpasmeninio lygmens reiškiniais nepakankamai ištirta. Atsižvelgiant į tai, kad polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių ryšys nagrinėtas retai, reikalinga tolesnė šių reiškinių sąsajos analizė.

Romantinių santykių vertinimas dažnai matuojamas bendruoju pasitenkinimu jais. Kai kurie autoriai apibūdina šį reiškinį kaip laimės lygį ir santykių kokybę [16], kiti – kaip jausmus ir nuostatas partnerio atžvilgiu, kurie orientuoti į poreikių patenkinimą [17]. Šiame darbe romantinių santykių vertinimas suprantamas kaip emocinė būsena, pasižyminti asmens pasitenkinimu romantiniais santykiais ir patirtimi juos kuriant [18].

Ankstesnių tyrimų, kuriuose analizuota sąsaja tarp polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių vertinimo, rezultatai prieštaringi. Kai kuriuose tyrimuose ryšys tarp reiškinių nenustatytas [19]. Kitur pastebima, kad intensyvus darbas turi teigiamos reikšmės tarpasmeniniams santykiams – romantinių santykių vertinimas tampa pozityvesnis [20]. Pastarieji rezultatai aiškinami tuo, kad linkę į priklausomybę nuo darbo asmenys patenkina pripažinimo, saviraiškos, statuso poreikius ir suvokia savo darbo veiklą kaip prasmingą, todėl pagerėja jų emocinė savijauta [21], o kartu palankiau vertinamos ir kitos gyvenimo sritys, pvz., romantiniai santykiai.

Kita vertus, esama daugiau įrodymų, kad labiau išreikštas polinkis į priklausomybę nuo darbo siejamas su prastesniu romantinių santykių vertinimu [22, 23, 24]. Polinkio į priklausomybę nuo darbo nulemtas prastesnis romantinių santykių vertinimas aiškinamas stresu, kylančiu dėl pernelyg aukštų darbo reikalavimų ir per didelio darbo krūvio [25]. Tai pasireiškia padidėjusiu asmens dirglumu bei kylančiomis nemaloniomis emocijomis [22]. Esant

suprastėjusiai emocinei būklei, asmuo gali jausti mažesnį emocinį prisirišimą, fizinį potraukį ir gali tapti mažiau rūpestingas partnerio atžvilgiu [19]. Patiriamas stresas ir neigiama emocinė būklė perduodama romantiniam partneriui, todėl neigiamai paveikiama santykių kokybė ir jų dinamika. Tai atitinkamai skatina polinkiu į priklausomybę nuo darbo pasižyminčius asmenis prasčiau vertinti romantinius santykius. Kitas galimas neigiamo ryšio paaiškinimas – dažnesni konfliktai poroje. Polinkiu į priklausomybę nuo darbo pasižymintys asmenys skiria itin daug laiko ir energijos darbui, o tai riboja galimybes patenkinti šeimai svarbius saugumo, intymumo, pripažinimo ir meilės poreikius [21]. Tai sukelia konfliktus poroje bei didina patiriamą nuovargį ir išsekimą, kurie dar labiau apsunkina bendravimą su partneriu [26]. Natūralu, kad ilgainiui tai gali lemti prastesnį romantinių santykių vertinimą. Neigiamas reiškinių ryšys taip pat aiškinamas nepakankama polinkiu į priklausomybę nuo darbo pasižyminčių asmenų gaunama emocine parama. Asmenys, linkę į priklausomybę nuo darbo, dažnai atsiriboja nuo savo partnerio [21], jam (jai) neskiria pakankamai laiko [27]. Dėl šių priežasčių patys gauna mažiau emocinės paramos [28], o tai gali pasireikšti bendru nusivylimu romantiniais santykiais.

Galiausiai, polinkio į priklausomybę nuo darbo ir prastesnio romantinių santykių vertinimo sąsaja aiškinama atsistatymo modeliu (angl. *recovery model*) [29]. Remiantis šiuo modeliu, dirbdamas asmuo patiria stresą, sužadinama jo psichofiziologinė sistema, kuri turėtų būti nuslopinta kompensaciniu būdu, t. y. ilsintis. Tačiau polinkiu į priklausomybę nuo darbo pasižymintys asmenys dirba ilgas valandas ir negeba atsiriboti nuo darbo. Jų darbo krūvis yra nuolatinis, atsistatoma nepakankamai, dėl to stresas tampa lėtinis, o kartu su juo kyla emocinis išsekimas [30]. Ilgainiui nuovargis mažina norą bendrauti, o pats asmuo tampa apatiškas ir lydimas tuštumos jausmo [31]. Dėl to nukenčia romantiniai santykiai, nes jiems palaikyti būtinas artimas bendravimas bei laikas kartu [32], o tai, nepakankamai pailsėjus ir daug dirbant, sunkiai įgyvendinama. Taigi, atsižvelgiant į anksčiau pateiktus argumentus ir daugumos tyrimų rezultatus, šiame darbe keliama prielaida: labiau išreikštas polinkis į priklausomybę nuo darbo susijęs su prastesniu romantinių santykių vertinimu.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Tyrimo imtis ir procedūra. Atliktas kiekybinis skerspjūvio tyrimas, vykdytas 2025 m. vasario–kovo mėnesiais. Duomenys rinkti patogiosios netikimybinės atrankos principu. Kvietimas dalyvauti tyrime ir su juo susijusi informacija paskelbti socialiniuose tinkluose bei potencialiems dalyviams siųsti asmeniškai. Tyrimo dalyviai turėjo užpildyti elektroninę anketą *Google Forms* platformoje. Prieš pildydami anketą dalyviai buvo supažindinti su informuoto sutikimo forma, t. y. tyrimo tikslu, dalyvavimo jame sąlygomis ir informuoti apie anonimiškumą, konfidencialumą bei savanorišką dalyvavimą. Apklausą užpildę asmenys sutiko dalyvauti tyrime ir pažymėjo esą dirbantys bei įsitraukę į romantinius santykius. Tyrimas paremtas savanoriškumo principu, papildomos skatinimo priemonės netaikytos.

Norą dalyvauti tyrime išreiškė 260 žmonių, tačiau galutinę imtį sudarė 215 dirbančių suaugusiųjų, atitikusių atrankos kriterijus. Dalyvių moterų buvo žymiai daugiau (74 proc.) nei vyrų (26 proc.). Vidutinis dalyvių amžius – 33 metai (SD = 8,4). Dauguma (80 proc.) tyrimo dalyvių nurodė turintys aukštąjį išsilavinimą. Tiriamieji nurodė dažniausiai dirbantys viešajame (63,3 proc.), rečiau – privačiame (29,3 proc.) sektoriuose. Mažiausia dalyvių grupė dirbo kitokio pobūdžio organizacijose (7,4 proc.). Vidutinis dalyvių darbo stažas esamoje darbovietėje – 7,2 metų (SD = 7,2). Beveik pusės (47,9 proc.) dalyvių santykiai truko 6 metus ar ilgiau. Beveik pusė (46 proc.) tyrimo dalyvių nurodė palaikantys santykius, tačiau yra nesusituokę ir nesusižadėję, šiek tiek mažiau (42,8 proc.) – susituokę, o mažuma (11,2 proc.) nurodė esantys susižadėję. Didžioji dalis (81,9 proc.) tiriamųjų nurodė gyvenantys kartu su partneriu, kita dalis (18,1 proc.) nurodė gyvenantys atskirai.

Metodika. Polinkiui į priklausomybę nuo darbo matuoti naudota Bergeno priklausomybės nuo darbo skalė (BWAS) [1], kurią sudaro 7 teiginiai, matuojantys visus priklausomybėms būdingus požymius (svarbumas, nuotaikos pokyčiai, tolerancija, nutolimas, konfliktai, atkrytis ir problemos). Skalės klausimo pavyzdys: „Kaip dažnai per pastaruosius metus pagalvodavote, kaip rasti daugiau laiko darbui?“. Teiginiai vertinti pagal 5 balų Likerto skalę (1 – „Niekada“, o 5 – „Visada“). Bendras skalės įvertis – nuo 7 iki 35 balų; didesnis balų skaičius siejamas su labiau išreikštu polinkiu į priklausomybę nuo darbo. Skalės vidinio suderinamumo koeficientas (Cronbacho alfa)

šiame tyrime siekė 0,845.

Romantinių santykių vertinimas atliktas naudojant Santykių vertinimo skalę (RAS) [2], sudarytą iš 7 klausimų. Skalės klausimo pavyzdys: „Kaip gerai Jūsų partneris (-ė) atitinka jūsų poreikius?“. Teiginiai vertinti pagal 5 balų Likerto skalę, kur 1 reiškė prastą vertinimą, o 5 – puikų vertinimą. Bendras skalės įvertis – nuo 7 iki 35 balų; didesnis balų skaičius reiškia palankesnį romantinių santykių vertinimą. Šiame tyrime skalės vidinio suderinamumo koeficientas (Cronbacho alfa) siekė 0,81.

Papildomai rinkti duomenys apie dalyvių amžių, lytį, išsilavinimą, darbo stažą esamoje darbovietėje, sektorių, kuriame dirbama, romantinių santykių trukmę, jų statusą bei gyvenimą kartu su partneriu.

Statistika. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant *IBM SPSS STATISTICS 24.0* versiją. Skaičiavimai pradėti nuo aprašomosios statistikos. Skirtumams tarp dviejų grupių tikrinti naudotas Stjudento-t (*Student*) testas, o daugiau nei tarp dviejų grupių – vienfaktorė dispersinė analizė (ANOVA). Ryšio tarp kintamųjų analizei naudota Pirsono (*Pearson*) ir dalinė koreliacija. Taikytas statistinio reikšmingumo lygmuo – $p \leq 0,05$.

TYRIMO REZULTATAI

Aprašomoji statistika. 1 lentelėje pateikiama aprašomoji tyrimo kintamųjų statistika (vidurkiai (M) ir standartiniai nuokrypiai (SD)).

Ryšys su sociodemografinėmis charakteristikomis. Pagrindinių tyrimo kintamųjų skirtumai pagal sociodemografines charakteristikas pateikiami 2 lentelėje.

Atlikus kintamųjų palyginimą (žr. 2 lentelę), reikšmingų polinkio į priklausomybę nuo darbo skirtumų pagal lytį, išsilavinimą, organizacijos, kurioje dirbama, tipą bei santykių ypatumus (statusą ir gyvenimą kartu ar atskirai) nenustatyta. Reikšmingų romantinių santykių vertinimo skirtumų pagal lytį, išsilavinimą ir organizacijos tipą taip pat nerasta. Nustatyta, kad romantinių santykių vertinimas skiriasi pagal santykių statusą: susižadėję asmenys savo romantinius santykius vertino palankiausiai, o susituokę – mažiausiai palankiai. Taip pat nustatyta, kad asmenys, gyvenantys kartu su partneriu, savo romantinius santykius vertina palankiau, palyginti su gyvenančiaisiais atskirai.

Toliau tikrinta polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių vertinimo sąsaja su tyrimo dalyvių amžiumi, santykių trukme ir darbo stažu. Rezultatai pateikiami 3 lentelėje.

Statistiškai reikšmingų sąsajų tarp polinkio į priklausomybę nuo darbo, romantinių santykių vertinimo ir santykių trukmės, darbo stažo bei amžiaus nenustatyta (žr. 3 lentelę).

Hipotezės tikrinimas. Tolesniu etapu atliktas ryšio tarp pagrindinių tyrimo kintamųjų tikrinimas. Nustatytas statistiškai reikšmingas neigiamas ryšys tarp polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių vertinimo ($r = –0,232$, $p = 0,001$). Taigi, kuo labiau išreikštas polinkis į priklausomybę nuo darbo, tuo prastesnis romantinių santykių vertinimas.

Atsižvelgiant į nustatytus statistiškai reikšmingus romantinių santykių vertinimo skirtumus pagal santykių statusą ir gyvenimą kartu arba atskirai, atlikta dalinė koreliacija ryšiui tarp polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių įvertinti. Taikytas minėtų sociodemografinių kintamųjų kontroliavimas. Nustatyta, kad kontroliuojant reikšmingus sociodemografinius kintamuosius sąsaja išlieka statistiškai reikšminga ($r = –0,216$, $p = 0,001$).

REZULTATŲ APTARIMAS

Atsižvelgiant į didėjantį polinkio į priklausomybę nuo darbo paplitimą, jo daromą žalą ir vis gausėjančius duomenis apie galimus neigiamus šio reiškinio padarinius, tampa itin svarbu toliau vykdyti šios srities tyrimus. Jau žinoma apie tam tikras reiškinio pasekmes asmeniui ir organizacijai, tačiau kol kas nepakankamai ištirtas polinkio į priklausomybę nuo darbo poveikis tarpasmeniniams santykiams. Todėl šiuo tyrimu siekta nustatyti ryšį tarp polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių vertinimo.

Tyrime kelta hipotezė patvirtinta. Nustatyta, kad polin-

1 lentelė. Aprašomoji statistika

	M	SD
Polinkis į priklausomybę nuo darbo	18,95	6,09
Romantinių santykių vertinimas	27,35	4,65

kis į priklausomybę nuo darbo susijęs su prastesniu romantinių santykių vertinimu. Tokie rezultatai sutampa su ankstesnių tyrimų rezultatais [pvz., 22, 23]. Gauti rezultatai aiškinami tuo, kad perteklinis darbas padidina stresą, įtampą [33], dirglumą [22], o tai veda prie emocinio išsekimo [26]. Dėl to pamažu prarandamas emocinis prisirišimas, šilti jausmai ir potraukis partneriui [19]. Taip pat linkę į priklausomybę nuo darbo asmenys pernelyg aukojasi ir atsiduoda darbui, jam skiria itin daug laiko, dėl to pritrūksta jėgų santykiams palaikyti, o tai ilgainiui siejama su dar stipresniu nepasitenkinimu santykiais ir prastesniu jų vertinimu [24].

Papildomai analizuoti pagrindinių tyrimo kintamųjų skirtumai pagal sociodemografines charakteristikas. Nustatyta, kad susižadėję asmenys savo romantinius santykius vertina palankiau, palyginti su susituokusiais ar palaikančiais santykius, bet nei susižadėjusiais, nei susituokusiais asmenimis. Tokie rezultatai gali būti aiš-

2 lentelė. Polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių vertinimo skirtumai pagal sociodemografines charakteristikas

Kintamieji	Grupės	Imties dydis	Vidurkiai	Statistinio reikšmingumo įvertis (p)
Lytis				
Polinkis į priklausomybę nuo darbo	Vyrai	64	18,99	0,891
	Moterys	159	18,52	
Romantinių santykių vertinimas	Vyrai	64	27,29	0,753
	Moterys	159	27,52	
Išsilavinimas				
Polinkis į priklausomybę nuo darbo	Turi aukštąjį išsilavinimą	172	19,23	0,189
	Neturi aukštojo išsilavinimo	43	17,86	
Romantinių santykių vertinimas	Turi aukštąjį išsilavinimą	172	27,24	0,511
	Neturi aukštojo išsilavinimo	43	27,77	
Organizacijos tipas				
Polinkis į priklausomybę nuo darbo	Privatus sektorius	63	18,06	0,379
	Viešasis sektorius	136	19,29	
	Kita	16	19,63	
Romantinių santykių vertinimas	Privatus sektorius	63	28,03	0,380
	Viešasis sektorius	136	27,04	
	Kita	16	27,25	
Santykių statusas				
Polinkis į priklausomybę nuo darbo	Susituokę	92	19,60	0,088
	Kuria santykius, bet nei susituokę, nei susižadėję	99	18	
	Susižadėję	24	20,41	
Romantinių santykių vertinimas	Susituokę	92	26,16	**0,003**
	Kuria santykius, bet nei susituokę, nei susižadėję	99	28,04	
	Susižadėję	24	29,04	
Gyvenimas kartu arba atskirai				
Polinkis į priklausomybę nuo darbo	Kartu	176	18,65	0,235
	Atskirai	39	20,33	
Romantinių santykių vertinimas	Kartu	176	27,94	**<0,001**
	Atskirai	39	24,69	

3 lentelė. Polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių vertinimo ryšys su sociodemografinėmis charakteristikomis

		Pirsono (*Pearson*) koreliacijos koeficientas	Statistinio reikšmingumo įvertis (p)
Polinkis į priklausomybę nuo darbo	Santykių trukmė	–0,133	0,052
	Darbo stažas	0,034	0,624
	Amžius	–0,017	0,80
Romantinių santykių vertinimas	Santykių trukmė	–0,152	0,25
	Darbo stažas	–0,174	0,11
	Amžius	–0,017	0,80

kinami tuo, kad susižadėjimas – išskirtinė santykių fazė, kuriai būdingas padidėjęs optimizmas, aukšti lūkesčiai ir emocinis įsitraukimas, dar nepatyrus iššūkių, susijusių su rutina, ir vaidmenų pasikeitimo, kas įprastai pasireiškia susituokus [17, 34, 35]. Taip pat nustatyta, kad asmenys, gyvenantys kartu su partneriu, savo romantinius santykius vertina palankiau, palyginti su gyvenančiaisiais atskirai – tai sutampa su kitų autorių tyrimų rezultatais Tai, kad kartu gyvenantys asmenys palankiau vertina romantinius santykius, aiškintina gaunamu dažnesniu palaikymu iš partnerio, užtikrinančiu pasitenkinimą santykiais [37]. Kartu gyvenantys partneriai dažniau sąveikauja, patiria bendrų įspūdžių ir jaučiasi labiau įsipareigoję, todėl santykiams skiria daugiau išteklių, o tai padeda išlaikyti aukštesnę santykių kokybę. Be to, gyvendami kartu, ypač jauname amžiuje, asmenys jaučia stipresnį artumą, kas taip pat siejama su palankesniu romantinių santykių vertinimu [36].

Atliktas tyrimas turi tam tikrų ribotumų. Pirmiausia, tyrimo dalyviai atrinkti patogiosios netikimybinės atrankos būdu, todėl gauti rezultatai yra mažiau reprezentatyvūs. Tyrimo rezultatų reprezentatyvumą taip pat mažina ir tyrimo imtis pagal dalyvių kiekį bei lyčių pasiskirstymą. Be to, tyrimas atliktas Lietuvoje, todėl jo rezultatai turi ribotą pritaikomumą kitose šalyse ir kultūrose. Taip pat, kadangi tyrime dalyvavo gana specifinė imtis (netikimybinė, nereprezentatyvi, Lietuvoje gyvenančių asmenų), tikėtina, kad rezultatams įtakos galėjo turėti jai būdingi socialiniai, kultūriniai ar darbo aplinkos ypatumai. Tiriant kitokių charakteristikų imtis gali būti gaunami kitokie rezultatai. Siekiant padidinti rezultatų reprezentatyvumą ir pritaikomumą, rekomenduojama rinkti didesnes imtis, tirti įvairių kultūrų atstovus ir siekti tolygaus dalyvių pasiskirstymo lyties požiūriu. Be to, tyrimas vykdytas nuotoliniu būdu, o tai neleido įvertinti ir kontroliuoti įvairių rezultatams potencialiai svarbių veiksnių. Šio ribotumo būsimuose tyrimuose galima išvengti renkantis kitus tyrimo metodus. Galiausiai, tyrimui atlikti pasirinktas skerspjūvio metodas, ribojantis galimybę nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius, todėl rezultatų interpretacija paremta tik teorinėmis prielaidomis. Ateityje rekomenduotina atlikti longitudinius tyrimus, leidžiančius daryti patikimesnes išvadas.

IŠVADOS

1. Nustatyta reikšminga neigiama sąsaja tarp polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių vertinimo: labiau išreikštas polinkis į priklausomybę nuo darbo susijęs su prastesniu romantinių santykių vertinimu.
2. Kontroliuojant santykių statusą ir gyvenimo kartu / atskirai kintamuosius, neigiamas ryšys tarp polinkio į priklausomybę nuo darbo ir romantinių santykių vertinimo išlieka statistiškai reikšmingas.

PADĖKA

Už empirinių tyrimo duomenų rinkimą autoriai dėkoja Monikai Bagdonaitei.

Straipsnis gautas 2026-02-02, priimtas 2026-05-03

Literatūra

1. Andreassen CS, Griffiths MD, Hetland J, Pallesen S. Development of a work addiction scale. Scandinavian Journal of Psychology. 2012;53(3):265–272. DOI:10.1111/j.1467-9450.2012.00947.x.
2. Hendrick SS. A generic measure of relationship satisfaction. Journal of Marriage and the Family. 1988;50:93–98. DOI:10.2307/352430.
3. Andersen FB, Djugum ME, Sjåstad VS, Pallesen S. The prevalence of workaholism: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology. 2023;14:1252373. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1252373.
4. Kornaszewska-Polak M. Balancing between professional and private life: Analysis of psychological determinants in family context. Family Forum. 2021;11:15–34. DOI: 10.25167/FF/3979.
5. Oates WE. On being a workaholic. Pastoral Psychology. 1968;19(8):16–20. DOI: 10.1007/BF01785472.
6. Morkevičiūtė M, Endriulaitienė A. Defining the border between workaholism and work addiction: A systematic review. International Journal of Mental Health and Addiction. 2023;21(5):2813–2823. DOI: 10.1007/s11469-022-00757-6.
7. Clark MA, Smith RW, Haynes NJ. The Multidimensional Workaholism Scale: Linking the conceptualization and measurement of workaholism. Journal of Applied Psychology. 2020;105(11):1281–1307. DOI: 10.1037/apl0000484.
8. Griffiths M. A 'components' model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use. 2005;10(4):191–197. DOI: 1080/14659890500114359.
9. Balducci C, Alessandri G, Zaniboni S, Avanzi L, Borgogni L, Fraccaroli F. The impact of workaholism on day-level workload and emotional exhaustion, and on longer-term job performance. Work & Stress. 2021;35(1):6–26. DOI: 10.1080/02678373.2020.1735569.
10. McFarlane TA, Morgan SS. Work addiction and work-related depression in Jamaica: What is the cost of too much work? Psychological Applications and Trends. 2024:266–270. DOI: 10.36315/2024inpact055.
11. Salanova M, López-González AA, Llorens S, Del Líbano M, Vicente-Herrero MT, Tomás-Salvá M. Your work may be killing you! Workaholism, sleep problems and cardiovascular risk. Work & Stress. 2016;30(3):228–242. DOI: 10.1080/02678373.2016.1203373.
12. Airagnes G, Fisk D, Haddad RE, Le Faou AL, Limosin F. Burnout mediates the association between workaholism and substance use: Findings from a French National Company. Journal of Prevention. 2024;45(3):451–466. DOI: 10.1007/s10935-024-00770-6.
13. Falco A, Girardi D, Dal Corso L, De Carlo A, Di Sipio A. Does workload moderate the association between perfectionism and workaholism? Journal of Personnel Psychology. 2020;19:1–11. DOI: 10.1027/1866-5888/a000253.
14. Borges EM, Sequeira CA, Queirós CM, Mosteiro-Díaz MP. Workaholism, engagement and family interaction: Comparative study in Portuguese and Spanish nurses. Journal of Nursing Management. 2021;29(4):731–740. DOI: 10.1111/jonm.13213.
15. Balducci C, Menghini L, Conway PM, Burr H, Zaniboni S. Workaholism and the enactment of bullying behavior at work: A prospective analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(4):2399. DOI: 10.3390/ijerph19042399.
16. Hendrick SS, Hendrick C. Measuring respect in close relationships. Journal of Social and Personal Relationships. 2006;23(6):881–899. DOI: 10.1177/0265407506070471.
17. Bühler JL, Krauss S, Orth U. Development of relationship satisfaction across the life span: A systematic review and meta-analysis. Psychological Bulletin. 2021;147(10):1012–1040. DOI: 10.1037/bul0000342.
18. Ward PJ, Lundberg NR, Zabriskie RB, Berrett K. Measuring marital satisfaction: A comparison of the revised dyadic adjustment scale and the satisfaction with married life scale. Marriage & Family Review. 2009;45(4):412–429. DOI: 10.1080/01494920902828219.
19. Bakker AB, Demerouti E, Burke R. Workaholism and relationship quality: A spillover-crossover perspective. Journal of Occupational Health Psychology. 2009;14(1):23–33. DOI: 10.1037/a0013290.
20. Asghar M, Badshah S, Bano M. Workaholism as an outcome of childhood experiences and its effect on health and sleep. Peshawar Journal of Psychology and Behavioral Sciences. 2017;3(1):105–121. DOI: 10.32879/pjpbs.2017.3.1.105-121.
21. Chrapek E. Workaholism and its consequences for the functioning of the family system. Daroczi M, Robak E, Vinogradov S, eds. Management, organizations and society. Agroinform Publishing House; 2017:187–193. DOI: 10.18515/dBEM.M2017.n01.ch19.
22. Enache RG, Matei RS. Consequences of work dependence on couple life. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2019. DOI: 10.15405/epsbs.2019.08.03.152.
23. Russo E, Atroszko P, Zaniboni S, Toderi S, Balducci C. The relationship between workaholism and personal burnout in dual-earner couples: an analysis using the actor-partner interdependence model. Sustainability. 2023;15(17):13009. DOI: 10.3390/su151713009.
24. Ferguson M. You cannot leave it at the office: Spillover and crossover of coworker incivility. Journal of Organizational Behavior. 2012;33(4):571–588. DOI: 10.1002/job.774.
25. DeMott B, Aziz S, Wuensch K, Dolbier C. Labor of love or love of labor? Psychological capital's mitigating role in the relationship between workaholism and work stress. Work. 2023;74(1):341–352. DOI: 10.3233/wor-210467.
26. Sawhney G, Delongchamp A, Sinclair RR, Britt TW. Daily expression of workaholism and family outcomes: The buffering and magnifying effects of economic resources. Stress and Health. 2023;39(1):74–86. DOI: 10.1002/smi.3169.
27. Soroka E, Iwanicka A, Olajossy M. Workaholism: Psychological and social determinants of work addiction. Current Problems of Psychiatry. 2020;21(1):7–14. DOI: 10.2478/cpp-2020-0001.
28. Peplińska A, Wojdylo K, Kosakowska-Berezecka N, Połomski P. The role of purpose in life and social support in reducing the risk of workaholism among women in Poland. Health Psychology Report. 2015;3(4):326–335. DOI: 10.5114/hpr.2015.50902.
29. Geurts SA, Sonnentag S. Recovery as an explanatory mechanism in the relation between acute stress reactions and chronic health impairment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 2006;32(6):482–492. DOI: 10.5271/sjweh.1053.
30. Khoo EJ, Aldubai S, Ganasegeran K, Lee BX, Zakaria NA, Tan KK. Emotional exhaustion is associated with work related stressors: a cross-sectional multicenter study in Malaysian public hospitals. Archivos Argentinos de Pediatría. 2017;115(3):212–219. DOI: 10.5546/aap.2017.eng.212.
31. Kato L, Radchuk O, Tukaiev S. The influence of emotional burnout on relational maintenance strategies. European Psychiatry.

2017;41(1):S706. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2017.01.1257.
32. Walsh CM, Neff LA, Gleason ME. The role of emotional capital during the early years of marriage: Why everyday moments matter. Journal of Family Psychology. 2017;31(4):513–527. DOI: 10.1037/fam0000277.
33. Atroszko PA, Kun B, Buźniak A, Czerwiński SK, Schneider Z, Woropay-Hordziejewicz N, ... Charzyńska E. Perceived coworkers' work addiction: Scale development and associations with one's own workaholism, job stress, and job satisfaction in 85 cultures. Journal of Behavioral Addictions. 2025;14(1):246–262. DOI: 10.1556/2006.2025.00011.
34. Cassepp-Borges V, Gonzales JE, Frazier A, Ferrer E. Love and relationship satisfaction across romantic relationship stages. Trends in Psychology. 2023;1–16. DOI: 10.1007/s43076-023-00333-4.
35. Dupuis HE, Girme YU, Overall NC, Cross EJ, Sibley CG. Changes in well-being and relationship satisfaction in the years before and after marriage in a sample of New Zealand adults. Journal of Social and Personal Relationships. 2025;42(4):1079–1101. DOI: 10.1177/02654075251315199.
36. Józefacka NM, Szpakiewicz E, Lech D, Guzowski K, Kania G. What matters in a relationship-Age, sexual satisfaction, relationship length, and interpersonal closeness as predictors of relationship satisfaction in young adults. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023;20(5):4103. DOI: 10.3390/ijerph20054103.
37. Lewin AC. Health and relationship quality later in life: A comparison of living apart together (LAT), first marriages, remarriages, and cohabitation. Journal of Family Issues. 2017;38(12):1754–74. DOI: 10.1177/0192513X16647982.

THE LINK BETWEEN WORK ADDICTION AND THE ASSESSMENT OF ROMANTIC RELATIONSHIPS: AN EMPIRICAL ANALYSIS

***Gabrielė Jackevič*[1], *Modesta Morkevičiūtė*[1,2]**
[1]*Department of Psychology, Vytautas Magnus University*
[2]*Vytautas Kavolis Transdisciplinary Research Institute, Vytautas Magnus University*

SUMMARY

Aim. The empirical study aimed to determine the relationship between employee work addiction and the assessment of romantic relationships.

Methods. The study involved 215 employees (74% women, 26% men). Work addiction was measured using the Bergen Work Addiction Scale (BWAS) [1]. The assessment of romantic relationships was conducted using the Relationship Assessment Scale (RAS) [2]. Additionally, data were collected on sociodemographic characteristics. Statistical tests included Student's t-test, ANOVA, and correlation analysis.

Results. It was found that engaged individuals evaluate their romantic relationships most favorably, whereas married individuals evaluate them least favorably. Individuals who live with their partner evaluate their romantic relationships more favorably compared to those who live separately. Finally, a statistically significant association was found between work addiction and poor evaluation of romantic relationships. This association remains significant after controlling for sociodemographic variables.

Conclusions. The study confirmed that work addiction is associated with harm at the interpersonal level. The results obtained contribute to the scientific literature on this topic and provide evidence-based insights that demonstrate the importance of prevention and intervention regarding work addiction. The findings may be useful for individuals experiencing work addiction, healthcare professionals, and organizational representatives concerned with employee well-being.

Keywords: work addiction, romantic relationships, employees, empirical study.

Received 2 February 2026, accepted 3 May 2026

Correspondence to Gabrielė Jackevič
Vytautas Magnus University
Jonavos str. 66, LT-44191 Kaunas, Lithuania
E-mail: gabriele.jackevic@vdu.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-11

KAUNO MIESTO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MODELIO SPECIALISTŲ POŽIŪRIS Į TEIKIAMOS PAGALBOS VEIKIMĄ

Aistė Kučinskienė, Gerda Kuzmarskienė, Gabrielė Domkutė, Lina Krapavickienė
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

SANTRAUKA

Tikslas – išanalizuoti Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio specialistų požiūrį į teikiamos pagalbos veikimą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Aprašomojo pobūdžio kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę elektroninę apklausą, atliktas 2025 m. spalio–lapkričio mėn. Tyrimo instrumentą sudarė klausimai, skirti įvertinti respondentų socialinius-demografinius rodiklius, profesinę patirtį teikiant pagalbą savižudybės krizę patiriantiems asmenims bei jų požiūrį į Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugų veikimą. Tyrime dalyvavo 251 specialistas, dirbantis su savižudybės krizę patiriančiais asmenimis.

Rezultatai. Daugiau nei pusė (61,7 proc.) specialistų nurodė besijaučiantys pakankamai užtikrinti teikdami pagalbą savižudybės krizę patiriantiems asmenims, o 76,9 proc. respondentų teigė gebantys atpažinti savižudybės rizikos ženklus. Nuo 36,3 proc. iki 50,7 proc. tyrimo dalyvių teigiamai vertino įvairius modelio aspektus: tarpsektorinį bendradarbiavimą, pagalbos teikimo proceso aiškumą ir informacijos prieinamumą, sudarytas sąlygas teikti pagalbą artimiesiems, paslaugų kokybę, savalaikiškumą, prieinamumą ir visapusiškumą. Respondentų nuomone, jų pasirengimą reaguoti į savižudybės krizę labiausiai sustiprintų savižudybės rizikos ženklų atpažinimo kompetencijų stiprinimas (61,8 proc.), tarpsektorinio bendradarbiavimo gerinimas (53,8 proc.) ir edukacinių veiklų plėtra (50,2 proc.).

Išvados. Pagalbos teikėjai teigiamai vertina savo gebėjimus atpažinti savižudybės riziką ir teikti pagalbą savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims. Nors savižudybių prevencijos modelio paslaugas dauguma specialistų vertina palankiai, išlieka iššūkių, susijusių su paslaugų teikimo organizavimu ir įgyvendinimu. Tyrimo rezultatai atskleidžia poreikį nuosekliai stiprinti specialistų kompetencijas bei sistemingai plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti efektyvų modelio veikimą.

Reikšminiai žodžiai: savižudybių prevencija, savižudybės, psichosocialinės paslaugos, pagalbos teikėjai, specialistų požiūris.

ĮVADAS

Savižudybės yra reikšminga visuomenės sveikatos problema globaliu mastu – dėl jų kasmet gyvybę praranda daugiau nei 720 tūkst. žmonių visame pasaulyje [1]. Remiantis Eurostato duomenimis, Lietuva yra tarp šalių, kuriose savižudybių rodikliai vieni aukščiausių Europoje. Higienos instituto duomenimis, 2024 m. Lietuvoje savižudybių rodiklis siekė 19,6 atvejo 100 000 gyventojų, t. y. beveik du kartus viršijo Europos Sąjungos vidurkį (2022 m. – 10,58 atvejo 100 000 gyventojų) [2]. Kauno mieste 2017 m. savižudybių rodiklis siekė 24,4 atvejo 100 000 gyventojų, todėl savivaldybės lygmens koordinuoto modelio diegimas tapo svarbia vietos visuomenės sveikatos priemone [7]. Atsižvelgiant į išliekančius aukštus rodiklius, savižudybių prevencija ir paslaugų prieinamumo užtikrinimas tampa viena iš prioritetinių visuomenės sveikatos krypčių šalyje.

Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad svarbus savižudybių prevencijos programų komponentas yra sistemingas jų vertinimas, leidžiantis identifikuoti stipriąsias puses, problemas ir tobulintinas sritis [3]. Vertinimas gali apimti ne tik objektyvius rodiklius, bet ir specialistų po-

Adresas susirašinėti: Aistė Kučinskienė
Kauno miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
Vaidoto g. 115, 45390 Kaunas
El. p. aiste.kucinskiene@kaunovsb.lt

žiūrį į pagalbos teikimo procesą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, paslaugų prieinamumą bei organizavimo ypatumus. Šiame tyrime savižudybių prevencijos modelio vertinimas buvo atliekamas analizuojant specialistų požiūrį į modelio veikimą, apimant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pagalbos teikimo procesą, paslaugų prieinamumą, informacijos sklaidą, pagalbą savižudybės riziką patiriančiųjų artimiesiems, specialistų kompetencijas, kompleksinės pagalbos užtikrinimą ir su paslaugų teikimu susijusių problemų sprendimo galimybes.

Reaguojant į aukštus savižudybių rodiklius Lietuvoje ir Kauno mieste, 2017 m. Kauno mieste pradėtas įgyvendinti savižudybių prevencijos modelis. Kauno miesto savižudybių prevencijos modelis grindžiamas koordinuotu tarpinstituciniu bendradarbiavimu, kuriame dalyvauja sveikatos priežiūros, psichikos sveikatos, skubiosios pagalbos, socialinių paslaugų, teisėsaugos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, nevyriausybinio sektoriaus ir savivaldybės institucijų atstovai. Modelio paskirtis užtikrinti, kad būtų laiku reaguojama į savižudybės krizę, pagalbos tęstinumą, informacijos perdavimą tarp institucijų pagal jų kompetenciją bei pagalbos prieinamumą ne tik savižudybės krizę patiriančiam asmeniui, bet ir jo artimiesiems. Praktiniu lygmeniu modelis apima rizikos atpažinimą, pirminį reagavimą, nukreipimą ar peradresavimą pagalbos, atvejo stebėseną ir tarpinstitucinį veiksmų derinimą. Į modelį asmenys dažniausiai patenka po savižudybės krizės atpažinimo sveikatos priežiūros, skubiosios pagalbos, teisėsaugos, socialinių paslaugų ar kitose institucijose, iš kurių jie nukreipiami tolimesnės pagalbos pagal situacijos pobūdį ir kompetencijų ribas. Modelio įgyvendinime dalyvaujantys specialistai pagal savo kompetenciją atlieka skirtingas funkcijas: atpažįsta savižudybės riziką, reaguoja krizės situacijoje, nukreipia asmenį pagalbos, teikia sveikatos priežiūros, psichologinę ar socialinę pagalbą, dalyvauja atvejo stebėsenoje ir bendradarbiauja perduodant informaciją tarp institucijų. Informacijos apie pagalbos galimybes sklaidoje ir pagalbos organizavime dalyvauja ne tik sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų specialistai, bet ir teisėsaugos, skubiosios pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, nevyriausybinio sektoriaus bei savivaldybės atstovai.

Nuo modelio įdiegimo stebimas savižudybių rodiklio mažėjimas: per 2017–2024 m. laikotarpį jis sumažėjo 1,7 karto – nuo 24,4 iki 14,2 atvejo 100 000 gyventojų (t. y. 10,3 atvejo 100 000 gyventojų) [2, 7]. Modelio įgyvendinimo vertinimai buvo atlikti 2019 m., 2022 m. ir pakartotinai 2025 m. Šiame straipsnyje pristatomi 2025 m. atlikto vertinimo rezultatai, analizuojant Kauno mieste dirbančių specialistų pasirengimą reaguoti į savižudybės krizę bei jų požiūrį į teikiamų paslaugų veikimą.

Nors Lietuvoje įgyvendinamos savižudybių prevencijos priemonės, vis dar trūksta tyrimų, vertinančių kompleksinių savivaldybės lygmens modelių veikimą specialistų požiūriu.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio specialistų požiūrį į teikiamos pagalbos veikimą.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Tyrimas atliktas 2025 m. spalio–lapkričio mėn., gavus Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimą (Nr. BE-2-117; leidimo data – 2025-10-22). Taikytas aprašomojo pobūdžio kiekybinis tyrimo dizainas, naudojant anoniminę elektroninę anketą, administruojamą per *Google Forms* platformą.

Tyrime dalyvauti buvo kviečiami specialistai, savo profesinėje veikloje galintys susidurti su savižudybės krizę patiriančiais asmenimis ir dirbantys įstaigose, dalyvaujančiose Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio įgyvendinime. Į tyrimą įtrauktos šios įstaigos: Kauno miesto poliklinika, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, Kauno moterų linija, Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kauno miesto socialinių paslaugų centras ir VšĮ Psichologijos centras. Tyrimo dalyviai buvo informuoti apie tyrimo tikslą, eigą ir pateikė informuotą sutikimą dalyvauti tyrime.

Tyrimo instrumentą sudarė tyrimo autorių parengta anketa, skirta įvertinti respondentų socialinius ir demografinius rodiklius (lytį, amžių, profesiją), profesinę patirtį teikiant pagalbą savižudybės krizę patiriantiems asmenims, pasirengimą teikti pagalbą bei subjektyvų savižudybių prevencijos žinių ir įgūdžių vertinimą. Klausimynas apėmė šias sritis: tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pagalbos teikimo procesą, sąlygas teikti pagalbą savižudybės riziką patiriančių asmenų artimiesiems, informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidą, su paslaugų teikimu susijusių problemų sprendimo galimybes, specialistų kompetencijas teikti kokybiškas paslaugas,


Kauno mieste dirbantys specialistai (n = 251)	
Kintamasis	**Proc. (n)**
Lytis	
Vyrai	29,9 (75)
Moterys	70,1 (176)
Profesija	
Sveikatos priežiūros specialistai	3,6 (9)
Psichologai	7,2 (18)
Socialiniai darbuotojai	20,7 (52)
Policijos pareigūnai	36,3 (91)
Ugniagesiai	12,7 (32)
Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai	10,4 (26)
Atvejo vadybininkai	0,8 (2)
Valstybės tarnautojai	2 (5)
Kitų sričių specialistai	6,4 (16)

1 lentelė. Tyrimo dalyvių socialinės ir demografinės charakteristikos

kompleksinės pagalbos užtikrinimą ir paslaugų prieinamumą. Žinioms ir įgūdžiams vertinti taikyta 5 balų Likerto skalė (1 – „Taip“, 5 – „Ne“). Subjektyvus užtikrintumas ir pasirengimas teikti pagalbą vertintas pagal 10 balų skalę (1 – „Visiškai neužtikrintas ir nepasiruošęs“, 10 – „Visiškai užtikrintas ir pasiruošęs“).

Respondentų požiūris į savižudybių prevencijos situaciją Kauno mieste vertintas naudojant autorių sudarytą klausimyną su 6 balų Likerto skale (1 – „Visiškai nesutinku“, 6 – „Neturiu nuomonės“). Klausimyną sudarė teiginiai apie: 1) tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 2) pagalbos teikimo procesą, 3) sąlygas teikti pagalbą savižudybės riziką patiriančių asmenų artimiesiems, 4) informacijos apie teikiamas paslaugas sklaidą, 5) su paslaugų teikimu susijusių problemų sprendimo galimybes, 6) specialistų kompetencijas teikti kokybiškas paslaugas, 7) kompleksinės pagalbos užtikrinimą ir 8) paslaugų prieinamumą.

Tyrime dalyvavo 251 specialistas, dirbantis skirtingose Kauno miesto įstaigose ir galintis susidurti su savižudybės krizę patiriančiais asmenimis. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį buvo netolygus: 75 (29,9 proc.) vyrai ir 176 (70,1 proc.) moterys. Dalyvių amžius svyravo nuo 19 iki 70 metų, amžiaus vidurkis – 41,83 ± 11,83 metų. Pagal profesiją daugiausia dalyvavo policijos pareigūnų (36,3 proc., n = 91), socialinių darbuotojų (20,7 proc., n = 52), ugniagesių (12,7 proc., n = 32) ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojų (10,4 proc., n = 26) (1 lentelė). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant *IBM SPSS Statistics* (versija 29.0.2.0) ir *Microsoft Office 365* programinį paketą. Aprašomojoje analizėje tolydieji kintamieji pateikti kaip vidurkis ir standartinis nuokrypis (m ± SD), o kategoriniai duomenys – procentais (proc.) ir absoliučiais skaičiais (n).



1 pav. Subjektyvus dalyvių savižudybių prevencijos žinių ir įgūdžių vertinimas

REZULTATAI

Analizuojant apklausos duomenis nustatyta, kad daugiau nei pusė (54,6 proc., n = 137) tyrimo dalyvių yra teikę pagalbą savižudybės riziką patiriantiems asmenims, o 58,6 proc. (n = 147) respondentų per pastaruosius dvejus metus dalyvavo savižudybių prevencijos mokymuose.

Vertinant subjektyvų specialistų žinių ir įgūdžių, susijusių su savižudybių prevencija, lygį, nustatyta, kad 61,7 proc. (n = 155) respondentų jaučiasi pakankamai užtikrinti galintys padėti savižudybės krizę patiriantiems asmenims. Be to, 76,9 proc. (n = 193) apklaustųjų nurodė gebantys atpažinti savižudybės rizikos ženklus (1 pav.).


Panašios tendencijos stebimos vertinant bendrą respondentų užtikrintumą savo gebėjimais ir pasirengimą teikti pagalbą savižudybės riziką patiriantiems asmenims. Pagal dešimties balų skalę šio rodiklio vidurkis siekė 6,86 ± 1,89.

Vertinant Kauno miesto specialistų požiūrį į pasirengimą teikti pagalbą savižudybės krizę patiriantiems asmenims nustatyta, kad pusė (50,7 proc., n = 125) respondentų sutinka su tuo, jog pagalba teikiama taikant tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp skirtingų įstaigų.


Beveik pusė (45,9 proc., n = 115) apklaustųjų nurodė, kad pagalbos teikimo procesas yra aiškus, o su juo susijusi informacija – lengvai prieinama, tačiau 13,2 proc. (n = 33) respondentų pažymėjo susiduriantys su procesiniais sunkumais. Panaši tendencija stebima vertinant pagalbos teikimą savižudybės riziką patiriančių asmenų artimiesiems: 47,9 proc. (n = 120) dalyvių mano, kad sąlygos teikti tokią pagalbą yra pakankamos, tačiau 14,0 proc. (n = 35) jas vertina kaip nepakankamas.

Informacijos apie savižudybių prevencijos programas ir pagalbos gavimo galimybes sklaidą viešojoje erdvėje pusė (50,2 proc., n = 126) respondentų vertina kaip pakankamą, tačiau 15,1 proc. (n = 38) su tuo nesutinka. Penktadalis (20,3 proc., n = 51) apklaustųjų nurodė, kad susiduria su sunkumais spręsdami su paslaugų teikimu susijusius iššūkius.

Vertindami specialistų įgūdžius ir pasirengimą teikti pagalbą, 49,4 proc. (n = 124) respondentų sutinka, kad paslaugos yra kokybiškos ir teikiamos laiku. Tačiau pa-



2 pav. Savižudybės prevencijos modelio vertinimo rezultatai



3 pav. Dalyvių pasirengimo reaguoti į savižudybės krizę patirtys

galbos kompleksiškumo vertinimai yra nuosaikesni: 36,3 proc. (n = 91) specialistų mano, kad teikiama pagalba yra visapusiška, o 16,3 proc. (n = 41) ją vertina kaip epizodinę.

Pagalbos prieinamumą 41,1 proc. (n = 103) tyrimo dalyvių vertina gerai, tačiau 17,1 proc. (n = 43) nurodė susiduriantys su prieinamumo sunkumais (2 pav.).


Analizuojant veiksnius, prisidedančius prie specialistų pasirengimo reaguoti į savižudybės krizę, nustatyta, kad didžiausią įtaką, respondentų vertinimu, turėjo dalyvavimas papildomuose mokymuose ar kursuose (63,6 proc., n = 159) bei asmeninė ir profesinė patirtis (58,6 proc., n = 147). Taip pat reikšmingais veiksniais įvardyti kolegų dalijimasis gerąja patirtimi (31,1 proc., n = 78) ir studijų metu įgytos žinios (24,7 proc., n = 62) (3 pav.).

Tarp veiksnių, kurie galėtų sustiprinti specialistų pasirengimą reaguoti į savižudybės krizę, dažniausiai buvo nurodomas savižudybės rizikos ženklų atpažinimo kompetencijų stiprinimas (61,8 proc., n = 155), didesnis tarpsektorinis bendradarbiavimas (53,8 proc., n = 135) bei platesnės apimties edukacinės veiklos savižudybių prevencijos temomis (50,2 proc., n = 126) (4 pav.).

Apibendrinant gautus rezultatus galima teigti, kad Kauno mieste dirbantys specialistai savo pasirengimą teikti pagalbą savižudybės krizę patiriantiems asmenims vertina gana palankiai, ypač akcentuodami gebėjimą atpažinti savižudybės rizikos ženklus ir taikyti praktinius įgūdžius. Tačiau dalies respondentų vertinimai atskleidžia ir tam tikrus sistemos veikimo iššūkius, susijusius su paslaugų organizavimu, prieinamumu bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinimu. Taip pat išryškėja poreikis ateityje labiau stiprinti specialistų kompetencijas ir nuosekliai plėtoti savižudybių prevencijos priemones.

REZULTATŲ APTARIMAS

Tyrimo duomenys rodo, kad Kauno mieste dirbantys specialistai teigiamai vertina savo žinias ir įgūdžius teikti pagalbą savižudybės riziką patiriantiems asmenims. Taip pat dauguma respondentų palankiai vertina pagrindinius savižudybių prevencijos modelio veikimo aspektus, įskaitant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, paslaugų viešinimą, teikiamos pagalbos kokybę ir savalaikiškumą, pagalbą artimiesiems bei pagalbos teikimo proceso aiškumą. Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio įgyvendinimas apima savižudybės rizikos atpažinimą, pirminį reagavimą, asmens nukreipimą pagalbos, informacijos perdavimą tarp institucijų bei pagalbos tęstinumo užtikrinimą. Tai reiškia, kad skirtingų profesinių grupių specialistai modelio veikloje dalyvauja nevienodu mastu, tačiau pagal savo kompetenciją prisideda prie bendro pagalbos teikimo proceso: vieni specialistai dažniau atpažįsta riziką ir pirmieji reaguoja, kiti organizuoja ar teikia tęstinę sveikatos priežiūros, psichologinę ar socialinę pagalbą, dar kiti dalyvauja informacijos perdavimo, bendradarbiavimo ir pagalbos koordinavimo procesuose. Todėl tarpinstitucinis bendradarbiavimas šio modelio įgyvendinime svarbus ne tik kaip bendras principas, bet ir kaip praktinis mechanizmas, užtikrinantis skirtingų institucijų veiksmų suderinamumą. Vertinant kitus savižudybių prevencijos modelio veikimo aspektus,



4 pav. Dalyvių pasiūlymai, kaip pagerinti pasirengimą reaguoti į savižudybės krizę

svarbūs išlieka aiškus pagalbos teikimo procesas, paslaugų prieinamumas, informacijos apie pagalbos galimybes sklaida bei sąlygos teikti pagalbą savižudybės riziką patiriančiųjų artimiesiems. Tyrimo rezultatai rodo, kad dalis specialistų šiuos aspektus vertina palankiai, tačiau kartu identifikuojami sunkumai, susiję su paslaugų prieinamumu, kompleksinės pagalbos užtikrinimu ir praktiniu problemų sprendimu teikiant paslaugas. Vis dėlto penktadalis tyrimo dalyvių nurodė susiduriantys su iššūkiais sprendžiant su paslaugų teikimu susijusius klausimus. Kaip svarbiausias tobulintinas sritis respondentai išskyrė tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimą ir specialistų kompetencijų ugdymą.

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose pabrėžiama, kad veiksmingai savižudybių prevencijai užtikrinti būtinas sklandus tarpsektorinis bendradarbiavimas, visuomenės ir specialistų švietimas, klaidingų įsitikinimų apie savižudybes mažinimas bei specialistų gebėjimų tinkamai reaguoti į savižudybės krizę stiprinimas [8]. Mokslinėje literatūroje taip pat akcentuojama, kad specialistų mokymai, orientuoti į žinių gilinimą, reagavimo į emocinę krizę įgūdžių stiprinimą bei stigmatizuojančių nuostatų mažinimą, yra reikšmingas veiksnys didinant pagalbos teikimo veiksmingumą [9, 10]. Rekomenduojama organizuoti nuoseklius ir reguliarius savižudybių prevencijos mokymus, nes vienkartinės intervencijos dažnai neužtikrina ilgalaikio žinių ir įgūdžių išsaugojimo, ypač esant dideliam specialistų darbo krūviui ir darbuotojų kaitai [10].

Šio tyrimo rezultatai iš esmės atitinka tarptautinėje literatūroje aprašomas tendencijas, pabrėžiančias specialistų kompetencijų stiprinimo ir tarpsektorinio bendradarbiavimo svarbą savižudybių prevencijoje [8, 10].

Nors teikiama pagalba bendrai vertinama teigiamai, rezultatai turėtų būti interpretuojami atsižvelgiant į tyrimo ribotumus. Tyrime naudotas subjektyvus respondentų žinių ir įgūdžių vertinimas, kuris gali būti susijęs su socialinio pageidaujamumo šališkumu. Be to, tiriamųjų pasiskirstymas pagal lytį ir profesiją buvo netolygus. Rezultatams vertinti taikytas autorių sudarytas klausimynas, pritaikytas šio tyrimo tikslui ir Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio vertinimui. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama tęsti reguliarius Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio vertinimus, siekiant nuosekliai įvertinti modelio veikimą ir tobulinti teikiamų paslaugų organizavimą bei kokybę.

IŠVADOS

1. Daugiau nei pusė (61,7 proc.) specialistų nurodė besijaučiantys pakankamai užtikrinti teikti pagalbą savižudybės krizę patiriantiems asmenims.
2. 76,9 proc. specialistų teigia gebantys atpažinti savižudybės rizikos ženklus.
3. Nuo 36,3 proc. iki 50,7 proc. specialistų teigiamai vertina pagrindinius savižudybių prevencijos modelio veikimo aspektus: tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pagalbos teikimo proceso aiškumą, informacijos prieinamumą, sąlygas teikti pagalbą artimiesiems, paslaugų kokybę, kompleksiškumą ir prieinamumą.
4. Tyrimo dalyvių nuomone, jų pasirengimą reaguoti į

savižudybės krizę labiausiai sustiprintų savižudybės rizikos ženklų atpažinimo kompetencijų stiprinimas (61,8 proc.), tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtra (53,8 proc.) ir platesnės apimties edukacinės veiklos (50,2 proc.).

Straipsnis gautas 2026-03-26, priimtas 2026-05-11

Literatūra

1. World Health Organization. Suicide [Internet]. 2025 [cited 2025 Oct 15]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide
2. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Mirties priežastys 2024 [Internet]. Vilnius: Higienos institutas; 2025 [cited 2025 Oct 15]. Available from: https://www.hi.lt/metiniai-leidiniai/
3. Hofstra E, van Nieuwenhuizen C, Bakker M, et al. Effectiveness of suicide prevention interventions: a systematic review and meta-analysis. Gen Hosp Psychiatry. 2020;62:1–10. DOI:10.1016/j.genhosppsych.2019.04.011.
4. Hou X, Wang J, Guo J, et al. Methods and efficacy of social support interventions in preventing suicide: a systematic review and meta-analysis. BMJ Ment Health. 2022;25(1):29–37. DOI:10.1136/ebmental-2021-300318.
5. Torok M, Han J, Baker S, Werner-Seidler A. Suicide prevention using self-guided digital interventions: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet Digit Health. 2020;2(1):e25–e36. DOI:10.1016/S2589-7500(19)30199-2.
6. Sutori S, Hadlaczky G, Eliasson E. Effectiveness of stand-alone digital suicide preventive interventions for the self-management of suicidality: a systematic review and meta-analysis. Int J Behav Med. 2024;31(2):1–15. DOI:10.1007/s41347-023-00374-7.
7. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. Mirties priežastys 2017 [Internet]. Vilnius; Higienos institutas; 2018 [cited 2025 Oct 15]. Available from: https://www.hi.lt/metiniai-leidiniai/
8. World Health Organization. Live life: an implementation guide for suicide prevention in countries [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
9. Hawgood J, Woodward A, Quinnett P, De Leo D. Gatekeeper training and minimum standards of competency. Crisis. 2022;43(6):516–522. DOI:10.1027/0227-5910/a000794.
10. Kingi-Uluave D, Taufa N, Tuesday R, Cargo T, Stasiak K, Merry S, Hetrick S. A review of systematic reviews: gatekeeper training for suicide prevention with a focus on effectiveness and findings. Arch Suicide Res. 2025;29(2):329–346. DOI:10.1080/13811118.2024.2358411.

SPECIALISTS' ATTITUDES TOWARDS THE FUNCTIONING OF SUICIDE PREVENTION MODEL SERVICES IN KAUNAS CITY

Aistė Kučinskienė, Gerda Kuzmarskienė, Gabrielė Domkutė, Lina Krapavickienė
Kaunas City Municipality Public Health Bureau

SUMMARY

The aim of the study. To analyse specialists' attitudes towards the functioning of suicide prevention model services in Kaunas city.

Material and methods. Throughout October and November 2025, a descriptive study design including an electronic survey was conducted. The questionnaire consisted of socio-demographics, experiences in providing support, and attitudes towards the functioning of Kaunas city's suicide prevention model services. The survey included 251 professionals who operate in the field of suicide prevention.

Results. 76.9% of participants reported being able to recognise suicide risk signs, and 61.7% reported feeling confident to provide help during a suicide crisis. Between 36.3% and 50.7% of participants agreed that the prevention model operates through intersectoral cooperation, the support system is clear, timely, easily accessible, and of good quality, information about the system is easily accessible, and there is support for family members. In addition, to improve service delivery, participants suggested focusing on further developing specialists' skills of recognising signs of suicide risk (61.8%), strengthening intersectoral cooperation (53.8%), and organising other related educational trainings (50.2%).

Conclusions. Specialists report sufficient preparedness to recognize suicide risk and provide crisis support. While the suicide prevention model is generally evaluated positively, inconsistencies in service delivery and system-level coordination persist. The findings underscore the need for continued strengthening of professional competencies and more structured inter-institutional cooperation to ensure effective model implementation.

Keywords: suicide prevention, suicide, psychosocial services, aid providers, professionals' attitudes.

Received 26 March 2026, accepted 11 May 2026

Correspondence to Aistė Kučinskienė
Kaunas City Municipality Public Health Bureau
Vaidoto str. 115, LT-45390 Kaunas, Lithuania
E-mail: aiste.kucinskiene@kaunovsb.lt

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-8

PROBLEMATIC PORNOGRAPHY USE AMONG YOUNG WOMEN: ASSOCIATIONS WITH MENTAL HEALTH SYMPTOMS AND SEXUAL FUNCTIONING

Milda Černytė[1], Vesta Burbaitė[1], Robertas Strumila[2], Alvydas Navickas[2]
[1]Vilnius University, Faculty of Medicine, [2]Vilnius University, Faculty of Medicine, Clinic of Psychiatry

SUMMARY

Background. Pornography use has become increasingly accessible, yet research on problematic pornography use (PPU) among women remains limited. While previous research has focused on men, recent findings suggest that PPU may be associated with psychological or sexual effects on women. However, the relationship between PPU, mental health and sexual functioning in women remains not sufficient, highlighting the need for further investigation.

Objectives. The aim of this study was to assess the prevalence of problematic pornography use (PPU) among women aged 18-40 years and to investigate its associations with depressive symptoms, anxiety and sexual functioning.

Methods. An anonymous online survey study was conducted among 197 women aged 18-40 years. Participants completed the Problematic Pornography Consumption Scale (PPCS-6), the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), the Generalized Anxiety Disorder Scale-7 (GAD-7), and the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX). The collected data was analysed using Microsoft Excel and IBM SPSS Statistics. Descriptive statistics, Pearson correlations, independent-samples t-tests, and chi square tests were applied.

Results. An increased risk for PPU (PPCS-6 ≥ 20) was observed in 10.2% of participants. Higher PPCS-6 scores were significantly associated with greater depressive symptoms ($r = 0.23$, $p = 0.001$) and anxiety symptoms ($r = 0.17$, $p = 0.015$). Women in the elevated risk group reported significantly higher depressive symptom scores compared to the lower-risk group ($p = 0.012$). No significant association was identified between PPU and sexual functioning measured by ASEX scale ($r = -0.09$, $p = 0.205$). Relationship status also showed no significant association with PPU or sexual functioning.

Conclusions. The findings suggest that problematic pornography use among women is more linked with psychological distress than with sexual dysfunction. These findings demonstrate the importance of considering mental health when examining problematic pornography use in female populations. PPU could serve as an early indicator of the need for mental health interventions.

Keywords: Problematic pornography use, women, depression, anxiety, sexual functioning.

INTRODUCTION

In recent years, pornography consumption has become widespread and easily accessible across all age and socioeconomic groups. Research indicates that approximately 60.2-91.5 % of adults have viewed pornographic content at least once in the past month, with some engaging in regular use [1]. Approximately 1-23 % of women reported problematic pornography use [2]. Only around 1-1.2 % of women identify as being addicted to pornography [3]. Due to substantially higher consumption rates among men, the majority of earlier research on pornography use and its problems has been predominantly focused on males [4]. However, recent epidemiological data suggest a shift in this pattern. The prevalence of problematic pornography use (PPU) among women appears to be rising, challenging the traditional view of pornography use as an exclusively

Correspondence to Milda Černytė
Faculty of Medicine of Vilnius University
M. K. Čiurlionio str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: cernytemilda@gmail.com

male phenomenon [5,6].

In contrast to men, women's pornography consumptions are characterized by greater diversity in content and especially format. Apart from visual pornography (e.g., video-based material), women more frequently engage with written erotic content, erotic narratives, fanfiction, and audio pornography [5,7]. These forms of consumption are often oriented toward fantasy, emotional intimacy and relational contexts, and may serve purposes beyond sexual arousal alone [8]. This makes the assessment of PPU among women particularly complex. Women's motivations for pornography use are more often linked to leisure activities, stress management and emotion regulation. This may influence the development and expression of PPU differently than in male populations [9].

Contemporary research shows that young women experience symptoms of depression and anxiety more frequently than men. Consequently, psychoemotional difficulties represent a significant risk factor for PPU among women, where such use is often conceptualized as an attempt to regulate negative affect [5,10]. Body image concerns and self-esteem difficulties are particularly important factors in this context. Societal expectations surrounding female sexuality and desirability, combined with the frequent portrayal of unrealistic female body standards in erotic content, may contribute to diminished self-esteem, distorted sexual self-perception and heightened psychological distress [8].

At the same time, the impact of pornography on women's sexual functioning remains a subject of debate in literature. While some publications suggest neutral or even positive effect, an increasing number of studies report associations with sexual arousal difficulties, reduced sexual satisfaction, orgasmic problems or dyspareuni [11,12]. Desensitization, elevated arousal thresholds, decreased responsiveness to partner's sexual stimulation, as well as emotional factors such as guilt, shame and internal conflict related to pornography use, are all possible proposed mechanisms [7]. Additionally, pornography consumption has been linked to poorer relationship quality and reduced emotional intimacy, which may further contribute to sexual dysfunction [13]. Despite growing interest, empirical evidence on PPU among women remains fragmented. Several studies report weak or inconsistent associations between the frequency of pornography use and sexual or psychological outcomes. They emphasize that women's patterns of use and experiences related to it may be more complex than those observed in men [14].

Importantly, research examining pornography use and its problems among women in Lithuania remains extremely scarce. While Lithuania reports one of the highest prevalences of depression and anxiety among adults in the European Union, recent data suggest that younger Lithuanians exhibit different psychosocial patterns. Therefore, it is important to explore whether digital media and sexual content is associated with psychological and sexual health indicators in this cohort. A study examining the associations between PPU, psychoemotional well-being and sexual functioning in a population of young women is both timely and necessary. Such research may help identify risk factors and improve understanding of gender specific mechanisms underlying PPU.

METHODS

Study design and setting. A cross-sectional quantitative anonymous survey was conducted in Lithuania using an anonymous online survey via the Google Forms platform. To increase participant recruitment, the survey link was distributed publicly via social media platforms (e.g., Facebook, Instagram and online communities) between August and November 2025.

Participants and recruitment. The study population consisted of women aged 18-40 years. The age range was selected to focus on women of reproductive age, representing a population with active sexual life and increased exposure to digital sexual content. Inclusion criteria were: (1) female gender and (2) age between 18 and 40 years. Other responses were excluded from the analysis. A total of 197 valid responses were included in the final sample.

Measures. The questionnaire consisted of demographic and psychosocial questions and four standardized instruments:

- Problematic Pornography Consumption Scale - Short Version (PPCS-6), used to assess the risk of PPU [15].
- Arizona Sexual Experience Scale (ASEX), used to evaluate sexual functioning [16].

- Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), used to evaluate depressive symptoms [17].
- Generalized Anxiety Disorder Scale-7 (GAD-7), used to evaluate anxiety symptoms [18].

Internal consistency of the study instruments was assessed using Cronbach's alpha. In the present sample, Cronbach's alpha was 0.88 for PPCS-6, 0.81 for ASEX, 0.88 for PHQ-9, and 0.91 for GAD-7. All instruments were administered using Likert-type response scales. All questionnaires were in Lithuanian. If validated Lithuanian versions were not available, the instruments were translated into Lithuanian by the authors and reviewed for linguistic clarity and consistency. Permission to use standardized instruments was obtained from the original authors or were used in accordance with the respective usage guidelines. The instruments used in this study are widely validated and commonly applied in clinical and research settings. Demographic and psychosocial variables included age, relationship status, sexual orientation, and present mental health disorder diagnosis.

Statistical analysis. Statistical analyses were performed using Microsoft Excel and SPSS version 30.0. A significant level of 0.05 was applied. Descriptive statistics (means, standard deviations, percentages) were used to summarize the data. Associations between variables were assessed using Pearson's correlation coefficient. Group differences were examined using independent-samples t-tests and associations between categorical variables were evaluated using the chi-square test.

Ethical considerations. The study was based on an anonymous online survey with no collection of personally identifiable data. According to local regulations, ethical approval was not required for this type of study. Participation was voluntary and informed consent was obtained electronically from participants prior to completing the questionnaire.

RESULTS

Sample characteristics. The sample characteristics are presented in Table 1.

PPU, depressive symptoms and anxiety. Based on the PPCS-6 scale, the mean total score was 10.99 ± 6.16 and 10.2 % of women met the criteria for elevated risk for problematic pornography use (PPCS-6 ≥ 20). According to the PHQ-9 scale, 49.7 % of all respondents had moderate or severe depressive symptoms (PHQ-9 ≥ 10). This relatively high prevalence may reflect a self-selection bias, as individuals experiencing psychological distress could have been more likely to participate.

Variable	*n* (%)
Age group 18–24	50.3
Age group 25–31	36.0
Age group 32–40	13.7
Heterosexual	71.1
Bisexual	18.8
Homosexual	6.6
Asexual	2.0
Other / no answer	1.5
In relationship	67.0
Diagnosed mental health disorder	24.4

Table 1. Sample characteristics.

Women with elevated PPU risk had significantly higher depressive symptom scores compared to the lower-risk group, while differences in anxiety were not statistically significant (Table 2).

Variable	Low PPU risk	High PPU risk	p-value
PHQ-9 score	9.95 ± 6.01	13.5 ± 4.82	0.012
GAD-7 score	9.16 ± 5.50	10.55 ± 5.19	0.284

Table 2. Comparison of mental health outcomes by PPU riskgroup.

Sexual functioning. According to the ASEX scale, the mean sexual functioning scores was 15.08 ± 4.98. 41.6% of respondents met at least one criteria indicative of sexual dysfunction. 22.3% of women scored ≥ 19 points on the ASEX scale, 39.6 % scored ≥5 on at least one of the questions and 25.4% scored ≥ 4 on three or more questions. Pearson correlation analysis demonstrated that higher PPCS-6 scores were significantly associated with higher depressive symptom scores (PHQ-9 $r = 0.23$, $p = 0.001$) and higher anxiety symptom scores (GAD-7 $r = 0.17$, $p = 0.015$). In contrast, PPU was not significantly related to sexual functioning scores (ASEX $r = -0.09$, $p = 0.205$). Correlation results are presented in Table 3.

PPU by age and sexual orientation. Chi-square analysis showed that problematic pornography use risk did not significantly differ across age groups ($\chi^2(2) = 1.43$,

p = 0.490). The highest prevalence of elevated PPCS-6 scores was observed in 25–31-year group (11.3 %), the lowest prevalence was noted in 32–40-year group. No statistically significant differences in PPU were observed across sexual orientation categories ($\chi^2(4) = 2.33$, p = 0.676).

Variables	r	p-value
PPCS-6 & PHQ-9	0.23	0.001
PPCS-6 & GAD-7	0.17	0.015
PPCS-6 & ASEX	-0.09	0.205

Table 3. Correlations between PPU and psychological and sexual variables.

Relationship status. Women without a romantic partner showed a higher but not statistically significant prevalence of elevated problematic pornography use risk (13.8 %) compared with those women who had a partner (8.3 %) ($\chi^2(1) = 0.91$, p = 0.340). Independent samples t-test demonstrated that PPCS-6 scores did not significantly differ between respondents with or without partner (t(195) = 0.80, p = 0.423). Women without a romantic partner reported significantly higher depressive symptom scores compared with women with a partner (PHQ-9 mean 12.66 ± 6.57 vs 9.15 ± 5.34, t(195) = 4.01, p < 0.001), whereas differences in anxiety (GAD-7 10.00 ± 5.40 vs 8.89 ± 5.40, t(195) = 1.51, p = 0.134) and sexual functioning (ASEX 15.86 ± 5.23 vs 14.70 ± 4.82, t(195) = 1.55, p = 0.123) scores were not statistically significant.

DISCUSSION

This study examined the prevalence of problematic pornography use (PPU) among women aged 18-40 years and explored its possible associations with both mental health and sexual functioning probllems.

Our presented study showed a 10.2 % prevalence of elevated risk for PPU among women in Lithuania based on the PPCS-6 scale. This finding contributes to the growing body of evidence indicating that PPU is also present among women, possibly challenging the "gender-gap" narrative, which historically characterized PPU as a predominantly male issue. Our findings are similar to recent cross-cultural research that suggest female PPU (using PPCS scale) rates range between 0.72 % and 7.01 % across 42 countries, depending on the screening tool used [19]. However, a 2022 study in Poland showed that PPU frequency is approximately 13% in women [20]. Given Lithuania's cultural and historical proximity to Poland (shared past within the Polish-Lithuanian Commonwealth and Soviet-era repression, comparable religious traditions, etc.) these findings may be considered contextually relevant to our population. Based on our results, the observed prevalence appears comparable to higher estimates reported in Western samples. It is important to note that PPCS-6 questionnaire indicates risk, not diagnosis.

Furthermore, no significant age-related differences were observed in this sample ($\chi^2(2)=1.43$, p=0.490). This does not support the assumptions regarding a phenomenon of "digital native" young adults and suggests that psychological and social impacts of PPU may be similarly distributed across different stages of professional and reproductive life for women.

A key finding in this study is the statistically significant association between PPU and symptoms of depression in women. Nearly half (49.7 %) of all respondents reported moderate or severe depressive symptoms (PHQ-9 > 10). This prevalence is extremely high and might suggest that women with existing mental health struggles may have been more likely to participate in this study. When categorizing by PPU risk, women in the elevated risk group exhibited higher depressive symptom scores (PHQ-9 mean 13.5 ± 4.82) compared to the lower risk group (PHQ-9 mean 9.95 ± 6.01). Pearson correlation analysis confirmed that higher PPCS-6 scores had a significant positive correlation with elevated depressive (PHQ-9 r = 0.23, p = 0.001) and anxiety (GAD-7 r = 0.17, p = 0.015) symptoms. Although effect sizes were small, they are consistent with prior literature suggesting that PPU in women may be more closely linked to emotional and psychological processes rather than being solely a manifestation of heightened sexual drive [14,19,21]. Nesse (2022) argues that many mental disorders persist because the mechanisms underlying them arise from evolutionary trade-offs [21]. This framework suggests that hypersexuality may be interpreted not as a distinct disorder, but as a behavioural manifestation of underlying dysregulation in evolved affective and motivational systems associated with psychological distress.

International research regarding the psychoemotional

well-being of young adults suggests that psychological distress is significantly higher among those who have reported PPU [22]. Systematic reviews have shown that individuals experiencing loss of control or compulsive urges related to pornography use report significantly higher levels of depression and emotional exhaustion [23]. In women, this association appears to be more pronounced due to gender-specific psychological and sociocultural factors. Importantly, recent research emphasizes how women's experiences of PPU often may differ qualitatively from men's. Men generally find fault with compulsivity and behavioral dysregulation, while women tend to associate PPU with higher levels of internalized distress, such as shame, guilt, self-blame and overall moral incongruence [19,20,21]. Particularly in relation to negative self-evaluation and self-image. A large study examining female behaviour while seeking treatment showed that help-seeking was predicted not only by negative symptoms related to pornography use, but also by the amount of pornography consumption itself. This suggested that women may perceive only frequent use as problematic even when severe behavioral harm is absent [26].

The statistically significant association between PPU and depressive symptoms observed in this study is modest but consistent with literature and emotion regulation models of problematic sexual behaviours, for example, the Self-Medication Hypothesis [27]. Empirical studies indicate that women experiencing depressive symptoms, loneliness or chronic stress are more likely to watch or read pornography stories as a maladaptive coping strategy aimed at regulating negative affect [28,29]SD = 10.32. In this context, pornography consumption may function similarly to urges observed in gambling [30]. This may provide a short-term relief, however, often reinforces cycles of avoidance and emotional suppression, ultimately exacerbating depressive symptoms [23,29]. Literature describes this as a paradoxical "vicious cycle".

The findings of this study are consistent with the hypothesis that PPU may function both as a maladaptive coping mechanism in response to psychological distress and as a contributing factor that further exacerbates depressive symptoms. However, due to the cross-sectional design of the present study, the direction of these relationships cannot be established and should be interpreted with caution. For example, a prospective study showed that higher levels of depression and anxiety predicted higher use of pornography over time [31].

Taken together with prior evidence, the 24.4 % of respondents with pre-existing mental health diagnoses may represent a subgroup with increased vulnerability to PPU which is more susceptible to escapism of pornography. PPU has been conceptualised in literature not only as a sexual habit but possibly as a symptomatic manifestation of broader emotional dysregulation [19].

However, in this study anxiety symptoms showed a weaker association with PPU. PPCS-6 scores were positively correlated with anxiety symptoms, but group differences were not statistically significant. Previous research has similarly reported mixed findings regarding anxiety, suggesting the possibility that anxiety may influence PPU indirectly through mechanisms like rumination or stress sensitivity rather than serving as a primary driver [29,32,33]. For females depressive symptoms appear to be more of a central psychological feature associated with PPU than anxiety alone.

The prevalence of sexual dysfunction symptoms in our study (41.6%) correspond with existing epidemiological data. McCool-Myers et al. (2018) systematic review shows that global prevalence of female sexual dysfunction was 41% and varies from 13% to 81% depending on the region. This shows that our data falls within the expected range for women of reproductive age [31,32].

An unexpected finding in our study shows no statistically significant correlation between PPU and sexual functioning score. This suggests that pornography consumption, even problematic, is not necessarily associated with impaired self-reported sexual functioning scores or reduced libido [34,35]. Similar patterns have been reported in literature, which indicate that higher pornography use may be associated with better sexual functioning in women, whereas among men higher pornography use has been linked with worse sexual functioning [34]. Women's sexual well-being appears to vary according to pornography use motives, with avoidance-based (e.g., stress reduction) motives being associated with poorer outcomes and approach-based motives (e.g., sexual curiosity) being linked to positive outcomes and sexual experiences [8]. Findings are consistent across diverse cultural settings,

suggesting that motivations may be cross-culturally relevant in understanding women's sexual wellbeing relative to pornography use. This perspective suggests that negative affect, rather than pornography use alone, may underlie associations with problematic use and sexual dysfunction [3,10].

It is important to evaluate relationship context, which also intersects with women's mental health relation to PPU. In this study, women without a romantic partner reported significantly higher depressive symptom scores and showed a non-significant tendency toward higher PPU risk. Previous research has linked loneliness and lack of emotional intimacy to increased reliance on coping mechanisms, including PPU in this case [13,28]. Women's maladaptive emotion regulation strategies may be associated with the absence of supportive relationships as women's emotional well-being is often tied to relational connections, although relationship quality was not assessed. PPU did not significantly differ across sexual orientation groups in the present sample. This finding is consistent with international studies and may indicate that psychological factors of PPU operate similarly across diverse sexual orientations among women [36].

Limitations. This study has several limitations that should be acknowledged. First, the cross-sectional design does not allow causal inference regarding the directionality of the observed associations. Despite theoretical models and prior longitudinal research that suggest bidirectional relationships, our findings should be interpreted as correlational. Second, self-report measures may be affected by the sensitive nature of pornography use and potentially underestimate distress due to social or recall bias. Third, the notably high prevalence of moderate to severe depressive symptoms in the sample suggests possible self-selection bias. Women experiencing psychological distress may have been more likely to participate, especially studying in stressful academic settings such as medicine. This study relied on an online convenience sample, which may further restrict representativeness. Fourth, specific information on pornography use patterns (e.g., duration, content type) and contextual details (e.g., religion, relationship quality, partner attitudes) were not measured.

Additionally, standardized questionnaires used to assess PPU may not fully capture gender-specific patterns. Women are more likely to consume non-visual forms of erotic content, which may be underrepresented in commonly used PPU measures. PPU may be underestimated or mischaracterized in women.

These mixed findings underscore the necessity of adopting a differentiated approach that considers women's motivations, contextual factors and emotional states. Future research should use longitudinal designs, more diverse and representative samples, and broader psychosocial assessments to clarify gender-specific mechanisms underlying PPU.

CONCLUSION

This study found that problematic pornography use (PPU) is present among a notable proportion of young women and is associated with poorer psychoemotional well-being, particularly higher levels of depressive symptoms. Anxiety symptoms showed weaker associations, while no significant relationship was observed between PPU and self-reported sexual functioning. No differences in PPU were observed across age groups or sexual orientation categories, suggesting that psychological factors may be more relevant.

These findings highlight the importance of addressing mental health aspects when considering PPU among young women in a public health context. However, the results should be interpreted with caution, as the study was based on a convenience sample collected through an online survey, which may not fully represent the broader population of young women.

Received 8 March 2026, accepted 30 April 2026

REFERENCES

1. Solano I, Eaton NR, O'Leary KD. Pornography Consumption, Modality and Function in a Large Internet Sample. The Journal of Sex Research. 2020 Jan 2;57(1):92–103. DOI:10.1080/00224499.2018.1532488.
2. Bőthe B, Nagy L, Koós M, Demetrovics Z, Potenza MN, International Sex Survey Consortium, et al. Problematic pornography use across countries, genders, and sexual orientations: Insights from the International Sex Survey and comparison of different assessment tools. Addiction (Abingdon, England) [Internet]. 2024 Feb 27;119(5). DOI: 10.1111/add.16431.
3. Bőthe B, Tóth-Király I, Griffiths M, Potenza M, Gábor O, Demetrovics Z. Are Sexual Functioning Problems Associated with Frequent Pornography Use and/or Problematic Pornography Use? Results from A Large Community Survey Including Males and Females. Addictive Behaviors. 2020 Aug 1;112:106603. DOI:10.1016/j.addbeh.2020.106603.
4. Miller D, Raggatt P. A Literature Review of Studies into the Prevalence and Frequency of Men's Pornography Use. American Journal of Sexuality Education. 2020 Oct 13;15:502–29. DOI:10.1080/15546128.2020.1831676.
5. Bőthe B, Vaillancourt-Morel MP, Bergeron S. Associations Between Pornography Use Frequency, Pornography Use Motivations, and Sexual Wellbeing in Couples. The Journal of Sex Research. 2022 May 4;59(4):457–71. DOI:10.1080/00224499.2021.1893261.
6. Grubbs JB, Hoagland KC, Lee BN, Grant JT, Davison P, Reid RC, et al. Sexual addiction 25 years on: A systematic and methodological review of empirical literature and an agenda for future research. Clinical Psychology Review. 2020 Dec 1;82:101925. DOI:10.1016/j.cpr.2020.101925.
7. Herbenick D, Fu TC, Wright P, Paul B, Gradus R, Bauer J, et al. Diverse Sexual Behaviors and Pornography Use: Findings From a Nationally Representative Probability Survey of Americans Aged 18 to 60 Years. J Sex Med. 2020 Apr 1;17(4):623–33. DOI:10.1016/j.jsxm.2020.01.013.
8. 8. Gewirtz-Meydan A, Feder H, Nagy L, Koós M, Kraus SW, Demetrovics Z, et al. Motives for pornography use and women's sexual wellbeing: Insights from a 42-country study. Journal of Behavioral Addictions. 2025 Feb 12;14(1):114–30. DOI:10.1556/2006.2024.00040.
9. Bőthe B. Why do people watch pornography? The motivational basis of pornography use. Psychology of Addictive Behaviors. 2021 Mar 1. DOI:10.1037/ADB0000603.
10. Wéry A, Billieux J. Problematic cybersex: conceptualization, assessment, and treatment. Addict Behav. 2017;64:238–246. DOI:10.1016/j.addbeh.2015.11.007.
11. Vaillancourt-Morel MP, Blais-Lecours S, Labadie C, Bergeron S, Sabourin S, Godbout N. Profiles of Cyberpornography Use and Sexual Well-Being in Adults. J Sex Med. 2017 Jan 1;14(1):78–85. DOI:10.1016/j.jsxm.2016.10.016.
12. Young Adult Women's Reports of Their Male Romantic Partner's Pornography Use as a Correlate of Their Self-Esteem, Relationship Quality, and Sexual Satisfaction | Sex Roles [Internet]. [cited 2026 Jan 13]. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-012-0164-0.
13. Poulsen FO, Busby DM, Galovan AM. Pornography Use: Who Uses It and How It Is Associated with Couple Outcomes. The Journal of Sex Research. 2013 Jan 1;50(1):72–83. DOI:10.1080/00224499.2011.648027 PubMed PMID: 22449010.
14. 1Prause N, Pfaus J. Viewing Sexual Stimuli Associated with Greater Sexual Responsiveness, Not Erectile Dysfunction. Sex Med. 2015 Jun 1;3(2):90–8. DOI:10.1002/sm2.58.
15. Bőthe B, Tóth-Király I, Demetrovics Z, Orosz G. The Short Version of the Problematic Pornography Consumption Scale (PPCS-6): A Reliable and Valid Measure in General and Treatment-Seeking Populations. The Journal of Sex Research. 2021 Mar 24;58(3):342–52. DOI:10.1080/00224499.2020.1716205.
16. Arizona Sexual Experiences Scale (ASEX). Available from: https://depts.washington.edu/psychres/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/asex_scale.pdf.
17. Montvidas J. Paciento sveikatos klausimynas-9. Available from: https://biological-psychiatry.eu/wp-content/uploads/2019/01/JBPP_2018_v20_No2_57-59.pdf.
18. GAD-7 scale. Available from: https://e-etika.lt/odemsoob/2022/11/GAD7.pdf .
19. Bőthe B, Koós M, Nagy L, Kraus SW, Demetrovics Z, Potenza MN, et al. Compulsive sexual behavior disorder in 42 countries: Insights from the International Sex Survey and introduction of standardized assessment tools. J Behav Addict. 2023 Jun 22;12(2):393–407. DOI:10.1556/2006.2023.00028.
20. Lewczuk K, Wizła M, Glica A, Potenza MN, Lew-Starowicz M, Kraus SW. Withdrawal and tolerance as related to compulsive sexual behavior disorder and problematic pornography use – Preregistered study based on a nationally representative sample in Poland. J Behav Addict. 2022 Oct 20;11(4):979–93. DOI:10.1556/2006.2022.00076.
21. Nesse RM. Why Do Mental Disorders Persist?: Evolutionary Foundations for Psychiatry. In: Abed R, St John-Smith P, editors. Evolutionary Psychiatry [Internet]. 1st ed. Cambridge University Press; 2022. p. 84–100. DOI:10.1017/9781009030564.008.
22. Engelhardt R, Geppert R, Grubbs JB, von Oertzen T, Trommer D, Maes J, et al. Problematic pornography use and psychological distress: A longitudinal study in a large US sample. Addictive Behaviors. 2025 Oct 1;169:108398. DOI:10.1016/j.addbeh.2025.108398
23. Vieira C, Griffiths MD. Problematic pornography use and mental health: a systematic review. Sex Health Compulsivity. 2024;31(3):207–247. DOI:10.1080/26929953.2024.2348624.
24. Mennig M, Tennie S, Barke A. Self-Perceived Problematic Use of Online Pornography Is Linked to Clinically Relevant Levels of Psychological Distress and Psychopathological Symptoms. Arch Sex Behav. 2022;51(2):1313–21. DOI:10.1007/s10508-021-02101-w.
25. Kowalewska E, Szumska I, Lew-Starowicz M. Expanding the Lens: A Systematic Review of the Latest Research on Compulsive Sexual Behavior and Problematic Pornography Use among Women. Curr Addict Rep. 2025 Jun 27;12(1):62. DOI:10.1007/s40429-025-00674-3
26. Grubbs JB, Exline JJ, Pargament KI, Hook JN, Carlisle RD. Transgression as addiction: religiosity and moral disapproval as predictors of perceived addiction to pornography. Arch Sex Behav. 2015;44(1):125–136. DOI:10.1007/s10508-013-0257-z.
27. Kraus SW, Gola M, Lewczuk K, Potenza MN, Kingston DA, Grubbs JB, et al. What should be included in the criteria for compulsive

sexual behavior disorder? J Behav Addict. 2022;11(2):160–165. DOI:10.1556/2006.2020.00090.
28. Cardoso J, Ramos C, Brito J, Almeida TC. Difficulties in Emotion Regulation and Problematic Pornography Use: The Mediating Role of Loneliness. International Journal of Sexual Health. 2023 Jul 3;35(3):481–93. DOI:10.1080/19317611.2023.2224807.
29. Musetti A, Gori A, Alessandra A, Topino E, Terrone G, Plazzi G, et al. The Interplay Between Problematic Online Pornography Use, Psychological Stress, Emotion Dysregulation and Insomnia Symptoms During the COVID-19 Pandemic: A Mediation Analysis. NSS. 2022 Jan;Vol. 14:83–92. DOI:10.2147/NSS.S348242.
30. Testa G, Villena A, Chiclana-Actis C. Emotional Dysregulation and Coping Strategies in the Context of Problematic Pornography Use: A Narrative Review. Current Addiction Reports. 2024 Mar 6;11:1–13. DOI:10.1007/s40429-024-00548-0.
31. Singareddy C, Shrestha S, Zheng A, Harlow BL, Barrington-Trimis JL, Harlow AF. Prospective Association of Symptoms of Depression and Anxiety with Pornography Viewing Frequency Among Young Adults. Archives of Sexual Behavior. 2024 Nov 1. DOI: 10.1007/s10508-024-03024-y/
32. Okabe Y, Takahashi F, Ito D. Problematic Pornography Use in Japan: A Preliminary Study Among University Students. Front Psychol. 2021 Apr 16;12:638354. DOI:10.3389/fpsyg.2021.638354.
33. Vieira C, Griffiths MD. Problematic Pornography Use and Mental Health: A Systematic Review. Sexual Health & Compulsivity. 2024 Jul 2;31(3):207–47. DOI:10.1080/26929953.2024.2348624.
34. Sommet N, Berent J. Porn use and men's and women's sexual performance: evidence from a large longitudinal sample. Psychological Medicine. 2023 May;53(7):3105–14. DOI:10.1017/S003329172100516X.
35. Engelhardt R, Geppert R, Grubbs JB, von Oertzen T, Trommer D, Maes J, et al. Problematic pornography use and psychological distress: A longitudinal study in a large US sample. Addictive Behaviors. 2025 Oct 1;169:108398. DOI:10.1016/j.addbeh.2025.108398.
36. Bőthe B, Tóth-Király I, Griffiths MD, Potenza MN, Orosz G, Demetrovics Z. Are sexual functioning problems associated with frequent pornography use and/or problematic pornography use? Results from a large community survey including males and females. Addictive Behaviors. 2021 Jan 1;112:106603. DOI:10.1016/j.addbeh.2020.106603.

PROBLEMINIS PORNOGRAFIJOS VARTOJIMAS TARP JAUNŲ MOTERŲ: RYŠYS SU PSICHOEMOCINE SVEIKATA IR SEKSUALINE FUNKCIJA

Milda Černytė[1], Vesta Burbaitė[1], Robertas Strumila[2], Alvydas Navickas[2]
[1]Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
[2]Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika

SANTRAUKA

Įvadas. Pastaraisiais metais pornografijos vartojimas tapo vis lengviau prieinamas, tačiau tyrimų apie probleminį pornografijos vartojimą (PPV, angl. *problematic pornography use*) tarp moterų vis dar trūksta. Ankstesni tyrimai buvo dažniau orientuoti į vyrus, tačiau naujausi duomenys rodo, jog PPV gali būti susijęs su moterų psichologinėmis ar seksualinėmis problemomis.

Tikslas – įvertinti probleminio pornografijos vartojimo paplitimą tarp 18–40 metų moterų Lietuvoje ir ištirti PPV sąsajas su psichoemocine sveikata bei seksualine funkcija.

Metodai. Atlikta anoniminė internetinė apklausa (platinta platformose *Facebook*, *Instagram,* studentų grupėse), kurioje dalyvavo 197-ios 18–40 metų amžiaus moterys. Naudotos skalės: probleminio pornografijos vartojimo skalė (PPCS-6), paciento sveikatos klausimynas (PHQ-9), generalizuoto nerimo skalė (GAD-7) ir Arizonos seksualinės patirties skalė (ASEX). Duomenys analizuoti taikant aprašomąją statistiką, Pirsono (*Pearson*) koreliacijos koeficientus, nepriklausomų imčių t-testą bei *chi* kvadrato testą. Reikšmingumo lygmuo – $p < 0,05$.

Rezultatai. Padidėjusi PPV rizika (PPCS-6 ≥ 20) buvo nustatyta 10,2 proc. dalyvių. Didesni PPCS-6 balai reikšmingai siejosi su ryškesniais depresijos ($r = 0,23$, $p = 0,001$) ir nerimo ($r = 0,17$, $p = 0,015$) simptomais, o didesnės rizikos grupėje PHQ-9 įverčiai buvo reikšmingai didesni nei mažos rizikos grupėje ($p = 0,012$). Reikšmingos sąsajos tarp PPV ir seksualinės funkcijos nebuvo nustatyta ($r = –0,09$, $p = 0,205$). Santykių statusas taip pat nebuvo reikšmingai susijęs su PPV ar seksualine funkcija.

Išvados. Rezultatai rodo, jog PPV yra labiau susijęs su psichologiniu distresu nei su seksualine disfunkcija. Šie duomenys pabrėžia psichikos sveikatos vertinimo svarbą nagrinėjant PPV moterų populiacijoje. PPV gali būti ankstyvas požymis, rodantis galimą psichikos sveikatos pagalbos poreikį.

Reikšminiai žodžiai: probleminis pornografijos vartojimas, depresija, nerimas, seksualinė disfunkcija.

Straipsnis gautas 2026-03-08, priimtas 2026-04-30

Adresas susirašinėti: Milda Černytė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
M. K. Čiurlionio g. 21, 03101 Vilnius
El. p. cernytemilda@gmail.com

ISSN 2538-6832 online 2026/2(113)
DOI: https://doi.org/10.47458/VS.2026.2(113)-7

PSICHOEMOCINIAI SUNKUMAI IR SEKSUALINĖ DISFUNKCIJA: PROBLEMINIO PORNOGRAFIJOS VARTOJIMO ĮTAKA JAUNIEMS VYRAMS

Vesta Burbaitė[1], Milda Černytė[1], Robertas Strumila[2], Alvydas Navickas[2]
[1]Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
[2]Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinika

SANTRAUKA

Tikslas – įvertinti probleminio pornografijos vartojimo (PPV) paplitimą tarp 18–40 metų vyrų Lietuvoje ir ištirti PPV sąsajas su psichoemocine sveikata bei seksualine funkcija.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kiekybinis anoniminis skerspjūvio tyrimas, vykdytas 2025 m. kovo–balandžio mėn. internetinės apklausos būdu. Tyrime dalyvavo 488 vyrai. Naudotos validuotos skalės: probleminio pornografijos vartojimo skalė (PPCS-6), paciento sveikatos klausimynas (PHQ-9), generalizuoto nerimo skalė (GAD-7) ir Arizonos seksualinės patirties skalė (ASEX). Duomenys analizuoti taikant aprašomąją statistiką, Spirmeno (*Spearman*) koreliacijos koeficientus, nepriklausomų imčių t-testą bei *chi* kvadrato testą. Reikšmingumo lygmuo – $p < 0,05$.

Rezultatai. PPV rizika nustatyta 23,4 proc. respondentų. Vidutiniai ar sunkesni depresijos simptomai (PHQ-9 ≥ 10) nustatyti 34 proc., nerimo simptomai (GAD-7 ≥ 10) – 21,1 proc. tiriamųjų. PPV rizikos grupei priklausantys vyrai pasižymėjo statistiškai reikšmingai aukštesniais depresijos ir nerimo įverčiais ($p < 0,001$). Nustatyta silpna, tačiau statistiškai reikšminga koreliacija tarp PPV ir seksualinės funkcijos sutrikimų ($r = 0,11$; $p = 0,013$). Seksualinės disfunkcijos požymiai nustatyti 16,0 proc. respondentų. PPV dažnis buvo didesnis tarp 25–31 metų vyrų bei tarp neturinčiųjų partnerės ar partnerio ($p < 0,05$).

Išvados. Probleminis pornografijos vartojimas yra paplitęs tarp jaunų vyrų Lietuvoje ir reikšmingai siejasi su depresijos, nerimo simptomais bei prastesniais seksualinės funkcijos rodikliais. Gauti rezultatai rodo, kad PPV gali būti susijęs su įvairiomis psichoemocinės ir seksualinės sveikatos problemomis, bei pagrindžia tolesnių tyrimų poreikį.

Reikšminiai žodžiai: probleminis pornografijos vartojimas, depresija, nerimas, seksualinė disfunkcija.

ĮVADAS

Erotinis turinys niekada anksčiau istorijoje nebuvo taip lengvai pasiekiamas, toks anonimiškas ir plačiai vartojamas kaip šiandien. Per pastaruosius dešimtmečius interneto naudojimas eksponentiškai išaugo ir tapo neatsiejama kasdienybės dalimi 5,56 milijardams (67,9 proc.) žmonių [1]. Technologijos ir internetas sparčiai tobulėja ir tampa vis labiau prieinamas įvairioms socioekonominėms grupėms. Toks interneto pasiekiamumas leidžia labai lengvai pasiekti ir seksualinį turinį, kuris šiuo metu apima 4 proc. interneto puslapių ir sudaro iki 20 proc. visų internetinių paieškų [2]. Didžioji dauguma su pornografija susiduriančių žmonių yra jauni vyrai. Tyrimai rodo, jog pornografijos paplitimas tarp vyrų yra apie 60–98 proc., o tarp moterų šis rodiklis svyruoja nuo 30 proc. iki 90 proc. [3, 4].

Nors pats pornografijos žiūrėjimas nėra laikomas patologiniu elgesiu, vis dažniau literatūroje aprašoma vartotojų grupė, kuriai toks elgesys sukelia sunkumų kasdieniame gyvenime. Neretai tai pasireiškia savikontrolės praradimu, kompulsyviu poreikiu grįžti prie erotinio turinio, didėjančiu tolerancijos lygiu, gėdos bei kaltės jausmais. Tokie simptomai ilgainiui sukelia psichologinį distresą, savęs nuvertinimą, kontrolės jausmo praradimą, suprastėjusius santykius su partnere (-iu) ar net seksualinės

Adresas susirašinėti: Milda Černytė
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas
M. K. Čiurlionio g. 21, 03101 Vilnius
El. p. cernytemilda@gmail.com

funkcijos problemas. Ši būklė literatūroje įvardijama kaip probleminis pornografijos vartojimas (PPV) [5, 6].

Probleminio pornografijos vartojimo samprata literatūroje yra prieštaringa. Nei DSM-5, nei Amerikos psichiatrų asociacijos rekomendacijos nepripažįsta pornografijos priklausomybės kaip atskiro sutrikimo. Vis dėlto PPV vertinamas kaip kompulsinio seksualinio elgesio forma, kuri TLK-11 pripažįstama kaip atskiras sutrikimas [7]. Dalis tyrėjų pabrėžia, jog PPV turi panašumų su kitomis priklausomybėmis: pokyčiais dopaminerginėje sistemoje, didėjančiu noru ieškoti intensyvesnio pornografinio turinio bei tolerancijos didėjimu [8]. Tyrimai rodo, kad kompulsyvaus seksualinio elgesio metu aktyvinamos tos pačios smegenų sritys, kurios yra susijusios ir su priklausomybės mechanizmais, ypač atlygio ir motyvacijos sistemomis – šie procesai panašūs į kitų elgesio ar psichoaktyviųjų medžiagų sukeltus neurobiologinius pokyčius [9, 10].

Be neurobiologinių panašumų, kompulsyvaus seksualinio elgesio metu pasireiškiantys simptomai apima ne tik seksualinius aspektus, tokius kaip dažnos, sunkiai kontroliuojamos seksualinės mintys, bet ir emocinius bei funkcinius sunkumus. Dažnai pasireiškia irzlumas, nuotaikų kaitos ar miego sutrikimai, kurie savo pobūdžiu atitinka abstinencijos simptomus, būdingus kitoms elgesio priklausomybėms, tokioms kaip lošimas ar probleminis interneto naudojimas [11].

PPV dažnai siejamas su įvairiais psichikos sveikatos sutrikimais. Tyrimai rodo, jog asmenys, problemiškai vartojantys pornografinį turinį, dažniau pasižymi aukštesniu depresijos ir nerimo lygiu bei mažesne saviverte, o pats pornografijos vartojimas tampa neefektyvia priemone reguliuoti emocijas [12, 13]. Tokia elgesio strategija dažnai pasireiškia užburto rato principu, kai trumpalaikis palengvėjimas po pornografijos vartojimo pereina į kaltės, gėdos ir nusivylimo savimi jausmą, kuris dar labiau stiprina psichologinį distresą. Didėjanti emocinė įtampa skatina dažnesnį pornografijos vartojimą kaip greitą pabėgimą nuo neigiamų emocijų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai siejama su stiprėjančiais nerimo ir depresijos simptomais [14].

Taip pat literatūroje vis daugiau dėmesio skiriama ir galimam ryšiui tarp intensyvaus pornografijos vartojimo ir seksualinės funkcijos sutrikimų. Nors įprastai erekcijos sutrikimai dažniau siejami su somatinėmis priežastimis, naujausi tyrimai rodo, kad itin dažnas pornografinio turinio vartojimas gali būti susijęs su sumažėjusiu susijaudinimu realaus seksualinio kontakto metu bei sunkumais pasiekti ar išlaikyti erekciją [10, 15]. Tyrimai rodo, jog daliai gerą fizinę sveikatą turinčių jaunų vyrų seksualinės funkcijos sutrikimai pasireiškia dėl pornografijos vartojimo įpročių, o ne dėl organinių priežasčių. Manoma, jog prie šių pokyčių gali prisidėti desensitizacija seksualiniams dirgikliams bei poreikis vartoti vis intensyvesnį ar specifinį seksualinį turinį [10, 15, 16].

Atsižvelgiant į tai, kad jauni vyrai dažniau vartoja pornografinį turinį, būtent ši populiacija gali būti labiausiai pažeidžiama. Nors tarptautinių tyrimų apie PPV daugėja, Lietuvoje jaunų vyrų pornografijos vartojimo ir psichoemocinės bei seksualinės sveikatos sąsajos nėra pakankamai ištirtos.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti probleminio pornografijos vartojimo paplitimą tarp jaunų vyrų Lietuvoje ir išanalizuoti PPV sąsajas su psichoemocine sveikata bei seksualine funkcija.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Atliekant tyrimą vykdyta kiekybinė anoniminė apklausa, sukurta *Google Forms* platformoje. Norint pasiekti didesnį respondentų skaičių, apklausos nuoroda platinta viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose 2025 m. kovo–balandžio mėnesiais. Tyrimo tikslinė grupė buvo 18–40 metų vyrai.

Apklausą sudarė šešios dalys, apimančios demografinius, psichosocialinius ir medicininius klausimus. Į anketą buvo įtraukti ir standartizuoti klausimynai: trumpa probleminio pornografijos vartojimo skalė (angl. *The Short Version of the Problematic Pornography Consumption Scale*, PPCS-6), Arizonos seksualinės patirties skalė (angl. *Arizona Sexual Experience Scale*, ASEX), paciento sveikatos klausimynas-9 (PHQ-9) bei generalizuoto nerimo sutrikimo skalė-7 (GAD-7). Standartizuotų klausimynų atsakymai buvo pateikiami naudojant Likerto skalę. Surinktų duomenų statistinė analizė atlikta naudojant *Microsoft Excel* ir *SPSS version 30.0.0.0* (angl. *Statistical Package for Social Science*) programas. Atliekant statistinių hipotezių analizę pasirinktas reikšmingumo lygmuo buvo 0,05.

Statistinei analizei naudota aprašomoji statistika (vidurkiai, nuokrypiai, procentai), Spirmeno (*Spearman*) koreliacijos koeficientas (ryšiui tarp kiekybinių kintamųjų nustatyti), nepriklausomų imčių t-testas (lyginant kieky-

binius rodiklius tarp grupių), *chi* kvadrato nepriklausomumo testas (kategorinių kintamųjų tarpusavio ryšiui įvertinti).

Mokslinių literatūros šaltinių paieška vykdyta *Pubmed* duomenų bazėje ir specializuotoje paieškos sistemoje *Google Scholar*. Apžvalgai naudoti straipsniai, publikuoti anglų kalba. Mokslinių straipsnių paieška vykdyta 2025 m. gegužės–spalio mėnesiais.

REZULTATAI

Tyrime dalyvavo 488 vyrai. Tiriamųjų sociodemografinės ir klinikinės charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Tiriamųjų charakteristikos (n = 488)

Kintamasis	Proc.
18–24 m.	40,0
25–31 m.	40,2
32–40 m.	19,9
Heteroseksualūs	89,8
Homoseksualūs	4,3
Kiti*	5,9
Turi partnerį (-ę)	51,0
Neturi partnerio (-ės)	49,0
Psichikos sutrikimai	10,9
Narkotikų vartojimas (6 mėn.)	23,8

* – biseksualūs, aseksualūs ir neatsakę į klausimą asmenys.

Be to, tyrime respondentų buvo klausiama ir apie kitas, subjektyviai suvokiamas priklausomybes. 21,3 proc. respondentų nurodė manantys, kad turi bent vieną priklausomybę, dažniausiai susijusią su alkoholio vartojimu, lošimais ar per dažnu naudojimusi socialiniais tinklais.

2 lentelė. Psichoemocinių rodiklių palyginimas pagal PPV riziką.

Rodiklis	PPV rizika (PPCS-6 > 20) (vid. ± SD)	Maža rizika (vid. ± SD)	p
PHQ-9	12,03 ± 6,60	7,21 ± 5,41	<0,001
GAD-7	7,81 ± 5,32	5,27 ± 4,67	<0,001

Remiantis PPCS-6 skale, vidutinis dalyvių surinktas balų skaičius buvo 15,47 ± 7,53, o 23,4 proc. respondentų nustatyta probleminio pornografijos vartojimo rizika (PPCS-6 > 20). Pagal PHQ-9 skalę, vidutiniai ar sunkesni depresijos simptomai (PHQ-9 ≥ 10) nustatyti 34 proc. respondentų. Pagal GAD-7 skalę, vidutiniai ar sunkesni nerimo simptomai (GAD-7 ≥ 10) nustatyti 21,1 proc. respondentų. Nustatyta, kad vyrai, turintys padidėjusią PPV riziką, pasižymėjo statistiškai reikšmingai aukštesniais depresijos ir nerimo simptomų įverčiais, palyginti su mažesnės rizikos grupe (2 lentelė).

Remiantis ASEX skale, vidutinis surinktas balų skaičius buvo 11,47 ± 4,02, o seksualinės disfunkcijos požymiai nustatyti 16,0 proc. respondentų. Vertinant pagal atskirus kriterijus, 5,9 proc. vyrų pagal ASEX surinko ≥19 bendrą balą; 14,1 proc. respondentų iš vieno klausimo surinko 5 ar daugiau balų, o 8,8 proc. tiriamųjų surinko po 4 ar daugiau balų bent iš trijų klausimų. Kai kurie respondentai atitiko 2 ar daugiau kriterijų.

Atlikus Spirmeno koreliacinę analizę nustatyta, kad PPV balai teigiamai koreliavo su depresijos ir nerimo simptomais bei silpniau koreliavo su seksualinės funkcijos rodikliais (3 lentelė).

3 lentelė. PPV sąsajos su psichoemocine būkle ir seksualine funkcija

Kintamieji	r	p
PPCS-6 & PHQ-9	0,36	<0,001
PPCS-6 & GAD-7	0,25	<0,001
PPCS-6 & ASEX	0,11	0,013

Chi kvadrato testas parodė, jog PPV rizika statistiškai reikšmingai skyrėsi tarp skirtingų amžiaus grupių ($\chi^2(2) = 11,54$; $p = 0,003$). Didesnis PPV dažnis nustatytas 25–31 metų amžiaus grupėje (33,2 proc.), lyginant su 18–24 metų amžiaus grupe (21,0 proc.) ir 32–40 metų amžiaus grupe (17,5 proc.). Statistiškai reikšmingų probleminio pornografijos vartojimo rizikos skirtumų pagal seksualinę orientaciją nenustatyta ($\chi^2(3) = 1,97$; $p = 0,583$). Taip pat nustatyta, kad vyrai, neturintys partnerės ar partnerio, pasižymėjo didesne probleminio pornografijos vartojimo rizika (29,7 proc.), lyginant su tais, kurie turėjo partnerę ar partnerį (20,9 proc.) ($\chi^2(1) = 4,60$; $p = 0,032$).

4 lentelė. Rodiklių palyginimas pagal partnerystės statusą

Rodiklis	t	p
PPCS-6	3,18	0,002
PHQ-9	5,05	<0,001
GAD-7	2,32	0,021
ASEX	4,15	<0,001

Nustatyta, kad vyrai, neturintys partnerio (-ės), pasižymėjo statistiškai reikšmingai aukštesniais PPV, depresijos, nerimo ir seksualinės funkcijos įverčiais (4 lentelė).

REZULTATŲ APTARIMAS

Atlikto tyrimo duomenys leidžia įvertinti probleminio pornografijos vartojimo paplitimą ir jo sąsajas su psichikos sveikata bei seksualine funkcija tarp jaunų vyrų Lietuvoje. Diskusijoje aptariami šio tyrimo rezultatai, vertinant juos platesniame probleminio pornografijos vartojimo mokslinių tyrimų kontekste. Gauti rezultatai suteikia galimybę geriau suprasti, kokie veiksniai gali sietis su didesne PPV rizika bei kokios sritys gali būti paveiktos labiausiai.

Atlikus tyrimą gauti rezultatai rodo, kad 18–40 metų vyrų imtyje 23,4 proc. respondentų yra priskirtini PPV rizikos grupei. Tai yra aukštesnis rodiklis, nei dažniausiai aprašoma tarptautinėje literatūroje. 2023 m. paskelbtame tarptautiniame skerspjūvio tyrime, tiriančiame duomenis iš 42 šalių, nurodoma, jog PPV rizikos grupę sudaro 3,2–16,6 proc. tirtų populiacijų [17]. Šiame tyrime Lietuvos imčiai (n = 2 015) pagal PPCS-6 klausimyną nustatytas 6,19 proc. PPV rizikos grupės paplitimas, t. y. beveik keturis kartus mažesnis nei mūsų atliktame tyrime. Svarbu pažymėti, kad tarptautiniame tyrime dalyvavo įvairaus amžiaus ir lyčių respondentai, o vyrai sudarė tik 39,6 proc. imties. Tai leidžia manyti, kad mūsų tyrime nustatytas didesnis PPV paplitimas gali būti siejamas su tiriama specifine jaunų vyrų populiacija, kuri literatūroje identifikuojama kaip didesnės rizikos grupė [18]. Tokią prielaidą patvirtina kitose šalyse su jaunais vyrais atlikti tyrimai, kuriuose PPV paplitimas siekė 17,4 proc. [19], 12,5 proc. [20]. Atsižvelgiant į tarptautinius duomenis galima teigti, kad šio tyrimo rezultatuose atsispindintis PPV paplitimas Lietuvos jaunų vyrų populiacijoje yra santykinai aukštesnis. Šį skirtumą galėtų paaiškinti tiek ribota imtis bei jos struktūra, tiek literatūroje išskiriami rizikos veiksniai: didesnis interneto naudojimas, polinkis į impulsyvumą, aukštesnis psichologinio distreso lygis [21].

Tyrimo duomenys atskleidė reikšmingą PPV ryšį su depresijos ir nerimo simptomais. Vidutiniai ar sunkūs depresijos simptomai (pagal PHQ-9) buvo nustatyti 34 proc. visų respondentų, o šis rodiklis buvo žymiai aukštesnis tarp vyrų, priklausančių PPV rizikos grupei. Nerimo simptomai (pagal GAD-7) buvo nustatyti 21 proc. visų respondentų. Šie įverčiai taip pat buvo reikšmingai didesni tarp PPV rizikos grupėje esančių respondentų. Šie rezultatai sutampa su ankstesniais moksliniais tyrimais, kurie patvirtina glaudų PPV ryšį su emociniais sunkumais, nerimu ir depresija [6]. Naujausi JAV atlikti tyrimai, tyrę jaunų suaugusiųjų psichoemocinę būklę, parodė, jog depresijos, nerimo ir streso lygiai yra reikšmingai aukštesni tarp asmenų, kurie vartojo erotinį turinį internete per pastaruosius metus, palyginti su tais, kurie jo nevartojo. Be to, tyrimas parodė, kad pirmasis susidūrimas su pornografija ankstyvame amžiuje buvo taip pat susijęs su didesniu psichoemociniu pažeidžiamumu [22]. Panašias tendencijas patvirtina ir kiti skerspjūvio tyrimai, kurie rodo, kad kuo polinkis į PPV yra didesnis, tuo didesnį afektinių simptomų ir emocinės įtampos krūvį žmogus patiria [23, 24]. Mūsų tyrimo duomenys taip pat atitinka sisteminių apžvalgų išvadas [6, 25]. Apžvalgos pabrėžia, jog PPV ir psichopatologinių simptomų sąsajos priklauso ir nuo papildomų asmenybės ir aplinkybių veiksnių. Iš kitos pusės svarbu atsižvelgti ir į priežastinio ryšio kryptį bei būtina pažymėti, kad ne visada aišku, ar psichoemociniai sunkumai lemia PPV, ar PPV prisideda prie jų išsivystymo. Pavyzdžiui, karo veteranų ir ne veteranų vyrų grupes lyginusiame tyrime, siekusiame išsiaiškinti PPV ir psichologinio distreso ryšį, pornografijos vartojimo dažnis tarp grupių nesiskyrė, tačiau veteranams buvo būdingi aukštesni PPV rodikliai ir didesnis psichologinis distresas [26]. Šie duomenys rodo, kad PPV gali pasireikšti nepriklausomai nuo pornografijos vartojimo dažnio, bei parodo, kokią stiprią įtaką probleminiam pornografijos vartojimui daro emocinis pažeidžiamumas ir kontrolės praradimas. Dažnas pornografijos vartojimas gali tapti kompensaciniu mechanizmu siekiant sumažinti neigiamas emocijas, todėl kai kuriuose tyrimuose sakoma, kad šis galimas mechanizmas suformuoja ydingą ratą, kai pornografijos žiūrėjimas trumpam slopina įtampą, tačiau vėliau sustiprina kaltės jausmą ir depresijos simptomus, skatindamas tolesnį pornografijos vartojimą. Prospektinis tyrimas su jaunais suaugusiaisiais vertino atvirkštinę šio ryšio kryptį ir parodė, jog afektiniai simptomai reikšmingai prognozavo didesnį pornografijos vartojimo dažnį laikui bėgant [15]. Tyrėjai pažymėjo, kad psichologiškai labiau pažeidžiamos grupės, pavyzdžiui, asmenys, sergantys depresija, yra jautresnės pornografijos poveikiui ir yra labiau linkusios ją vartoti bei patirti su vartojimu susijusią žalą. Šie rezultatai sustiprina dvipu-

sio ryšio interpretaciją, kad ir pornografijos vartojimas, ir psichoemocinis distresas gali veikti abipusiškai, būti tiek rizikos veiksniu, tiek pasekme. Tiriant jaunų vyrų psichologinę būseną svarbu suvokti, kad jai įtakos gali turėti daug veiksnių. Tačiau atsižvelgiant į augantį depresijos ir nerimo simptomų paplitimą tarp jaunų vyrų reikalingi papildomi tyrimai, ar dėl interneto sklaidos pakitę kasdienybės įpročiai, pavyzdžiui, mūsų nagrinėtas kompulsyvus pornografijos vartojimas, gali prisidėti prie prastėjančios psichikos sveikatos.

Mūsų atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad seksualinės funkcijos sutrikimai yra reikšmingai paplitę tarp jaunų vyrų. Remiantis gautais rezultatais, 16,0 proc. respondentų pasireiškė seksualinės disfunkcijos požymiai (pagal ASEX) ir nustatyta silpna, tačiau statistiškai reikšminga koreliacija tarp PPV ir blogesnės seksualinės funkcijos ($r = 0,11$; $p = 0,013$), o papildoma *chi* kvadrato analizė parodė, kad seksualinės disfunkcijos paplitimas PPV rizikos grupėje buvo didesnis, nors statistinio reikšmingumo nepasiekė. Ši tendencija atitinka dalies tarptautinių tyrimų rezultatus. Empiriniai tyrimai rodo galimą ryšio kryptį. Atlikus klinikinių atvejų analizę nustatyta, kad intensyvus pornografijos vartojimas gali būti susijęs su erekcijos disfunkcija (ED), sumažėjusiu seksualiniu susijaudinimu ir pasitenkinimu, o kitas tyrimas parodė, kad dažnas pornografijos vartojimas dar gali būti siejamas su sumažėjusiu libido ir sunkumais pasiekti orgazmą, net kontroliuojant demografinius bei psichologinio distreso veiksnius [15, 16]. Tačiau pastaroji analizė rodo, kad negalima atmesti abipusio ryšio galimybės, ir skatina kelti klausimą, ar pornografijos vartojimas turi įtakos sumažėjusiam seksualiniui pasitenkinimui, ar seksualinės problemos yra dažnesnio erotinio turinio žiūrėjimo pasekmė. Taip pat nurodoma, kad pornografijos vartojimas gali sietis su suprastėjusia santykių kokybe, o tai netiesiogiai gali komplikuoti seksualinės funkcijos rodiklius [19]. Literatūroje siūlomi keli galimi mechanizmai, kuriais PPV gali veikti seksualinę funkciją, įskaitant desensitizaciją, padidėjusį susijaudinimo slenkstį ir psichologinius veiksnius, tokius kaip kaltė, nerimas, suprastėjęs emocinis ryšys tarp partnerių. Kita vertus, kai kurie tyrimai pateikia kitokias išvadas. Pavyzdžiui, vienas atliktas tyrimas [27] teigia, kad pornografijos žiūrėjimas nėra tiesioginis seksualinės disfunkcijos prognostinis rodiklis, o Kroatijoje atliktame tyrime sąsajos tarp ED ir pornografijos vartojimo (nei dažnio, nei vartojimo įpročių) nebuvo aptikta [28]. Tokiose publikacijose teigiama, kad PPV ir seksualinės disfunkcijos ryšio įrodymai yra per menki ir nepakankami. Vis dėlto naujausi tyrimai pabrėžia, kad suprastėjusi seksualinė funkcija yra susijusi su kompulsyviais vartojimo modeliais, o ne pačiu pornografijos žiūrėjimu ar jo dažnumu [17, 28].

Nepaisant prieštaringų rezultatų ir nuomonių, problema yra ypač aktuali. Tarptautiniai duomenys rodo, kad jaunų vyrų seksualinės funkcijos sutrikimai nėra reta problema, o jų paplitimas didėja. Prieš daugiau nei 20 metų (prieš plačią interneto sklaidą) atlikti tyrimai rodė palyginti žemus erekcijos sutrikimų rodiklius. Juose aprašoma, kad ED paplitimas tarp jaunesnių nei 40 metų vyrų buvo 8–11 proc. [29], o daugelyje Europos šalių atlikti tyrimai nurodė dar mažesnius skaičius – 1–10 proc. [30, 31]. Naujausi tyrimai fiksuoja kur kas didesnius rodiklius, pagal kuriuos priešlaikinė ejakuliacija ar erekcijos sutrikimai pasireiškia net trečdaliui jaunų vyrų [32]. Mūsų atliktame tyrime sutrikimai (pagal ASEX) fiksuoti beveik šeštadaliui respondentų. ASEX skale yra vertinami tik bendri, o ne atskiri disfunkcijos požymiai, tačiau jie leidžia vertinti problematiškumą ir tendencijas. Atlikus tyrimą gautas rodiklis atitinka tendenciją ir sutampa su dalimi kitose šalyse atliktų panašių tyrimų. Atsižvelgiant į tai, kad dalis jaunų vyrų dėl gėdos ar stigmos neatskleidžia patiriamų seksualinių sunkumų, tikrasis paplitimas gali būti dar didesnis. Klinikinėje praktikoje svarbu vertinti seksualinės funkcijos sutrikimus kartu su gyvenimo būdo, santykių ir emociniais veiksniais. Tai gali padėti identifikuoti rizikos grupes, priežastis ir laiku atpažinti psichologinius sunkumus.

Tyrimo metu nebuvo nustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų vertinant PPV riziką pagal seksualinę orientaciją. Tai atitinka naujausių tarptautinių tyrimų išvadas, kuriose taip pat nenurodoma PPV paplitimo skirtumų tarp heteroseksualių, homoseksualių ar biseksualių asmenų, teigiant, kad rizika yra labiau susijusi su kitais asmeniniais veiksniais [33].Tačiau mūsų tyrimo metu buvo rasta statistiškai reikšminga sąsaja tarp PPV rizikos ir partnerystės statuso. Jauni vyrai, neturintys partnerės (-io), pasižymėjo didesne PPV rizika ($p = 0,002$). Ši tendencija atsispindi ir mokslinėje literatūroje: kai kurių tyrimų išvadose teigiama, kad vieniši vyrai yra linkę dažniau vartoti pornografiją, bandydami kompensuoti intymumo trūkumą ar mėgindami reguliuoti savo emocijas. Kai kurie autoriai teigia, jog vienišumas yra siejamas su didesniu psicho-

loginiu distresu, kuris dažniau skatina kompensacinį ir kompulsyvų elgesį [34]. Tyrimai rodo, kad stabilūs ir emociškai artimi santykiai siejami su mažesniu pornografijos vartojimu ir geresne psichologine būkle [35]. Vertinant šiuos rezultatus svarbu atsižvelgti į tai, kad vieniši vyrai surinko daugiau balų ir pagal depresijos bei nerimo skales bei pasižymėjo prastesniais seksualinės funkcijos rodikliais. Todėl apskritai šie duomenys leidžia manyti, kad santykių neturėjimas gali atspindėti didesnį vienišumą ir emocinių poreikių nepatenkinimą, kurie savo ruožtu gali būti susiję su aukštesne PPV rizika.

Mūsų atliktas tyrimas turi tam tikrų trūkumų, į kuriuos svarbu atsižvelgti interpretuojant gautus rezultatus. Pirma, kaip ir minėjome, negalima nustatyti priežastinio ryšio tarp PPV, psichologinių sunkumų ir seksualinės funkcijos sutrikimų. Apklausa buvo internetinė, klausimynai buvo pildomi savarankiškai, todėl atsakymai galėjo būti paveikti. Imtis buvo sudaryta iš jaunų, internetu aktyviai besinaudojančių vyrų, todėl rezultatai gali neatspindėti visos Lietuvos vyrų populiacijos. Seksualinės funkcijos vertinimas pagal ASEX skalę neleidžia išskirti specifinių seksualinės disfunkcijos rūšių, todėl tam tikri klinikiniai aspektai lieka iki galo neatskleisti. Tyrime nagrinėjama tema yra jautri, todėl respondentai galėjo būti linkę rinktis labiau socialiai priimtinus atsakymus, net ir užtikrinus anonimiškumą. Galiausiai, tyrime nebuvo įvertinti tam tikri veiksniai, kurie potencialiai gali daryti įtaką PPV mechanizmams, tokie kaip pornografijos vartojimo turinio pobūdis ir trukmė, impulsyvumas.

Šio tyrimo stiprybė yra tai, kad tai vienas pirmųjų empirinių darbų Lietuvoje, sistemingai tyrusių PPV paplitimą tarp jaunų vyrų ir jo sąsajas su psichikos sveikata bei seksualine funkcija. Tyrime naudotos validuotos skalės (PPCS-6, PHQ-9, GAD-7, ASEX) leidžia patikimai lyginti rezultatus su kitų šalių studijomis. Be to, tyrimo imtis buvo pakankamai didelė ir didesnė už kai kurių užsienio tyrimų, todėl suteikė galimybę detaliai analizuoti įvairius aspektus. Apklausa buvo internetinė ir visiškai anonimi-

nė, o tai ypač svarbu tiriant jautrias temas.

Ateityje atliekamuose tyrimuose rekomenduojama taikyti longitudinį tyrimą. Tai leistų vertinti priežastinį ryšį tarp probleminio pornografijos vartojimo, psichikos sveikatos ir seksualinės funkcijos pokyčių. Rekomenduojama tirti daugiau veiksnių, kurie galėtų padėti geriau suprasti pornografijos vartojimo rizikos mechanizmus. Būtų verta atlikti kokybinius tyrimus ar atvejų analizes, siekiant geriau suprasti pornografijos vartojimo kontekstą bei priežastis ir asmeninius poreikius. Atsižvelgiant į didėjantį seksualinių sutrikimų paplitimą jaunų vyrų populiacijoje, siūloma tyrimuose tirti specifinius seksualinės disfunkcijos tipus, vertinti konkrečias problemas arba rinktis kitą klausimyną, leidžiantį atskirai įvertinti sutrikimus ir jų ryšį su PPV. Taip pat būtų itin vertinga atlikti panašius tyrimus su jaunomis moterimis bei palyginti rezultatus tarpusavyje.

APIBENDRINIMAS

Šis tyrimas pateikia pirmuosius sistemingus duomenis apie PPV paplitimą ir jo sąsajas su psichikos sveikata bei seksualine funkcija jaunų vyrų populiacijoje Lietuvoje. Rezultatai parodė, kad reikšminga respondentų dalis patenka į PPV rizikos grupę. Probleminis pornografijos vartojimas buvo susijęs su didesniu depresijos ir nerimo simptomų pasireiškimu bei prastesniais seksualinės funkcijos rodikliais, o šios sąsajos atitinka užsienio literatūroje aprašytas tendencijas. Gauti rezultatai pabrėžia būtinybę vertinti PPV kaip įvairialypį reiškinį, susijusį su psichologine ir seksualine jaunų vyrų sveikata bei galintį turėti reikšmingų pasekmių visuomenės sveikatai ir klinikinei praktikai. Vis dėlto rezultatai turėtų būti interpretuojami atsargiai, atsižvelgiant į tai, kad tyrimas buvo atliktas naudojant patogiąją imtį (internetinę apklausą), kuri gali neatspindėti visos Lietuvos vyrų populiacijos.

Straipsnis gautas 2026-03-09, priimtas 2026-04-30

Literatūra

1. DataReportal. Digital 2025: Global overview report. 2025. Prieiga per internetą: https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report.
2. Buchholz K. How much of the internet consists of porn?. Statista; 2019. Prieiga per internetą: https://www.statista.com/chart/16959/share-of-the-internet-that-is-porn.
3. Solano I, Eaton NR, O'Leary KD. Pornography consumption, modality and function in a large internet sample. J Sex Res. 2020;57(1):92–103. DOI: 10.1080/00224499.2018.1532488.
4. Ballester-Arnal R, García-Barba M, Castro-Calvo J, Giménez-García C, Gil-Llario MD. Pornography consumption in people of different age groups: an analysis based on gender, contents, and consequences. Sex Res Soc Policy. 2023;20(2):766–779. DOI: 10.1007/s13178-022-00720-z.
5. Ince C, Albertella L, Liu C, Tiego J, Fontenelle LF, Chamberlain SR, et al. Problematic pornography use and novel patterns of escalating use: a cross-sectional network analysis with two independent samples. Addict Behav. 2024;156:108048. DOI: 10.1016/j.addbeh.2024.108048.
6. Vieira C, Griffiths MD. Problematic pornography use and mental health: a systematic review. Sex Addict Compulsivity. 2024;31(3):207–247. DOI: 10.1080/26929953.2024.2348624.
7. Kraus SW, Krueger RB, Briken P, First MB, Stein DJ, Kaplan MS, ir kt. Compulsive sexual behaviour disorder in the ICD-11. World Psychiatry. 2018;17(1):109–110. DOI: 10.1002/wps.20499.
8. Love T, Laier C, Brand M, Hatch L, Hajela R. Neuroscience of internet pornography addiction: a review and update. Behav Sci (Basel). 2015;5(3):388–433. DOI: 10.3390/bs5030388.
9. Gola M, Wordecha M, Marchewka A, Sescousse G. Can pornography be addictive? An fMRI study of men seeking treatment for problematic pornography use. Neuropsychopharmacology. 2017;42(10):2021–2031. DOI: 10.1038/npp.2017.78.
10. Voon V, Mole TB, Banca P, Porter L, Morris L, Mitchell S, ir kt. Neural correlates of sexual cue reactivity in individuals with and without compulsive sexual behaviours. PLoS One. 2014;9(7):e102419. DOI: 10.1371/journal.pone.0102419.
11. Lewczuk K, Wizła M, Glica A, Potenza MN, Lew-Starowicz M, Kraus SW. Withdrawal and tolerance as related to compulsive sexual behavior disorder and problematic pornography use: preregistered study based on a nationally representative sample in Poland. J Behav Addict. 2022;11(4):979–993. DOI: 10.1556/2006.2022.00079.
12. Grubbs JB, Exline JJ, Pargament KI, Hook JN, Carlisle RD. Transgression as addiction: religiosity and moral disapproval as predictors of perceived addiction to pornography. Arch Sex Behav. 2015;44(1):125–136. DOI: 10.1007/s10508-013-0257-z.
13. Fineberg NA, et al. Revisiting the role of impulsivity and compulsivity in problematic sexual behaviors. J Sex Res. 2018;55(9):1188–1200. DOI: 10.1080/00224499.2018.1480744.
14. Brand M, et al. The role of difficulties in emotion regulation and thought control strategies on pornography use. J Behav Addict. 2018. DOI: 10.29252/nirp.jpcp.6.2.119.
15. Park BY, Wilson G, Berger J, Christman M, Reina B, Bishop F, et al. Is internet pornography causing sexual dysfunctions? A review with clinical reports. Behav Sci (Basel). 2016;6(3):17. DOI: 10.3390/bs6030017.
16. Dwulit AD, Rzymski P. The potential associations of pornography use with sexual dysfunctions: an integrative literature review of observational studies. J Clin Med. 2019;8(7):914. DOI: 10.3390/jcm8070914.
17. Bőthe B, Nagy L, Koós M, Demetrovics Z, Potenza MN, et al. Problematic pornography use across countries, genders, and sexual orientations. Addiction. 2024;119(5):928–950. DOI: 10.1111/add.16431.
18. Kowalewska E, Szumska I, Lew-Starowicz M. Expanding the lens: a systematic review of the latest research on compulsive sexual behavior and problematic pornography use among women. Curr Addict Rep. 2025;12(1):62–75. DOI: 10.1007/s40429-025-00502-7.
19. Pouralijan Z, Bőthe B, Farnam F. Pornography use, demographic and sexual health characteristics among university students. Reprod Health. 2024;21(1):103. DOI: 10.1186/s12978-024-01840-5.
20. Kumar P, Patel VK, Bhatt RB, Vasavada DA, Sangma RD, Tiwari DS. Prevalence of problematic pornography use and attitude toward pornography among undergraduate medical students. SAGE Open Med. 2021. DOI 10.1177/2631831821989677.
21. Mennig M, Tennie S, Barke A. Self-perceived problematic use of online pornography is linked to clinically relevant levels of psychological distress and psychopathological symptoms. Arch Sex Behav. 2022;51(2):1313–1321. DOI: 10.1007/s10508-021-02101-w.
22. Camilleri C, Perry JT, Sammut S. Compulsive internet pornography use and mental health: a cross-sectional study in a sample of university students in the United States. Front Psychol. 2021;11:613244. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.613244.
23. Okabe Y, Takahashi F, Ito D. Problematic pornography use in Japan: a preliminary study among university students. Front Psychol. 2021;12:638354. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.638354.
24. Musetti A, Gori A, Topino E, Terrone G, Plazzi G, et al. The interplay between problematic online pornography use, psychological stress, emotion dysregulation and insomnia symptoms during the COVID-19 pandemic: a mediation analysis. Nat Sci Sleep. 2022;14:83–92. DOI: 10.2147/NSS.S348242.
25. Karila L, Wéry A, Weinstein A, Cottencin O, Petit A, Reynaud M, et al. Addictive use of online sexual activities and its comorbidities: a systematic review. Curr Pharm Des. 2014;20(25):4012–4020. DOI: 10.2174/13816128113199990619.
26. Borgogna NC, Griffin K, Grubbs JB, Kraus SW. Understanding differences in problematic pornography use: considerations for gender and sexual orientation. J Sex Med. 2022;19. DOI: 10.1016/j.jsxm.2022.05.144.
27. Prause N, Pfaus J. Viewing sexual stimuli associated with greater sexual responsiveness, not erectile dysfunction. Sex Med. 2015;3(2):90–98. DOI: 10.1002/sm2.58.
28. Landripet I, Štulhofer A. Is pornography use associated with sexual difficulties and dysfunctions among younger heterosexual men? J Sex Med. 2015;12(5):1136–1139. DOI: 10.1111/jsm.12853.
29. Rosen RC, Fisher WA, Eardley I, Niederberger C, Nadel A, Sand M. The multinational Men's Attitudes to Life Events and Sexuality (MALES) study: I. Prevalence of erectile dysfunction and related health concerns in the general population. Curr Med Res Opin. 2004;20(5):607–617. DOI: 10.1185/030079904125003467.
30. Braun M, Wassmer G, Klotz T, Reifenrath B, Mathers M, Engelmann U. Epidemiology of erectile dysfunction: results of the

Cologne Male Survey. Int J Impot Res. 2000;12(6):305–311. DOI: 10.1038/sj.ijir.3900622.
31. Rastrelli G, Maggi M. Erectile dysfunction in fit and healthy young men: psychological or pathological? Transl Androl Urol. 2017;6(1):79–90. DOI: 10.21037/tau.2016.09.04.
32. Mialon A, Berchtold A, Michaud PA, Gmel G, Suris JC. Sexual dysfunctions among young men: prevalence and associated factors. J Adolesc Health. 2012;51(1):25–31. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2012.01.008.
33. Bőthe B, Tóth-Király I, Griffiths MD, Potenza MN, Orosz G, Demetrovics Z. Are sexual functioning problems associated with frequent pornography use and/or problematic pornography use? Results from a large community survey including males and females. Addict Behav. 2021;112:106603. DOI: 10.1016/j.addbeh.2020.106603.
34. Cardoso J, Ramos C, Brito J, Almeida TC. Difficulties in emotion regulation and problematic pornography use: the mediating role of loneliness. Int J Sex Health. 2023;35(3):481–493. DOI: 10.1080/19317611.2023.2224807.
35. Poulsen FO, Busby DM, Galovan AM. Pornography use: who uses it and how it is associated with couple outcomes. J Sex Res. 2013;50(1):72–83. DOI: 10.1080/00224499.2011.648027.

PSYCHOEMOTIONAL DIFFICULTIES AND SEXUAL DYSFUNCTION: THE IMPACT OF PROBLEMATIC PORNOGRAPHY USE ON YOUNG MEN

Vesta Burbaitė[1], Milda Černytė[1], Robertas Strumila[2], Alvydas Navickas[2]
[1]Vilnius University, Faculty of Medicine, [2]Vilnius University, Faculty of Medicine, Clinic of Psychiatry

SUMMARY

The Aim. To assess the prevalence of problematic pornography use (PPU) among men aged 18-40 years in Lithuania and to examine its associations with psychoemotional health and sexual functioning.

Methods. An anonymous quantitative cross-sectional study was conducted in March-April 2025 using an online survey. The sample consisted of 488 men. Validated questionnaires were used: the Problematic Pornography Consumption Scale (PPCS-6), the Patient Health Questionnaire (PHQ-9), the Generalized Anxiety Disorder scale (GAD-7) and the Arizona Sexual Experience Scale (ASEX). Data was analyzed using descriptive statistics, Spearman correlation coefficients, independent samples t-test and Chi-square test. Statistical significance was set at $p < 0.05$.


Results. PPU risk was identified in 23,4% of respondents. Moderate to severe depressive symptoms (PHQ-9 ≥ 10) were found in 34% of participants, while moderate to severe anxiety symptoms (GAD-7 ≥10) were found in 21,1%. Men at risk of PPU showed statistically significantly higher levels of depressive and anxiety symptoms ($p < 0.001$). A weak but statistically significant positive correlation was found between PPU and impaired sexual functioning ($r = 0.11$; $p = 0.013$). Signs of sexual dysfunction were identified in 16.0% of respondents. Higher PPU prevalence was observed among men aged 25-31 years and among those without a romantic partner ($p < 0.05$).

Conclusions. Problematic pornography use appears to be relatively prevalent among young men in Lithuania and is significantly associated with depressive and anxiety symptoms as well as poorer sexual functioning indicators. The findings suggest that PPU may be linked to multiple aspects of psychoemotional and sexual health and highlight the need for further research.

Keywords. Problematic pornography use, depression, anxiety, sexual dysfunction.

Received 9 March 2026, accepted 30 April 2026

Correspondence to Milda Černytė
Faculty of Medicine of Vilnius University
M. K. Čiurlionio str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: cernytemilda@gmail.com



Asociatyvinė *unsplash.com* nuotr.

ŠEIMOS GYDYTOJŲ PATIRTYS IR PASIRENGIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI LIETUVOJE

Tyrimai Lietuvoje ir užsienyje rodo, kad gana daug pacientų per paskutinius metus ar net mėnesius iki savižudybės lankosi pas šeimos gydytojus, todėl medikų gebėjimas atpažinti savižudybės riziką ir paskatinti asmenį kreiptis ar nukreipti tolesnės pagalbos gali žymiai prisidėti prie savižudybių prevencijos. Atsižvelgiant į tai, svarbu stiprinti sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių specialistų žinias ir įgūdžius atpažinti asmenis, patiriančius savižudybės grėsmę, kad būtų galima spėti laiku suteikti reikiamą pagalbą.

Higienos instituto specialistai 2025 m. vykdė kiekybinę apklausą ir, remdamiesi jos duomenimis, atliko analizę „Šeimos gydytojų patirtys ir pasirengimas savižudybių prevencijai Lietuvoje“, kurios pagrindinis tikslas buvo atskleisti šeimos gydytojų patirtis ir pasirengimą savižudybių prevencijai, analizuojant jų darbines praktikas. Apklausą užpildė 163 šeimos gydytojai, dauguma (90 proc.) jų – moterys, dirbančios didmiesčių asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) (62 proc.) ir dažniausiai valstybės ar savivaldybių įstaigose (82 proc.). Respondentų darbo stažas įvairus, tačiau didžiausia dalis (36 proc.) turėjo 25 ir daugiau metų darbo patirtį.

Atlikta analizė parodė, kad tarp šeimos gydytojų yra jaučiama pasirengimo dirbti su savižudybės grėsmę patiriančiais pacientais stoka. Taip pat analizė atskleidė, kad visiems šeimos gydytojams bei jų komandos nariams trūksta sistemingo, nuoseklaus ir standartizuoto mokymo savižudybių prevencijos tema. Specializuotuose savižudybių prevencijos mokymuose buvo dalyvavę tik trečdalis apklausoje dalyvavusių šeimos gydytojų, o jų išklausytų mokymų skaičius ir pobūdis skyrėsi. Svarbu stiprinti šeimos gydytojų kompetencijas atpažinti pacientus, patiriančius savižudybės grėsmę, nes tik dešimtadalis šeimos gydytojų įvardijo, jog jaučiasi gerai pasirengę tai daryti.

Šeimos gydytojų darbo efektyvumas dirbant su pacientais, patiriančiais savižudybės grėsmę, yra ribojamas tokių veiksnių kaip laiko išsamiai konsultacijai trūkumas, žinių ir įgūdžių stoka bei neapibrėžtos veiksmų gairės ASPĮ. Emocinis poveikis gydytojams po pacientų savižu-

dybės yra ryškus, tačiau psichologinės pagalbos poreikį deklaruoja tik maža dalis gydytojų. Dabartinės paramos galimybės neužtikrina jiems tinkamos emocinės pagalbos, o patys gydytojai išreiškia aiškių institucinių procedūrų, profesionalios psichologinės pagalbos, supervizijų bei kolegų tarpusavio paramos poreikį.

Šios analizės pagrindu parengtos tolesnės rekomendacijos.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

- parengti ir įdiegti aiškius algoritmus, kaip šeimos gydytojai, jų komandos nariai ir (ar) kiti pirminės sveikatos priežiūros specialistai turi reaguoti, jeigu įtaria, kad pacientas patiria savižudybės grėsmę;
- skatinti ir palaikyti darbuotojus dalyvauti visuomenės sveikatos biurų organizuojamuose baziniuose savižudybių prevencijos ir intervencijos dėl savižudybės grėsmės mokymuose, sudarant sąlygas išklausyti juos darbo valandomis;
- jeigu yra galimybė, organizuoti ASPĮ savižudybių prevencijos mokymus, kurie būtų praktinio, interaktyvaus pobūdžio – orientuoti į atvejų analizę, diskusijas ir realių situacijų modeliavimą, siekiant plėsti ASPĮ šeimos gydytojų, jų komandų ir skirtingų specializacijų gydytojų žinias bei gebėjimus dirbti savižudybių prevencijos srityje;
- skatinti ASPĮ atvirą kultūrą, kai po sudėtingų profesinių patirčių yra priimtina ir netgi skatintina ieškoti emocinės paramos;
- rūpintis gydytojų emocine sveikata, diegiant psichologinės pagalbos mechanizmus darbuotojams po paciento (ar kolegos) savižudybės ar bandymo nusižudyti atvejų: konfidencialias psichologines psichikos sveikatos specialisto konsultacijas, supervizijų galimybę arba kolegų paramos grupių praktiką savo darbovietėje.

Šeimos gydytojams:

- atpažinti savo emocinį krūvį ir pripažinti, kad darbas su savižudybės grėsmę patiriančiais pacientais kartais gali būti emociškai sudėtingas bei reikalaujantis papildomo rūpinimosi savo asmenine psichologine gerove;
- esant poreikiui, ieškoti psichologinės pagalbos arba supervizijų, ypač po paciento savižudybės arba kitų stiprių emocinių išgyvenimų;
- stiprinti ir skatinti tarpusavio emocinės paramos kultūrą tarp kolegų, praktikuojant reguliarias refleksijas, komandines diskusijas;
- skirti dėmesio asmeninio emocinio atsparumo ugdymui, pagal galimybes dalyvaujant mokymuose apie savižudybių prevenciją, streso valdymą, perdegimo prevenciją, psichologinės sveikatos palaikymą.

Plačiau su nagrinėjama tema ir analizės rezultatais galite susipažinti Higienos instituto interneto svetainėje: Analize_Seimos_gydytoju_patirtys_savizudybiu_prevencija_LT_2025.pdf

Rūta Ruolytė-Verschoore
Higienos instituto
Psichikos sveikatos centras

INFORMACIJA STRAIPSNIŲ AUTORIAMS

„Visuomenės sveikata“ yra periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas keturis kartus per metus nuo 1996 m. Žurnalo steigėjas ir leidėjas – Higienos institutas.

1997-11-10 Lietuvos mokslo tarybos nutarimu žurnalas įtrauktas į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą recenzuojamų mokslo žurnalų sąrašą.

Nuo 2005 m. žurnalas indeksuojamas tarptautinėje duomenų bazėje *Index Copernicus* (http://www.indexcopernicus.com/). Žurnalas skirtas mokslininkams, studentams, sveikatos apsaugos organizatoriams ir administratoriams, visuomenės sveikatos specialistams, edukologams, gydytojams ir kitiems skaitytojams, besidomintiems visų šalies gyventojų ar atskirų jos grupių sveikatos ir ją veikiančių veiksnių problemomis.

Žurnale lietuvių ir anglų kalbomis spausdinami recenzuojami originalūs biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties ir jai artimų krypčių straipsniai. Taip pat spausdinami nerecenzuojami trumpi pranešimai (tezės), atvejų aprašymai, mokslinės diskusijos. Ne mokslinėse žurnalo rubrikose („Redakcijos skiltis“, „Visuomenės sveikatos praktikai“, „Metodinė medžiaga“) pristatoma informacija apie svarbiausius politinius įvykius visuomenės sveikatos srityje, geros praktikos pavyzdžius, išleistas metodines ir praktines rekomendacijas.

Už straipsnio spausdinimą imamas 50 Eur mokestis.

REIKALAVIMAI RANKRAŠČIUI

Redakcijai elektroniniu paštu visuomenes.sveikata@hi.lt arba per žurnalo interneto svetainę pateikiama:

- straipsnio elektroninė versija *Microsoft Word* (.doc, .docx) formatu;
- skenuotas dokumentas (PDF formatu), pasirašytas visų autorių. Pasirašydami autoriai garantuoja, kad straipsnis yra originalus, nepažeidžia kitų asmenų autorių teisių ir nėra anksčiau skelbtas spaudoje, ir perduoda visas straipsnio autorių teises leidėjui, jeigu straipsnis bus spausdinamas.

Straipsnio tituliniame lape turi būti nurodyti visi straipsnio autoriai. Atskirai lietuvių ir anglų kalbomis nurodomas atsakingas autorius (kontaktinis asmuo), jo kontaktai: įstaiga, įstaigos adresas, miestas, šalis, pašto kodas, el. paštas ir telefonas.

Straipsnio tekstas turi būti parengtas 12 punktų šriftu, tarp eilučių paliekant viengubus tarpus. Bendroji (su visais priedais) straipsnio apimtis – ne daugiau kaip 30 puslapių. Puslapiai turi būti numeruoti.

STRAIPSNIO STRUKTŪRA:

- straipsnio pavadinimas (iki 150 ženklų, įskaitant tarpus ir skyrybos ženklus),
- autorių vardai ir pavardės,
- įstaigų, kuriose atliktas darbas, pavadinimai.

STRAIPSNIO TEKSTO SKYRIAI:

- struktūruota santrauka lietuvių kalba (straipsnio pavadinimas, autoriai, jų įstaigos, tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, tyrimo rezultatai, išvados, reikšminiai žodžiai, iš viso 300 žodžių),
- 1–6 reikšminiai žodžiai (paminėti santraukoje),
- įvadas, kuris baigiasi darbo tikslo suformulavimu,
- tyrimo medžiaga ir metodai,
- rezultatai,
- rezultatų aptarimas,
- išvados arba apibendrinimas,
- literatūra,
- struktūruota santrauka anglų kalba (straipsnio pavadinimas, autoriai, jų įstaigos, tikslas, tyrimo medžiaga ir metodai, rezultatai, išvados, reikšminiai žodžiai, iš viso iki 300 žodžių).

INFORMUOJAME

Lentelės, schemos, brėžiniai ir pan., pateikiami tekste, turi turėti atskirą numeraciją. Iliustracijos ir paveikslai turi būti kompaktiški, ryškūs, tekstas juose aiškiai įskaitomas; grafikus ir paveikslus pageidautina pateikti *Excel* formatu, sudarant galimybę juos koreguoti.

Pirmą kartą tekste minimi sutrumpinimai turi būti paaiškinti. Skaičių trupmeninė dalis skiriama kableliu (pavyzdžiui, 2,15, ne 2.15).

Literatūros šaltiniai sąraše pateikiami ta kalba, kuria buvo išspausdinti, straipsnyje jie nurodomi laužtiniuose skliaustuose, pradedant citavimą nuo [1]. Literatūros sąrašas sudaromas remiantis Vankuverio sistema ir vienodais reikalavimais biomedicinos mokslo žurnalų rankraščiams („Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals“ JAMA. 1997;277:927–34).

Šaltinio gale turi būti nurodomas cituojamo straipsnio DOI. Siekiant išvengti spausdinimo klaidų ir pasikartojančių nuorodų, rekomenduojama citavimo šaltinių sąrašą rengti naudojantis bibliografinių nuorodų tvarkymo programomis, pvz., *EndNote, ReferenceManager, Zotero* ar kt. Kiekvienas straipsnyje cituojamas literatūros šaltinis turi būti susietas nuoroda su straipsniu (nuoroda įterpiama taip: tekstiniame dokumente pelės žymeklis nustatomas ties šaltinio numeriu, spustelimas dešinysis pelės klavišas, iš meniu pasirenkama parinktis „Hipersaitas“ ir į atsivėrusio lango laukelį „Adresas“ įterpiamas nukopijuotas straipsnio adresas).

Straipsniai, parengti neatsižvelgus į minėtus reikalavimus, nepriimami.

Informacija teikiama:
tel. (0 ~ 5) 262 5479, faks. (0 ~ 5) 262 4663,
el. paštas visuomenes.sveikata@hi.lt
Žurnalo svetainė internete
https://visuomenessveikata.hi.lt/

INFORMATION FOR AUTHORS

"Public Health" is a periodical scientific journal published quarterly since 1996. The founder and publisher of the journal is the Lithuanian Institute of Hygiene. The journal "Public Health" was established by the Institute of Hygiene in 1996 in Lithuania. It is a unique scientific journal in the country, specialized purely in public health. It is intended for researchers, public health managers and administrators, experts working in the field of epidemiology, biostatistics, occupational health, health promotion, environmental health as well as other readers interested in the health status of the population and the factors affecting it. The journal is published quarterly. An electronic version of each issue is placed on the website http://www.hi.lt/. The journal publishes peer-reviewed original articles in Lithuanian and English. It also publishes non-peer-reviewed short articles (theses), case reports, and scientific discussions. The non-scientific sections of the journal ('Editorial column', 'For public health practitioners', 'Methodological material') present information on major policy developments in public health, examples of good practice, and published methodological and practical guidelines. Each issue includes a peer-reviewed section with original articles, including topic-related reviews, and non-peer-reviewed sections: editorial and information for public health practice, presenting important health policy news, good practice examples, guidelines, and recommendations. Since 1996, the journal has been on the official list of scientific journals recognized by the Academy of Science of Lithuania and it has been in the Index Copernicus database since 2005 (http://journals.indexcopernicus.com). A fee of EUR 50 is charged for the publication of an article.

MANUSCRIPT PREPARATION

To the editors by e-mail visuomenes.sveikata@hi.lt or via the journal's website, the following must be submitted:

- Electronic version of the article in Microsoft Word (.doc, .docx) format;
- A scanned document (in PDF format), signed by all authors, guaranteeing that the article is original, does not interfere with copyright regulations, has not been previously published, and transfers all copyrights of the article to the publisher if the article is accepted for publication.

All authors of the article must be listed on the title page. Separately in Lithuanian and English, the responsible author (contact person), along with their contact details: institution, institution address, city, country, postal code, e-mail, and telephone number must be indicated.

The text of the article must be typed in size 12-point font, single-spaced between lines. The total length of the article (with all appendices) should be no more than 30 pages. Pages must be numbered.

STRUCTURE OF THE ARTICLE

- Title (up to 150 characters, including spaces and punctuation)
- Authors
- Institution(s) to which the work should be attributed

SECTIONS OF THE TEXT

- Summary in the same language as the article (should not exceed 300 words)
- Keywords (mentioned in the summary)
- Introduction, where the purpose of the work is stated
- Objectives and methods of the study
- Results
- Discussion
- Conclusions
- References
- Summary in the other language up to 300 words (Lithuanian, if the article is in English), including the title, authors, institutions, objective, methods, short presentation of the findings, main conclusions, keywords

ADDITIONAL INFORMATION

- Tables, figures, diagrams, etc., presented in the text must have a separate enumeration. Illustrations must be of good quality; the text of the illustrations should be clear.
- Abbreviations mentioned in the text for the first time must be explained.
- The fractional part of the number in Lithuanian is separated by a comma (i.e., 2,16 instead of 2.16).
- References to other works should be consecutively numbered in the text using square brackets and listed in the original language by number in the reference list. The list of references should be based on the Vancouver system and on "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals" (JAMA 1997; 277:927-34). The DOI of the cited article must be indicated at the end of the source. To avoid errors and duplicate references, it is recommended that you prepare a list of citation sources using bibliographic reference management programs such as EndNote, Reference Manager, Zotero, or others. Each literary source cited in the article must be associated with a link to the article.

Articles not complying with these requirements will not be accepted.

For more information:
Phone +370 649 51 350; Fax +370 5 262 4663.
E-mail: visuomenes.sveikata@hi.lt
Website: https://visuomenessveikata.hi.lt/



visuomenėssveikata.hi.lt